

MATÉRIAUX

POUR SERVIR A

L'HISTOIRE DES HYDROÏDES

2^{me} PÉRIODE

(1821 à 1850)

PAR

M. BEDOT

Le plan adopté ici est le même que celui qui a été exposé et suivi dans l'histoire de la période précédente¹. La première partie de ce travail contenait malheureusement quelques erreurs. Nous les corrigerons au fur et à mesure, dans des notes placées au bas de la page, soit dans la partie historique, soit dans la partie systématique.

Il est bon de rappeler encore une fois que nous ne considérons nullement comme bonnes espèces toutes celles dont nous donnons la synonymie; beaucoup d'entre elles sont destinées à disparaître lorsqu'on fera la revision des genres ou lorsqu'on aura constaté que les types, d'après lesquels elles ont été incomplètement décrites, ont disparu.

¹ Voir : M. BEDOT. *Matériaux pour servir à l'histoire des Hydroïdes*. 1^{re} Période. In : *Rev. suisse de Zool.*, T. 9, pp. 379-515, Genève, 1901, 8°.

PARTIE HISTORIQUE

Les travaux publiés pendant cette seconde période, soit de 1821 à 1850, ont donné des résultats très importants relativement aux affinités, à la structure et au développement des Hydroïdes. C'est pendant cette période, en effet, que l'on arrive, grâce aux travaux de STEENSTRUP (1842) et de DUJARDIN (1843 et 1845) à une notion exacte des relations existant entre les Polypes et les Méduses. Ces dernières, déjà divisées par ESCHSCHOLTZ (1829) en *Cryptocarpæ* et *Phanerocarpæ* sont étudiées de nouveau par FORBES (1846 et 1848) qui les répartit en deux groupes : *Steganophthalmata* et *Gymnophthalmata*.

Les Bryozoaires, autrefois confondus avec les Hydroïdes, font l'objet des recherches d'AUDOUIN et Milne EDWARDS (1828) et d'EHRENBERG (1834) et sont définitivement mis de côté. LEUCKART (1848) les exclut du groupe des Cœlentérés qu'il vient d'établir aux dépens des Radiaires de CUVIER, dont il a séparé les Echinodermes.

En 1838 JOHNSTON publia la première édition de son « History of the British Zoophytes » dont la seconde édition parut en 1847. C'est le plus important des travaux d'ensemble publiés pendant cette période.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE¹

1743. JUSSIEU (de), B. In : TREMBLEY, 1744 (a), p. 197.

Sur l'Hydre.

1771. BOMME, L. Waarnemingen omtrent de Gesteldheid en groeiing der Zee-Polypen. In: Verhandeligen uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. Deel 2, pp. 277-302, 1 pl. Middelburg, 1771, 8°.

1792-97. SPALLANZANI, L. Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell'Appennino. 6 vol. Pavia, 1792-97, 8°, pl.

Description de deux Campanulaires interminables.

1793. URE, D. The history of Rutherglen and East-Kilbride. Glasgow, 1793, 8°.

1810. RAFINESQUE-SCHMALTZ, C.-S. Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e piante della Sicilia, con varie osservazioni sopra i medesimi. Palermo, 1810, 8°.

1819. SCHWEIGER, A.-F. Beobachtungen auf naturhistorischen Reisen. Anatomisch-Physiologische Untersuchungen über Corallen. Berlin, 1819, 4°, pl.

1821. CHAMISSE (de), A. et EYSENHARDT, C.-G. De animalibus quibusdam et classe vermium Linneana. Fasciculus secundus. In: Nov. Act. Acad. Leopold. Carol., vol. 10, P. 2, pp. 345-374. Bonnæ, 1821, 4°, pl.

1822. FLEMING, J. The philosophy of zoology, or a general view of the structure, functions, and classification of animals. 2 vol. Edinburgh, 1822, 8°, pl.

¹ Les sept premières indications bibliographiques de cet index se rapportent à des ouvrages qui auraient dû figurer dans la première période.

1822. SERRES (de). M. Essai pour servir à l'histoire des animaux du Midi de la France. Montpellier, 1822, 4°.
- 1823 (a). FLEMING, J. Observations on the *Sertularia cuscata* of Ellis. In : Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., vol. 4, P. 2, pp. 485-491. Edinburgh, 1823. 8°.
- FLEMING sépare les *Sertularia cuscata* et *uva* [qui sont des Bryozoaires] des autres Sertulaires et en forme le genre *Walkeria*.
- 1823 (b). FLEMING, J. Gleanings of natural history, gathered on the coast of Scotland during a voyage in 1821. In : Edinburgh Phil. Journ., vol. 8. pp. 294-303. Edinburgh, 1823, 8°.
1824. BORY de St-VINCENT. Voir : LAMOUREUX, 1824 (c).
1824. DESLONGCHAMPS. Voir : LAMOUREUX, 1824 (c).
1824. FABRICIUS, O. Nye Zoologiske Bidrag. In : K. Danske Vidensk. Selskabs Naturvidensk. Afhandl. Første Deel, pp. 23-80, pl. 1-2. Kjöbenhavn. 1824, 4°. — Résumé en allemand dans : Isis. Jahrg. 1845, pp. 50-54. Leipzig, 1845, 4°.
1824. FREYCINET (de), L. Voyage autour du monde... exécuté sur les corvettes de S. M. l'Uranie et la Physicienne, pendant les années 1817 à 1820. — Zoologie par MM. QUOY et GAIMARD. 1 vol. Paris, 1824, 4° et atlas fol°. (La description des Polypiers flexibles est de LAMOUREUX ; voir p. 603.)
1824. GLIEMANN, T. Geographische Beschreibung von Island. Altona, 1824, 8° (p. 169).
1824. GRUTHUISEN, F. Handbuch der Vorbereitungslehre an den K. Baierischen Schulen. Einleitung in das Studium der Arzneykunde. Nürnberg, 1824, 8°.
1824. HOFFMANN. Einige Bemerkungen über die Vegetation und die Fauna von Helgoland. In : Verh. Gesellsch. naturforsch. Freunde Berlin. 1. Bd., 4. Stück. pp. 228-260, pl. 10. Berlin, 1824, 4°.
- 1824 (a). LAMOUREUX. Extrait d'un travail... intitulé : Introduction à l'Histoire des Zoophytes et animaux rayonnés. In :

Bull. des sc. nat. et de Géologie (FÉRUSAC), vol. 3, pp. 123-124. Paris, 1824, 8°.

1824 (b). LAMOUROUX. In: FREYCINET, 1824.

1824 (c). LAMOUROUX, BORY de St-VINCENT et E. DESLONGCHAMPS. Histoire naturelle des Zoophytes ou animaux rayonnés, faisant suite à l'Histoire naturelle des Vers de BRUGUÈRE. In: Encyclopédie méthodique. Tome second. Paris, 1824, 4°, pl.

Le 1^{er} volume publié par BRUGUÈRE, en 1789, est resté inachevé.

1824. QUOY et GAIMARD. In: FREYCINET, 1824.

1825. JOHNSTON, G. Contributions to the british fauna. In: Edinburgh Phil. Journ., vol. 13, pp. 218-222. Edinburgh, 1825, 8°.

1826. BENNET, J.-A. en OLIVIER (van), G. Naamlijst van Wormen in Nederland aanwezig. In: Natuurk. Verh. Maatsch. der Wetensch. Haarlem, D. 15, 2, pp. 1-256. Haarlem, 1826, 8°.

1826. BLAINVILLE (de), H. Note sur la génération de l'Hydre verte. In: Nouv. Bull. des sc. Soc. philomatique (1826), pp. 77-78. Paris, 1826, 4°.

1826. FLEMING, J. Description of *Plumularia bullata*, a new species collected by the arctic expedition under Capt. PARRY in Hudson's Strait. In: Mem. Wernerian. Nat. Hist. Soc., vol. 5, P. 2, pp. 303-306, pl. 9. Edinburgh, 1826, 8°.

1826. GRANT, E. Observations on the spontaneous motions of the ova of the *Campanularia dichotoma*... and *Plumularia falcata*. In: Edinburgh New Phil. Journ. April-October 1826, pp. 150-156. Edinburgh, 1826, 8°.

1826. RISSO, A. Histoire naturelle des principales productions de l'Europe méridionale et particulièrement de celles des environs de Nice et des Alpes maritimes. 5 vol., Paris, 1826, 8°, pl. (vol. 5, p. 307).

1827. HOEVEN (van der), J. Iets over de Vermenigvuldiging der Armpolypen (Hydræ). In: Bijdragen tot de Nat. Wetenschappen, 2^e Deel, 2^e Stuk, pp. 551-555. Amsterdam, 1827, 8°.

1827. HOGG, J. On the Natural History of the vicinity of Stockton-on-Tees. In: BREWSTER, J. History of Stockton. Stockton, 1827, 8°.
1827. QUOY et GAIMARD. Observations zoologiques faites à bord de l'Astrolabe, en mai 1826, dans le détroit de Gibraltar. In: Ann. des sc. nat., vol. 10, pp. 1-21, 172-193 et 225-239, pl. 1-9. Paris, 1827, 8°.
1828. AUDOUIN et Milne EDWARDS. Résumé des recherches sur les animaux sans vertèbres, faites aux Iles Chausey. In: Ann. des sc. nat., vol. 15, pp. 5-19. Paris, 1828, 8°.
1828. EHRENBERG et HEMPRICH. Symbolæ physicæ. IV. Animalia evertebrata. Dec. 1. Berolini, 1828, fol.
1828. FLEMING, J. A History of british animals. Edinburgh, 1828, 8°.
1828. GRUITHUISEN. [Ueber den blassbraunen Armpolypen]. In: Isis, 1828, p. 506. Leipzig, 1828, 4°.
1828. HALL (van), H.-C. Aanteekening over de Beweging der Armpolypen (Hydræ). In: Bijdragen tot de Nat. Wetenschappen, 3^e Deel, pp. 326-329. Amsterdam, 1828, 8°.
1828. STARK, J. Elements of natural history. 2 vol. Edinburgh, 1828, 8°. pl. (vol. 2).
- 1828-1830. CHIAJE (delle), S. Memorie sulla storia e notomia degli animali senza vertebre del Regno di Napoli. 4 vol. et 1 atlas. Napoli, 1822-1830, 4° (vol. 3, 1828, vol. 4, 1829. Planches 1829-30).

Le titre de l'Atlas est daté de 1822, mais les planches 70 à 109 portent en signature la date de 1830. Il n'y en a pas d'explication, mais elles ont été reproduites, sous d'autres numéros dans la « Descrizione e notomia degli animali invertebrati della Sicilia citeriore » de Delle CHIAJE (1841-44). Ce dernier ouvrage n'est en quelque sorte qu'une nouvelle édition revue et augmentée des « Memorie », dont le 5^e vol. annoncé n'a jamais paru. Cette indication sur les pl. 70-109 est confirmée par une note de Delle CHIAJE dans la « Descr. e Notomia degli Animali invertebrati della Sicilia citeriore », vol. I, p. XIII.

1829. ESCHSCHOLTZ, F. System der Acalephen. Eine ausführ-

- liche Beschreibung aller medusenartigen Strahltiere. Berlin, 1829, 4^o, pl.
- 1829 (a). RAPP, W. Ueber die Polypen im Allgemeinen und die Actinien insbesondere. Weimar, 1829, 4^o, pl.
- 1829 (b). RAPP, W. Untersuchungen über den Bau einiger Polypen des mittelländischen Meeres. In: Nov. Act. Acad. Leopold. Carol., vol. 14, P. 2, p. 643. Bonn, 1829, 4^o, pl.
1829. SARS, M. Bidrag til Söedyrenes Naturhistorie. 1^e Hæfte. Bergen, 1829, 8^o. — Résumé dans: Isis, 1833, p. 221.
1830. [BLAINVILLE, H.-M.-D.]. Article « Zoophytes ». In: Dictionnaire des Sciences naturelles, 60 vol. Paris, 1816-1830, 8^o. (vol. 60, 1830.)
1830. COLDSTREAM, J. Additions to the natural history of british animals. In: Edinburgh New. Phil. Journ., vol. 9, July-October 1830, pp. 234-241. Edinburgh, 1830, 8^o.
1830. CUVIER, G. Le règne animal, distribué d'après son organisation. Edit. 2. 5 vol. Paris, 1829-30, 8^o. (vol. 3, 1830.)
1830. LESSON, R.-P. Zoophytes. In: Voyage autour du monde, exécuté... sur « La Coquille » ...par M. L.-J. DUPERREY. Zoologie par M. LESSON. 2 vol. 4^o et atlas fol^o. Paris, 1826-1830 (vol. 2, P. 2, 2^e division, 1830). — A part, sous le titre: Histoire naturelle des Zoophytes recueillis dans le voyage de la corvette « La Coquille ». Paris, 1832, 4^o, pl.
1830. MAUNOIR, J.-P. Sur le Polype d'eau douce. In: Bibliothèque universelle, 15^e année, vol. 43 (Sciences et Arts), pp. 297-302. Genève, 1830, 8^o.
1830. MEYEN, F. J.-F. Historisch-physiologische Untersuchungen über selbstbewegliche Molecüle der Materie. In: R. BROWN'S vermischte botanische Schriften..... in's Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen versehen von C. G. NEES von ESENBECK, Bd. 4, pp. 327-599. Nürnberg, 1830, 8^o.
1830. WOODWARD, S. On the *Hydra*. or Fresh-Water Polypus. In: Mag. of Nat. Hist., vol. 3, pp. 348-349. London, 1830, 8^o.

- 1832 (a). JOHNSTON, G. A descriptive catalogue of the recent Zoophytes found on the coast of North Durham. In: Trans. Nat. Hist. Soc. Northumberland. Durham and Newcastle-upon-Tyne, vol. 2, P. 1. pp. 239-272, pl. 7-12. Newcastle, 1832, 4°.
- 1832 (b). JOHNSTON, G. Illustrations in british zoology. 6. *Coryne glandulosa*. In: Mag. of Nat. Hist., vol. 5, pp. 631-632. London, 1832, 8°.
1832. LINK. Ueber die Pflanzentiere überhaupt und die dazu gerechneten Gewächse besonders. In: Abhandl. d. K. Akad. d. Wissens. zu Berlin a. d. Jahre 1830, pp. 109-124. Berlin, 1832, 4°, pl.
1833. JOHNSTON, G. Illustrations in british zoology. In: Mag. of Nat. Hist., vol. 6, pp. 320-324, pp. 497-499, fig. London. 1833, 8°.
1833. WAGNER, R. Ueber eine neue im adriatischen Meere gefundene Art von nackten Armpolypen und seine eigenthümliche Fortpflanzungsweise. In: Isis, pp. 256-260, pl. 11. Jena, 1833, 4°.
1834. BLAINVILLE, H.-M.-D. Manuel d'actinologie ou de zoophytologie. 1 vol. et Atlas. Paris. 1834, 8°
1834. BRANDT, J.-F. Prodromus descriptionis animalium ab H. MERTENSIO in orbis terrarum circumnavigatione observatorum. Fasc. 1. In: Recueil des Actes des séances publiques de l'Acad. Imp. des Sc. de St-Petersbourg, pp. 201-275. St-Petersbourg, 1834, 4°. — A part: 1835.
1834. DALYELL, G. On the propagation of Scottish Zoophytes. In: Edinburgh new Phil. Journ., vol. 17, pp. 411-415. Edinburgh, 1834, 8°.

Compte rendu préliminaire du Mémoire de 1835.

1834. EHRENBERG, C.-G. Beiträge zur physiologischen Kenntnis der Corallentiere im Allgemeinen, und besonders des rothen

- Meeres, nebst einem Versuche zur physiologischen Systematik derselben. In: Abhandl. d. K. Akad. d. Wissens. zu Berlin (1832). Erster Teil, pp. 225-380. Berlin, 1834, 4°. — A part, sous le titre: Die Corallentiere des rothen Meeres. Berlin, 1834, 4°.
1834. JOHNSTON, A. catalogue of the Zoophytes of Berwickshire. In: Hist. of the Berwickshire Nat. Club. [Vol. 1]. pp. 107-108. Edinburgh, 1834. 8°.
1834. LISTER, J. Some observations on the structure and functions of tubular and cellular Polypi, and of Ascidie. In: R. Soc. Philos. Trans., P. 2, pp. 365-388, pl. 8-12. London, 1834, 4°.
1834. MERTENS, H. In: BRANDT, 1834.
1834. MEYEN, F.-J.-F. Beiträge zur Zoologie gesammelt auf einer Reise um die Erde. V. Ueber das Leuchten des Meeres und Beschreibung einiger Polypen und anderer niederer Tiere. In: Nov. Act. Acad. Leopold. Carol., vol. 16, Supplem., pp. 125-216. Breslau und Bonn, 1834. 4°, pl.
1834. ORBIGNY (d'), A. Mollusques, Echinodermes, Foraminifères et Polypiers, recueillis aux Iles Canaries par MM. WEBB et BERTHELOT. Paris, 1834, 4°, pl.
- 1834-40. ROGET, P.-M. Animal and vegetable physiology considered with reference to natural theology. In: The Bridgewater Treatises. Edit. 2. 2 vol. London. 1834-40. 8°.
1835. DALYELL, J.-G. On the propagation of certain scottish Zoophytes. In: Rep. 4 Meet. Brit. Ass. adv. Sc. (Edinburgh 1834), pp. 598-607. London, 1835. 8°.
1835. KIRBY, W. On the history habits and instincts of animals. 2 vol. In: Bridgewater treatises. London, 1835, 8°.
1835. LOVÉN, S.-L. Bidrag till Kämmedomen af Släktena *Campanularia* och *Syncoryna*. In: K. Vet. Acad. Handl. för År 1835, pp. 260-281, pl. 6-8. Stockholm, 1835, 8°. — A part in: Zoologiska Bidrag. Stockholm. 1836, 8°. — En allemand, in: Arch. f. Naturg., 3. Jahrg., Bd. 1, pp. 249-262, 321-326,

- pl. 6. Berlin. 1837, 8°. — En français (trad. incomplète) dans : Ann. des sc. nat. Zoologie (2), vol. 15. pp. 157-176, pl. 8. Paris, 1841, 8°.
1835. RATHKE, H. Beschreibung der *Oceania Blumenbachii* einer bei Sevastopol gefundenen leuchtenden Meduse. In : Mém. Acad. St-Petersbourg (Mém. présentés par divers savants.), vol. 2. pp. 321-330. St-Petersbourg, 1835, 4°, pl.
1835. SARS, M. Beskrivelser og Jagttagelser over nogle mærkelige eller nye i havet ved den Bergenske kyst levende Dyr af Polypernes. Acalephernes, Radiaternes, Annelidernes og Molluskernes Classer, med en kort oversigt over de hidtil af Forfatteren sammesteds fundne Arter og deres Forekommen. Bergen. 1835, 4°, pl.
- 1835-41. GRANT, R.-E. Outlines of comparative anatomy. London, 1835-41. 8°.
1836. CORDA, A.-J. Anatomie *Hydræ fuscae*. In : Nov. Act. Acad. Cæs. Leopold. Carol., vol. 18, P. 1, pp. 297-304, pl. 14-16. Bonn, 1836, 4°.
1836. DALYELL, J.-G. Farther illustrations of the propagation of Scottish Zoophytes. In : Edinburgh new Phil. Journ., vol. 21. pp. 88-94, fig. Edinburgh, 1836, 8°.
1836. EDWARDS, H. Milne. In : LAMARCK. 1836.
- 1836 (a). EHRENBERG. Das Leuchten des Meeres. Neue Beobachtungen nebst Uebersicht der Hauptmomente der geschichtlichen Entwicklung dieses merkwürdigen Phänomens. In : Abhandl. d. K. Akad. d. Wissens. zu Berlin (1834), pp. 411-575. Berlin, 1836, 4°, pl.
- 1836 (b). EHRENBERG. [Thiere der Nordsee aus Helgoland.] In : Mitt. a. d. Verh. Gesellsch. naturforsch. Freunde Berlin. pp. 1-5. Berlin. 1836, 8°.
- 1836 (c). EHRENBERG. [Neue Beobachtungen über die Organisation der Armpolypen.] In : Mitt. a. d. Verh. Gesellsch. naturforsch. Freunde Berlin, pp. 26-29. Berlin, 1836, 8°.

1836. HARVEY, J.-B. [Lettre sur une nouvelle espèce de Tubulaire, *Tubularia gracilis*]. In : Proc. Zool. Soc. London. vol. 4, pp. 54-55. London, 1836, 8°.
1836. JOHNSTON, G. In : TEMPLETON, 1836.
1836. LAMARCK (de), J.-B.-P.-A. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Edit. 2, revue et augmentée par G. P. DESHAYES et H. Milne EDWARDS. 11 vol., Paris, 1835-45, 8°. (Polypes, vol. 2, 1836, par M. EDWARDS. Pour les Méduses, voir à 1840).
1836. LESSON, R.-P. Mémoire sur la famille des Beroïdes (*Beroidea* Less.). In : Ann. des sc. nat. (2), vol. 5, pp. 235-266. Paris, 1836, 8°.
1836. TEMPLETON, R. A Catalogue of the species of rayed animals found in Ireland, as selected from the papers of the late J. TEMPLETON. Radiata. In : Mag. of Nat. Hist., vol. 9, pp. 301-305, 417-422, 466-472. London, 1836, 8°.
1836. WAGNER, R. Prodrömus historiæ generationis hominis atque animalium. Lipsiæ, 1836, fol°.
- 1836-49. CUVIER, G. Le règne animal distribué d'après son organisation... Nouvelle édition... par une réunion de disciples de CUVIER. (Les Zoophytes par M. Milne EDWARDS.) Paris, 1835-49, 11 vol. 4° et Atlas.

Le texte de cet ouvrage n'est que la réimpression de l'édition de 1830 du « Règne animal » de CUVIER et nous n'en avons pas tenu compte. Mais l'Atlas renferme des dessins originaux de M. EDWARDS, de QUATREFAGES et de PÉRON et LESUEUR que nous avons cités.

- 1836-49. EDWARDS, H.-Milne. In : CUVIER, 1836-49.
- 1836-49. PÉRON et LESUEUR. In : CUVIER, 1836-49. Atlas, pl. 43 et suivantes.
- 1836-49. QUATREFAGES (de), A. In : CUVIER, 1836-49. Atlas, pl. 64.
1837. BRANDT. Remarques sur quelques modifications dans l'arrangement de l'ordre des Acalèphes discophores ou Om-

- bellifères. In : Bull. Scient. Acad. St-Pétersbourg, vol. 1, N° 24, pp. 185-191. St-Pétersbourg, 1837, 4°.
1837. EHRENBERG. Ueber die Akalephen des rothen Meeres und den Organismus der Medusen der Ostsee. In : Abhandl. d. k. Akad. d. Wissens. zu Berlin (1835), pp. 181-260. Berlin, 1837, 4°, pl.
1837. FARRE. A. Observations on the minute structure of some of the higher forms of Polypi. with views of a more natural arrangement of the class. In : R. Soc. Philos. Trans. (1837), P. 1, pp. 387-426. London, 1837, 4°, pl.
1837. JOHNSTON. G. The natural history of british zoophytes. In : Mag. of Zool. and Botany, vol. 1, pp. 64-81, 225-247, 440-448. Edinburgh, London and Dublin, 1837, 8°.
1837. KRAUSS, C.-F.-F. Beitrag zur Kenntniss der Corallineen und Zoophyten der Südsee. Stuttgart. 1837, 4°, pl.
1838. BRANDT. J.-F. Ausführliche Beschreibung der von C. H. MERTENS auf seiner Weltumsegelung beobachteten Schwimmquallen. In : Mem. Acad. Imp. Sc. St-Pétersbourg (6), vol. 4, P. 2, pp. 237-412. St-Pétersbourg, 1838, 4°, pl.
1838. COSTA, O.-G. Fauna del regno di Napoli. Zoofiti. Napoli, 1838, 4°, pl.
- 1838(a). EHRENBERG. Ueber das Massenverhältniss der jetzt lebenden Kiesel-Infusorien und über ein neues Infusorien-Conglomerat als Polirschiefer von Jastraba in Ungarn. In : Abhandl. d. k. Akad. d. Wissens. zu Berlin (1836), pp. 109-135. Berlin, 1838, 4°, pl.
- 1838(b). EHRENBERG. [Ueber die Eier der Süsswasser-Polypen und deren wahrscheinliche männliche Geschlechtstheile]. In : Mitt. a. d. Verh. der Gesellsch. naturforsch. Freunde Berlin, Jahrg. 3, p. 14. Berlin, 1838, 8°.
- 1838(c). EHRENBERG, C.-G. Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. 1 vol. et Atlas. Leipzig, 1838, fol°.

1838. GRAY, J. E. New British Zoophyte. In : Ann. of Nat. Hist., vol. 1, p. 238. London, 1838, 8°.
1838. HARVEY, J.-B. Remarks on *Tubularia indivisa*. In: Mag. of Nat. Hist. (New series), vol. 2, pp. 511-512. London, 1838, 8°.
- 1838 (a). JOHNSTON, G. The natural history of british zoophytes. In : Mag. of Zool. and Botan., vol. 2, pp. 319-340. Edinburgh, London and Dublin, 1838. 8°.
- 1838 (b). JOHNSTON, G. A history of the british zoophytes. Edinburgh, London and Dublin. 1838, 8°, pl.
1839. BORY de St-VINCENT. Remarques sur une note de M. Milne EDWARDS insérée dans le compte rendu de la séance précédente et relative aux observations de M. NORDMANN sur les Polypiers du genre Campanulaire. In : Compt. rend. Acad. sc., vol. 9, pp. 717-719. Paris, 1839, 4°.
1839. COSTA, O.-G. Catalogo de'Zoofiti dell'una e l'altra Sicilia. In : COSTA, O.-G. Corrispondenza zoologica, p. 185. Napoli, 1839, 8°.
1839. COUTHOUY, J.-P. Descriptions of new species of Mollusca and shells, and remarks on several Polypi found in Massachusetts Bay. In: Boston Journ. of Nat. Hist. (1838-39), vol. 2, pp. 53-111. Boston, 1839, 8°.
1839. EDWARDS, Milne. In: BORY de St-VINCENT, 1839.
1839. LAURENT. Recherches sur les trois sortes de corps reproducteurs des animaux et sur l'histoire naturelle et l'anatomie des œufs de l'*Hydra vulgaris grisea*. In: Compt. rend. Acad. sc., vol. 9, p. 820. Paris, 1839, 4°.
1839. NORDMANN. Sur les changements que l'âge apporte dans la manière d'être des Campanulaires. In: Compt. rend. Acad. sc., vol. 9, p. 704. Paris, 1839, 4°.
- 1839-46. ORBIGNY (d'), A. Voyage dans l'Amérique méridionale... exécuté dans le cours des années 1826-1833. 7 vol. et 1 atlas, Paris, 1834-46, 4°. (Zoophytes: vol. 5, P. 4. 1839-46).
1840. DUJARDIN, F. In: LAMARCK, 1840.

1840. FORBES, E. and GOODSIR, J. On the *Corymorpha nutans* of Sars, a remarkable Hydroid Polype. In : Ann. of Nat. Hist. or Mag. of Zool., vol. 5, pp. 309-315. London, 1840, 8°.
1840. HOGG, J. On the tentacular classification of Zoophytes. In : Ann. of Nat. Hist. or Mag. of Zool., vol. 4, pp. 364-367. London, 1840, 8°.
1840. LAMARCK (de), J.-B.-P.-A. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. Edit. 2 revue et augmentée par G.-P. DESHAYES et H. Milne EDWARDS. 11 vol., Paris, 1835-45, 8°. (Radiaires, vol. 3, 1840, par F. DUJARDIN. Pour les Polypes, voir à 1836.)
1840. THOMPSON, W. Additions to the fauna of Ireland. In : Ann. of Nat. Hist. or Mag. of Zool., vol. 5, pp. 245-257. London, 1840, 8°.
1841. BENEDEN (van), P.-J. Recherches sur la structure de l'œuf dans un nouveau genre de Polype (genre Hydractinie). In : Bull. Acad. sc. Bruxelles, vol. 8, P. 1, pp. 89-93. Bruxelles, 1841, 8°, pl.
1841. COUCH, R.-Q. An essay on the Zoophytes of Cornwall. In : 9th. Ann. Rep. R. Cornwall Polytechnic Soc. (1841), pp. 27-90. Falmouth and London, 1841, 8°.
1841. DAVIS, J.-F. Zoological observations made in the neighbourhood of Tenby. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 7, pp. 234-236. London, 1841, 8°.
1841. EDWARDS, Milne. Sur la structure et les fonctions de quelques Zoophytes, Mollusques et Crustacés des côtes de la France. In : Ann. des sc. nat. (2), vol. 16, pp. 193-232. Paris, 1841, 8°, pl.
- 1841 (a). ERDL. In : WAGNER, 1841, p. 43, pl. 34.
- 1841 (b). ERDL. Ueber die Organisation der Fangarme der Polypen. In : Arch. Anat., Physiol. u. wiss. Medizin, Jahrg. 1841, pp. 423-434, pl. 15. Berlin, 1841, 8°.
1841. FORBES, E. Contributions to british actinology. In :

- Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 7, pp. 81-85, pl. 1. London, 1841, 8°.
1841. GOULD, A.-A. Report on the Invertebrata of Massachusetts comprising the Mollusca, Crustacea, Annelida and Radiata. Cambridge, 1841, 8°.
- 1841 (a). HASSALL, A.-H. Catalogue of Irish Zoophytes. In: Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 6, pp. 166-175, pl. 5-7. London, 1841, 8°.
- 1841 (b). HASSALL, A.-H. Supplement to a catalogue of Irish Zoophytes. In: Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 7, pp. 276-287, 363-374, pl. 6-10. London, 1841, 8°.
- 1841 (a). LAURENT. Recherches sur l'Hydre. In: Compt. rend. Acad. sc., vol. 12, pp. 982-985. Paris, 1841, 4°.
- 1841 (b). LAURENT. Notice sur les principaux résultats d'observations et d'expériences relatives à la coloration des tissus de l'Hydre, au retournement, à l'engainement, à la greffe, aux monstruosités et à la maladie pustuleuse de cet animal. In: Compt. rend. Acad. sc., vol. 12, pp. 1168-1171. Paris, 1841, 4°.
- 1841 (c). LAURENT. Organisation de l'œuf de l'*Hydra vulgaris grisea*. In: Soc. philomatique, Proc. verb. (1840), pp. 79-80. Paris, 1841, 8°.
- 1841 (d). LAURENT. [Sur la coloration des tissus de l'Hydre...]. In: Soc. philomatique. Proc. verb. (1841), pp. 72-73. Paris, 1841, 8°.
Sur l'Hydre.
1841. WAGNER, R. Icones Zootomicæ. Handatlas zur vergleichenden Anatomie. Leipzig, 1841, fol., pl.
- 1841-44. CHIAJE (delle), S. Animali senza vertebre del Regno di Napoli. Descrizione e notomia degli animali invertebrati della Sicilia citeriore osservati vivi negli anni 1822-1830. 8 vol., Napoli, 1841-1844, 4°, pl.
1842. BLAINVILLE (de). Rapport sur quatre mémoires de M. L. LAURENT (de Toulon), intitulés : Recherches sur les trois

- sortes de corps reproducteurs, l'anatomie, les monstruosités et la maladie pustuleuse de l'Hydre vulgaire (*Hydra grisea vulgaris*). In : Compt. rend. Acad. sc., vol. 15, pp. 373-388. Paris, 1842, 8°.
1842. COUCH, R.-Q. Observations on the Sponges of Cornwall. In : 10th Ann. Rep. R. Cornwall Polytechnic Soc., (1842), P. 2, pp. 41-62. Falmouth and London, 1842, 8° (p. 44).
1842. DOYÈRE. Note sur quelques points de l'anatomie des Hydres d'eau douce. In : Compt. rend. Acad. sc., vol. 15, pp. 429-432. Paris, 1842, 4°.
1842. DUVERNOY. In : EDWARDS, Milne, 1842.
Sur l'Hydre.
1842. EDWARDS, Milne. Sur l'organisation des Hydres. In : Compt. rend. Acad. sc., vol. 15, pp. 399-401. Paris, 1842, 4°.
Sur l'Hydre.
1842. FLOURENS. In : EDWARDS, Milne, 1842.
Sur l'Hydre.
1842. HASSAL, A.-H. On the phosphorescence of Zoophytes. In : Ann. and Magaz. of Nat. Hist., vol. 8, pp. 341-344. London, 1842, 8°.
1842. HYNDMANN, G.-C. Note of species obtained by deep dredging near Sana Island, off the Mull of Cantire. In : Ann. and Magaz. of Nat. Hist., vol. 10, pp. 19-20. London, 1842, 8°. — Et in : Rep. 12th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Manchester 1842), P. 2, pp. 70-72. London, 1843, 8°.
1842. LANDBOROUGH, D. On the phosphorescence of Zoophytes. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 8, p. 257-260. London, 1842, 8°.
- 1842 (a). LAURENT. Phénomènes de production des œufs chez les Hydres. In : Soc. Philomatique, Proc. verb. (1842), pp. 98-99. Paris, 1842, 8°.
Sur l'Hydre.

- 1842 (b). LAURENT, L. In : BLAINVILLE, 1842.
1842. MACGILLIVRAY, J. Catalogue of the marine Zoophytes of the neighbourhood of Aberdeen. In : Ann. and Magaz. of Nat. Hist., vol. 9, pp. 462-469. London, 1842, 8°.
1842. PHILIPPI, A. Zoologische Beobachtungen. (4. *Dysmorphosa conchicola*, ein neues Coryne-artiges Zoophyten Genus.) In : Arch. f. Naturg., 8. Jahrg., 1. Band, pp. 33-45, pl. 1. Berlin, 1842, 8°.
- 1842 (a). QUATREFAGES (de), A. Mémoire sur l'Eleuthérie dichotome (*Eleutheria dichotoma* A. de Q.). Nouveau genre de Rayonnés, voisin des Hydres. In : Compt. rend. Acad. sc., vol. 15, pp. 168-170. Paris, 1842, 4°.
- 1842 (b). QUATREFAGES (de), A. Mémoire sur l'Eleuthérie dichotome (*Eleutheria dichotoma* nob.), nouveau genre de Rayonnés, voisin des Hydres. In : Ann. des sc. nat. (2), vol. 18, pp. 270-288, pl. 8. Paris, 1842, 8°.
1842. STEENSTRUP, J. Om Forplantning og Udvikling gjennem vexlende generationsrækker, en saeregen Form for opfostringen i de lavere Dyrklasser. Kjöbenhavn, 1842, 4°, pl. — En allemand : Copenhagen, 1842, 8°, pl. — En anglais : London, 1845. 8°.
1843. BENEDEN (van), P.-J. Recherches sur l'embryogénie des Tubulaires et l'histoire naturelle des différents genres de cette famille qui habitent la côte d'Ostende. In : Bull. Acad. sc. Bruxelles, vol. 10, P. 2, pp. 414-416. Bruxelles, 1843, 8°.
1843. DIEFFENBACH, E. Travels in New Zealand. 2 vol. London. 1843, 8°. (Vol. 2. Fauna of New Zealand, p. 292. Additional Radiated Animals and Annelides by J. E. GRAY.)
1843. DUJARDIN, F. Observations sur un nouveau genre de Médusaires provenant de la métamorphose des Syncorynes. In : Compt. rend. Acad. sc., vol. 16, pp. 1132-1136. Paris, 1843, 4°. — Et dans : Ann. des sc. nat. (2), vol. 20, pp. 370-373. Paris, 1843, 8°.

1843. FORBES, E. Note in reply to Mr. HASSAL. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 12, pp. 188-190. London, 1843, 8°.
- 1843 (a). GRAY, J.-E. In : DIEFFENBACH, 1843, p. 292.
- 1843 (b). GRAY, J.-E. On the animals which force other living animals to form a house for their protection. In : The Zoologist (NEWMANN), vol. 1, pp. 202-205. London, 1843, 8°.
1843. HASSAL, A.-H. Remarks on three species of marine Zoophytes. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 11, pp. 111-113. London, 1843, 8°.
1843. KÖLLIKER, A. Ueber die Randkörper der Quallen, Polypen und Strahltiere. In : Foriep. n. Not., Bd. 25, Nr. 8534, p. 81-84. Weimar, 1843, 4°.
1843. KROHN, A. Einige Bemerkungen und Beobachtungen über die Geschlechtsverhältnisse bei den Sertularien. In : Arch. Anat., Physiol. u. wiss. Medizin, Jahrg. 1843, pp. 174-181. Berlin, 1843, 8°.
1843. LAURENT. [La spinosité de l'œuf de l'Hydre orangée.] In : Soc. philomatique, Proc. verb. (1843), p. 59 et p. 62. Paris, 1843, 8°.
1843. LESSON, R.-P. Histoire naturelle des Zoophytes. Aca-lèphes. Paris, 1843, 8°, pl.
1843. OWEN, R. Lectures on the comparative anatomy and physiology of the invertebrate animals. London, 1843, 8°.
1843. QUATREFAGES (de), A. Mémoire sur la Synhydre parasite (*Synhydra parasites* Nob.) Nouveau genre de Polypes voisin des Hydres. In : Ann. des sc. nat. (2), vol. 20, pp. 230-248. pl. 8-9. Paris, 1843, 8°.
1843. WESTENDORP, G.-D. Recherches sur les Polypiers flexibles de la Belgique et particulièrement des environs d'Ostende. In : Ann. de la Soc. médico-chirurgicale de Bruges, vol. 4, p. 2, 1 pl. Bruges, 1843, 8°. — Et à part : Bruges, 1843, 8°.
- 1844 (a). ALLMAN. Synopsis of the genera and species of Zoophytes inhabiting the fresh waters of Ireland. In : Rep. 13th

- Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. (Cork 1843), P. 2, p. 77. London, 1844, 8°.
- 1844 (b). ALLMAN, G.-J. Synopsis of the genera and species of Zoophytes inhabiting the fresh waters of Ireland. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 13, pp. 328-331. London, 1844, 8°.
- 1844 (a). BENEDEN (van), P.-J. Mémoire sur les Campanulaires de la côte d'Ostende, considérés sous le rapport physiologique, embryogénique et zoologique. In : Nouv. Mém. Acad. Bruxelles, vol. 17, Bruxelles, 1844, 4°, pl.
- 1844 (b). BENEDEN (van), P.-J. Recherches sur l'embryogénie des Tubulaires et l'histoire naturelle des différents genres de cette famille qui habitent la côte d'Ostende. In : Nouv. Mém. Acad. Bruxelles, vol. 17, Bruxelles, 1844, 4°, pl.
- 1844 (c). BENEDEN (van), P.-J. Sur les genres Eleuthérie et Synhydre. In : Bull. Acad. sc. Bruxelles, vol. 11, P. 2, pp. 305-314. Bruxelles, 1844, 8°.
1844. COUCH, R.-Q. A cornish fauna, being a compendium of the natural history of the country. P. 3. The Zoophytes and Calcareous Corallines. Truro, 1844, 8°, pl.
1844. FORBES, E. On the morphology of the reproductive system of the Sertularian Zoophytes, and its analogy with the reproductive system of the flowering plants. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 14, pp. 385-391, pl. 10. London, 1844, 8°.
1844. LAURENT, L. Zoophytologie. In : Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette « La Bonite ». 1 vol., Paris, 1844, 8° et atlas fol°. — A part sous le titre : LAURENT, L., Recherches sur l'Hydre et l'Eponge d'eau douce. Paris, 1844, 8° et atlas fol°.
1844. RATHKE, H. Bemerkungen über die *Coryna squamata*. In : Arch. f. Naturg., 10. Jahrg., 1 Bd., pp. 155-166, pl. 5. Berlin, 1844, 8°.

1844. THOMPSON, W. Report on the fauna of Ireland. Div. Invertebrata. In : Rep. 13th Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. (Cork 1843), pp 245-291. London, 1844, 8°.
1844. WILL, J.-G.-F. *Horæ tergestinæ* oder Beschreibung und Anatomie der im Herbste 1843 bei Triest beobachteten Akalephen. Leipzig, 1844, 4°, pl.
1845. BENEDEN (van), P.-J. Observations au sujet de la lettre de M. de QUATREFAGES. In : Bull. Acad. sc. Bruxelles, vol. 12, P. 1, pp. 124-129. Bruxelles, 1845, 8°.
1845. COUCH, R.-Q. On the morphology of the different organs of Zoophytes. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 15, pp. 161-166, pl. 13. London, 1845, 8°.
- 1845 (a). DUJARDIN, F. Mémoire sur le développement des Méduses et des Polypes hydriques. In : Compt. rend. Acad. sc., vol. 21, pp. 1273-1277. Paris, 1845, 4°.
- 1845 (b). DUJARDIN, F. Mémoire sur le développement des Méduses et des Polypes hydriques. In : Ann. des sc. nat. (3), vol. 4, pp. 257-281, pl. 14-15. Paris, 1845, 8°.
1845. FORBES, E. On the morphology of the reproductive system of Sertularian Zoophytes, and its analogy with that of flowering plants. In : Rep. 14th Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. (York 1844), P. 2, pp. 68-69. London, 1845, 8°.
1845. MENEGHINI, G. Osservazioni sull'ordine delle Sertulariee della classe dei Polipi. In : Mem. Imp. Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, vol. 2, pp. 183-199, pl. 12-14. Venezia, 1845, 4°. — A part, Venezia, 1845, 4°, pl.
1845. QUATREFAGES (de), A. Lettre., en réponse aux observations de M. van BENEDEN sur les genres Eleuthérie et Synhydre. In : Bull. Acad. sc., Bruxelles, vol. 12, P. 1, pp. 116-123. Bruxelles, 1845, 8°.
1845. REID, J. Anatomical and physiological observations on some Zoophytes. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 16, pp. 385-400. London, 1845, 8°.

1845. STEENSTRUP, J. Undersøgelser over Hermaphroditismens Tilværelse i Naturen. Kjöbenhavn, 1845, 4°, pl.
1846. COUTHOUY, J.-P. In : DANA, 1846-49, p. 19 et 691.
1846. [DENOTARIS, G.]. Zoofiti. In : Descrizione di Genova e del Genovesato. Vol. 1, P. 2, pp. 75-80. Genova, 1846, 8°.
1846. FORBES, E. On the pulmograde Medusæ of the british seas. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., vol. 18, pp. 284-287. London, 1846, 8°. — Et in : Rep. 16th Meet. Brit. Assoc. adv. Sc. (Southampton, 1846), P. 2, pp. 84-85. London, 1847, 8°.
1846. SARS, M. Fauna littoralis Norvegiæ. 1. Heft. I. Ueber die Fortpflanzungsweise einiger Polypen (*Syncoryna*, *Podocoryna*, *Perigonimus*, *Cytæis*), pp. 1-16. Christiania, 1846, fol°.
1846. SCHULTZE, M. Beobachtung der Samenthierchen, der Eibildung, der Selbstbefruchtung, und des Auskriechens der Jungen aus den Eiern von *Hydra*. Voir : STEENSTRUP, 1846, pp. 116-119.
1846. STEENSTRUP, J. Untersuchungen über das Vorkommen des Hermaphroditismus in der Natur: Uebers. von C. F. HORNSCHUCH, mit Bemerkungen von... Max SCHULTZE..... Greifswald, 1846, 4°, pl.
1846. [VERANY, G.-B.]. Acalefi Medusici. In : Descrizione di Genova e del Genovesato, vol. 1, P. 2, pp. 84-85. Genova, 1846, 8°.
- 1846-49. DANA, J.-D. Zoophytes. In : Narrative of the U. S. Exploring Expedition, during the years 1838-1842, by Ch. WILKES. Vol. 7, Zoophytes. Philadelphia, 1846, 8°. Atlas, 1849, fol°.
- Le texte de cet ouvrage ayant été publié seulement à 100 exemplaires, l'auteur en a donné, en 1859, une nouvelle édition abrégée. En outre, l'introduction a été tirée à part sous le titre : DANA, J.-D. Structure and classification of Zoophytes. Philadelphia, 1846, 4°.
- 1846-49. PICKERING, C. In : DANA, 1846-59, p. 689 et 692.
1847. ALDER, J. In : JOHNSTON. 1847, p. 463.

1847. BENEDEN (van), P.-J. Un mot sur le mode de reproduction des animaux inférieurs. In : Bull. Acad. sc. de Belgique, vol. 14, P. 1, pp. 448-462, 1 pl. Bruxelles, 1847, 8°.
1847. DANA, J.-D. On Zoöphytes. In : American Journ. of sc. and arts (2), vol. 3, pp. 1-24, 160-164, 337-346. New-Haven, 1847, 8°.
1847. FORSTER M. In : JOHNSTON, 1847, p. 21, note.
1847. FREY, H. und LEUCKART, R. Beiträge zur Kenntniss wirbelloser Thiere mit besonderer Berücksichtigung der Fauna des norddeutschen Meeres. Braunschweig, 1847, 4°.
1847. JOHNSTON, G. A history of the british Zoophytes. Edit. 2. 2 vol., London, 1847, 8°, pl.
1847. KÆLLIKER, A. Die Bildung der Samenfäden in Bläschen als allgemeines Entwicklungsgesetz. In : Neue Denkschr. Schweiz. Ges. Naturw., Bd. 8, 82 p., 3 pl. Neuenburg, 1847, 4°.
1847. LANDSBOROUGH, D. Arran. A poem . . . and excursions to Arran, with reference to the natural history of the Island. Edinburgh, 1847, 8°.
- 1847 (a). LEUCKART, R. Verzeichniss der zur Fauna Helgoland's gehörenden wirbellosen Seethiere. In : FREY, H. und LEUCKART, R. Beiträge zur Kenntniss wirbelloser Thiere, pp. 136-168. Braunschweig, 1847, 4°.
- 1847 (b). LEUCKART, R. Compte-rendu de : « SARS, M. Fauna littoralis Norvegie, 1846. » In : Götting. gelehrte Anz., 1847, 190 St., p. 1897. Göttingen, 1847, 8°.
1847. MENEGHINI, G. In : RENIER, 1847.
- 1847 (a). NARDO, G.-D. Prospetto della fauna marina volgare del veneto estuario. Venezia, 1847, 4°.
- 1847 (b). NARDO. In : RENIER, 1847.
1847. REID, J. In : JOHNSTON, 1847, p. 463.
1847. RENIER, S.-A. Osservazioni postume di Zoologia adriatica del Prof. S.-A. RENIER... pubblicate per cura... del... Prof. G. MENEGHINI. Venezia, 1847. fol°, pl.

1847. THOMAS, F.-W.-L. In : JOHNSTON, 1847, p. 467.
1847. WAGENER, R. Ueber die Nessel-fäden der Tubularien. In : Arch. Anat., Physiol. und wiss. Medizin, Jahrg. 1847, pp. 195-201, pl. 8. Berlin, 1847, 8°.
- 1847-1848. DALYELL, J.-G. Rare and remarkable animals of Scotland, represented from living subjects with practical observations on their nature. 2 vol., London, 1847-48, 4°, pl.
1848. [CARPENTER, W.-B.]. On the Development and Metamorphoses of Zoophytes. In : British and Foreign medico-chirurgical Review, vol. 1, pp. 183-214. London, 1848, 8°.
1848. FORBES, E. A Monograph of the british Naked-Eyed Medusæ with figures of all the species. London, 1848, 4°, pl.
1848. GRAY, J.-E. List of the specimens of british animals in the collection of the British Museum. P. 1. Centroniæ or radiated animals. London, 1848, 12°.
- 1848 (a). HASSAL, A.-H. Definitions of three new british Zoophytes. In : The Zoologist, vol. 6, 1848, p. 2223. London, 1848, 8°.
- 1848 (b). HASSAL. In : GRAY, 1848, p. 144.
1848. JOHN. In : GRAY, 1848, p. 71.
1848. KOREN, J. og DANIELSSEN, D. Zoologiske Bidrag. In : Nyt Magaz. f. Naturvid., vol. 5, pp. 253-273. Christiania, 1848, 8°. pl. — Résumé en allemand dans : Isis, 1848, pp. 199-210, pl. 2.
1848. LANDSBOROUGH, D. List of Zoophytes found in the West of Scotland. In : Proc. Philos. Soc. Glasgow, vol. 2, pp. 230-241. Glasgow, 1848, 8°.
1848. LEUCKART, R. Ueber die Morphologie und die Verwandtschaftsverhältnisse der wirbellosen Thiere. Ein Beitrag zur Charakteristik und Classification der thierischen Formen. Braunschweig, 1848, 8°.
1848. LEYDIG, F. Die Dotterfurchung nach ihrem Vorkommen in der Thierwelt und nach ihrer Bedeutung. In : Isis, 1848, pp. 161-193, pl. 1. Leipzig, 1848, 4°.

1848. RYLAND. In : GRAY, 1848, p. 71.
1848. SIEBOLD (von), C.-T. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Tiere. In : SIEBOLD (von) und STANNIUS. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie, 1. Teil. Berlin, 1848, 8°.
1848. THOMPSON, J.-V. In : GRAY, 1848, p. 66 et 77.
1849. COCKS, W.-P. Contributions to the fauna of Falmouth. In : 17th ann. Rep. R. Cornwall Polytechnic Soc. (1849), pp. 38-103. Falmouth and London, 1849, 8°.
1849. DESOR, E. Lettre sur la génération médusipare des Polypes Hydriques. adressée à M. Milne EDWARDS. In : Ann. des sc. nat. (3), vol. 12, p. 204-217. pl. 2. Paris, 1849, 8°.
1849. HUXLEY, Th.-H. On the Anatomy and the affinities of the Family of the *Medusæ*. In : R. Soc. Philos. Trans. London, 1849, 4°.
1849. VIGURS. In : COCKS, 1849, p. 90.
- 1850 (a). AGASSIZ, L. Contributions to the natural history of the Acalephæ of North America. P. 1. On the Naked-Eyed Medusæ of the shores of Massachusetts in their perfect states of development. In : Mem. American. Acad. of arts and sc. (new ser.). vol. 4, P. 2, pp. 221-316. Cambridge and Boston, 1850, 4°, pl.
- 1850 (b). AGASSIZ, L. On the morphology of the Medusæ. In : Proc. 3^d Meet. American Ass. adv. Sc. (Charleston 1850), p. 119-122. Charleston, 1850, 8°.
- 1850 (c). AGASSIZ, L. On the structure and homologies of Radiated animals with reference to the systematic position of the Hydroid Polypi. In : Proc. 2^d Meet. American Ass. Adv. Sc. (Cambridge 1849), p. 389-396. Boston, 1850, 8°.
1850. ALLMAN. On the reproductive System of *Cordylophora lacustris* Allm. In : Rep. 19th Meet. Brit. Ass. adv. Sc. (Birmingham 1849), P. 2, p. 72. London, 1850, 8°.
1850. COCKS, W.-P. Contributions to the Fauna of Falmouth.

- In : 8th Ann. Rep. R. Cornwall Polytechnic Soc. (1850), pp. 10-12. Falmouth and London, 1850, 8°.
1850. DUCHASSAING, P. Animaux radiaires des Antilles. Paris 1850, 8°, pl.
- 1850 (a). HANCOCK, A. Notes on a species of *Hydra*, found in the Northumberland Lakes. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., (2), vol. 5, pp. 281-289, pl. 6-7. London, 1850, 8°.
- 1850 (b). HANCOCK, A. Notes on a species of *Hydra*, found in the Northumberland Lakes. In : Trans. Tyneside Naturalists Field Club (1846-50), vol. 1. pp. 405-415, pl. 7-8. Newcastle-upon-Tyne and London, 1850, 8°.
1850. HUXLEY, Th.-H. Notes on Medusæ and Polypes. In : Ann. and Mag. of Nat. Hist., (2), vol. 4, pp. 66-67. London, 1850, 8°.
1850. LAURENT. Sur la production expérimentale de l'œuf de l'Hydre verte et sur une Hydre monstrueuse à deux têtes. In : Compt. rend. Acad. sc., vol. 30, pp. 822-823. Paris, 1850, 4°.
1850. LÜTKEN, C. Nogle Bemærkninger om Medusernes systematiske Inddeling, navnlig med Hensyn til *Forbes's History of british naked-eyed Medusæ*. In : Vidensk. Meddel. fra den Naturhist. Foren. i Kjøbenhavn (1850), pp. 15-35. Kjøbenhavn, 1850, 8°.
1850. SARS, M. Beretning om en i Sommeren 1849 foretagen zoologisk Reise i Lofoten og Finnmarken. 91 pp. Christiania, 1850, 8°. (Tirage à part antidaté. Voir à 1851.)
1850. STEENSTRUP, J. [Sur *Margelis principis*]. In : LÜTKEN, 1850, p. 35.
-

II

PARTIE SYSTÉMATIQUE

CLASSIFICATION ¹

EHRENBERG et HEMPRICH 1828.

PHYTOZOA POLYPT.

Circulus I ANTHOZOA.

Ordo I Zoocorallia.

Tribus I Zoocorallia Polyactinia.

II Zoocorallia Octactinia.

III Zoocorallia Oligactinia.

Fam. *Hydrina*.

¹ Dans les « Matériaux. 1^{re} Période » on doit faire les corrections suivantes :

1^o p. 419. dans la classification de SCHWEIGGER (1820), les genres *Tubularia* *Neomeris* etc., appartiennent à la famille 13, *Ceratophyta tubulosa* et non pas aux *Ceratophyta alcyonea*.

2^o p. 420, dans la Classification de LAMOUROUX. 1821, ajouter, au-dessous de Ord. 3. Cellariées: gen. *Lafoue*.

FLEMING 1828.

INVERTEBRAL ANIMALS.

II. RADIATA.

Class. I ECHINODERMATA.

Class. II ACALEPHA.

1^{re} Sec. Fixed.

2^{me} » Free.

gen. *Geryonia*, etc.

Class. III ZOOPHYTA.

1 Carnosa.

Corallinadæ.

gen. *Alcyonium*.

2 Cellulifera.

3 Thecata.

1 Cellariadæ.

2 Sertulariadæ.

I Base of the cells bread, coalescing with the stem.

a) Celles on opposite sides of the stem.

gen. *Sertularia*, *Dynamena*, *Thuiaria*.

aa) Cells unilateral.

gen. *Antennularia*, *Plumularia*.

II Base of the cells narrow, or pedunculated.

gen. *Campanularia*, etc.

III Sheath membranaceous, the cells are the simple extremities of the branches.

Tubulariadæ.

gen. *Tubularia*, etc.

4 Nuda.

gen. *Coryna*, *Hydra*.

5 Vibratoria.

ESCHSCHOLTZ 1829.

ACALEPHEN

1 Ord. CTENOPHORÆ.

2 Ord. DISCOPHORÆ.

1 Abth. Discophoræ phanerocarpæ.

1 fam. Rhizostomidæ.

gen. *Cassiopea*, *Rhizostoma*, *Cephea*.

2 » Medusidæ.

gen. *Sthenonia*, *Medusa*, *Cyanea*, *Pelagia*,
Chrysaora, *Ephyra*.

2 Abth. Discophoræ cryptocarpæ.

1 fam. Geryonidæ.

gen. *Geryonia*, *Dianæa*, *Linuche*, *Saphenia*,
Eirene, *Lymnorea*, *Faronia*.

2 » Oceanidæ.

gen. *Oceania*, *Callirhoe*, *Thaumantias*, *Tima*,
Cytæis, *Melicertum*, *Phoregnia*.

3 » Aequoridæ.

gen. *Aequorea*, *Mesonema*, *Aegina*, *Cu-*
nina, *Eurybia*, *Polyrenia*.

4 » Berenicidæ.

gen. *Eudora*, *Berenice*.

3 Ord. SIPHONOPHORÆ.

BLAINVILLE 1830.

ZOOPHYTES VRAIS

1^{er} type ACTINOZOAIRE.1^{re} classe Cirrholdermaires.2^{me} » Arachnodermaires.3^{me} » Zoanthaires.4^{me} » Polypiaires.1^{re} s^s-classe Polypiaires calcaires.2^{me} » Polypiaires membraneux.1^{re} famille Operculifères ou Eschariés.2^{me} » Cellariés.3^{me} » Sertulariés.3^{me} s^s-classe Polypiaires douteux.4^{me} » Polypiaires nus ou Hydres.5^{me} classe Zoophytaires ou Cténocères.2^{me} type AMORPHOZOAIRE.3^{me} famille. Polypiaires membraneux phytoïdes ou Sertulariæa.

Cellules tubuleuses à ouvertures arrondies:

Auguinair, *Aulophore*, *Tibiane*, *Neomeris*, *Tubulaire*.

Cellules non tubuleuses campanulées:

Coryne, *Campanulaire*, *Laomédée*.

Cellules non tubuleuses, seriales.

Serialaire, *Plumulaire*.

Cellules non tubuleuses, didymes:

Idie, *Sertulaire*, *Biseriaire*, *Dynamene*, *Tulipaire*.

Cellules non tubuleuses dentiformes, verticillées :

Salacie, *Cymodocée*, *Antennulaire*.

Cellules non tubuleuses dentiformes, éparses:

Thoa, *Entalophore*.

CUVIER 1830.

ZOOPHYTES OU ANIMAUX RAYONNÉS

1^{re} Classe ECHINODERMES.2^{me} Classe INTESTINAUX.3^{me} Classe ACALÈPHES.1^{er} ordre Acalèphes simples.*Méduses*, etc.2^{me} » Acalèphes hydrostatiques.4^{me} Classe POLYPES.1^{er} ordre Polypes charnus.2^{me} » Polypes gélatineux.*Hydra*, *Corine*,3^{me} » Polypes à polypiers.1^{re} fam. Polypes à tuyaux.*Tubulaires*, *Tibianes*, *Cornulaires*, *Campanulaires*, *Sertulaires*.2^{me} fam. Polypes à cellules.3^{me} » Polypes corticaux.5^{me} Classe INFUSOIRES.

JOHNSTON 1832 (a).

Class ZOOPHYTA.

Ord. 1 Carnosa.

» 2 Natantia.

» 3 Tubulifera.

Lobularia, *Alcyonium*.

» 4 Thecata.

Tubularia, *Coryne*, *Campanularia*, *Sertularia*, *Plumularia*, *Antennularia*, *Thuiaria*, *Cellaria*.

» 5 Cellulifera.

» 6 Apolypa.

EHRENBERG 1834.

CURALIA (Polypi Cuvieri ex parte)

ANTHOZOA.

Ord. I Zoocorallia.

Tribus 1. Z. Polyactinia.

» 2. Z. Octactinia.

» 3. Z. Oligactinia

Fam. Hydrina.

Gen. *Hydra*.*Coryna*.

Fam. Tubularina.

Gen. *Syncoryna*.*Tubularia*.*Eudendrium*.*Pennaria*.

Fam. Sertularina.

Gen. *Sertularia*.Subgen. *Monopyxis*.*Podopyxis*.*Peripyxis*.*Sporadopyxis*.

Ord. II Phytocorallia.

BRANDT 1835¹

ACALEPHÆ.

DISCOPHORÆ (Medusidæ).

Monostomæ.

Fam. Oceanidæ.

Gen. *Circe*, *Conis*.

Fam. Aquoridæ.

Gen. *Æquorea*, *Stomobrachiota*, *Mesonema*,
Æginopsis, *Polyxenia*.

Fam. Medusidæ.

Gen. *Phacellophora*, *Cyanea*, *Aurelia*, *Pelagia*,
Chrysaora.

Polystomæ.

Fam. Geryonidæ.

Gen. *Geryonia*, *Proboscidactyla*, *Hippocrene*.

Fam. Rhizostomidæ.

Gen. *Cassiopea*.

Incertæ Sedis Discophoræ.

Fam. Berenicidæ.

Gen. *Staurophora*.

EHRENBERG 1837.

IV. MOLLUSCA.

V. TUBULATA.

Bryozoa.

Dimorphæa = *Sertularina*, *Tubularina*.

Turbellaria.

Nematoidea.

Rotatoria.

Echinoidea.

¹ En 1838, BRANDT a un peu modifié cette classification. Il divise les Méduses en 3 tribus: 1^o MONOSTOMÆ, 2^o POLYSTOMÆ et 3^o ASTOMÆ. Cette dernière tribu renferme seulement la famille des *Berenicidæ*.

VI. RACEMIFERA (RADIATA).

Asteroidea.

Acalephæ.

Anthozoa; *excl. Sertularinis, Tubularinis et Corynæ.*

Trematoda.

Complanata.

Polygastrica.

FARRE 1837.

POLYPL.

Class. Ciliobrachiata [Bryozoaires]

» Nudibrachiata [Hydroides]

» Anthozoa.

JOHNSTON 1838 (b)

ZOOPHYTA HYDROIDA.

Family I Hydridæ.

1. *Hydra*.

Family II Tubulariadae.

2. *Corynæ*.3. *Hermia*.4. *Tubularia*.

Family III Sertulariadae.

5. *Thoa*.6. *Sertularia*.7. *Thuiaria*.8. *Plumularia*.9. *Antennularia*.10. *Laomedæa*.11. *Campanularia*.

HOGG 1840.

Class ZOOPHYTA.

Sub-Class I BINOSCUA.

Tribe I Tentaculis armatis.

Order 1. Ciliotentacula.

Gen. *Flustra*, etc.

Sub-Class II UNOSCUA.

» 2. Noditentacula.

Gen. *Hydra*, *Sertularia*, etc.

» 3. Pinnitentacula.

Gen. *Gorgonia*, etc.

» 4. Glanditentacula.

Gen. *Coryne*.

Tribe II Tentaculis nudatis.

» 5. Planitentacula.

Gen. *Tubularia*, etc.

» 6. Tubitentacula.

Gen. *Actinia*, etc.

DANA 1846.

ZOOPHYTES.

Order I Actinoidea.

» II Hydroidea.

Family I. Hydridæ.

Gen. *Hydra*.

» II. Sertulariæ.

Gen. *Antennularia*, *Plumularia*, *Sertularia*, *Thuiaria*, *Thoa*, *Pasythea*.

» III. Campanulariæ.

Gen. *Laomedea*, *Campanularia*.

» IV. Tubulariæ.

Gen. *Pennaria*, *Tubularia*, *Syncoryna*, *Corydendrium*, *Eudendrium*, *Coryna*, *Hydractinia*.

JOHNSTON 1847.

ANTHOZOA HYDROIDA.

I Tubularina.

Fam. I. Corynidae.

Gen. *Clara*, *Hydractinia*, *Coryne*, *Cordylophora*.

» II. Tubulariæ.

Gen. *Eudendrium*, *Tubularia*, *Corymorpha*.

II Sertularina.

Fam. III. Sertulariæ.

Gen. *Halecium*, *Sertularia*, *Thuiaria*, *Plumularia*, *Antennularia*.

» IV. Campanulariæ.

Gen. *Laomedea*, *Campanularia*.

III. Hydrina.

FORBES 1848.

MEDUSÆ.

I Steganophthalmata.

II Gymnophthalmata.

I Willsiadæ.

g. 1. *Willsia*.

II Oceanidæ.

g. 2. *Turris*, 3. *Saphenia*, 4. *Oceania*.

III. Equoreadæ.

g. 5. *Stomobrachium*, 6. *Polyrenia*.

IV. Circeadæ.

g. 7. *Circe*.

V. Geryoniadæ.

g. 8. *Geryonia*, 9. *Tima*, 10. *Geryonopsis*, 11. *Thaumantias*, 12. *Slabberia*.

VI. Sarsiadæ.

g. 13. *Sarsia*, 14. *Bougainvillea*, 15. *Lizzia*,
16. *Modceria*, 17. *Euphysa*, 18. *Steenstrupia*.

GRAY 1848.

Class. III. ACALEPHA.

Ss-Class. I. Pulmograda.

Ord. 1. Phanerocarpæ.

» 2. Cryptocarpæ.

Fam. 1. Willsiadae.

Gen. *Willsia*.

» 2. Oceanidae.

Gen. *Turris*, *Saphenia*, *Oceania*.

» 3. Æquorea.

Gen. *Æquorea*.

» 4. Circeadae.

Gen. *Circe*.

» 5. Geryoneadae.

Gen. *Thaumantias*, *Slabberia*, *Geryonia*,
Tima.

Fam. 6. Sarsiadae.

Gen. *Bougainvillia*, *Lizzia*, *Moodeeria*, *Sarsia*,
Steenstrupia, *Eulimena*, *Euphysa*, *Polyxenia*.

Ss-Cl. II. Anomala.

Class. IV. ZOOPHYTA.

Ord. 1. Zoantharia.

» 2. Zoophytaria.

» 3. Polypiaria.

Ss-ord. 1. Tubularina.

Fam. 1. Corynidae.

Gen. *Clava*, *Hydractinia*, *Coryne*, *Cordylophora*.

» 2. Tubulariadae.

Gen. *Eudendrium*, *Tubularia*, *Corymopha*.

Ss-ord. 2. Sertularina.

Fam. 3. Sertulariadae.

Gen. *Halecium*, *Sertularella*, *Sertularia*, *Nigellastrum*, *Thuiaria*, *Nemertesia*, *Aglaophenia*, *Epistomia*.

» 4. Campanulariadae.

Gen. *Laomedea*. — *Capsularia*. — *Conchella*. — *Coppinia*. — *Cymodoce*.

» 4. Hydrina.

Fam. 1. Hydridae.

Gen. *Hydra*.

SIEBOLD 1848.

ZOOPHYTA.

Klasse POLYPL.

I Ord. Anthozoa.

Familie: Madreporina.

» Gorgonina.

» Isidea.

» Tubiporina.

» Alcyonina.

» Pematulina.

» Sertularina.

Gattungen: *Sertularia*, *Campanularia*.

» Zoanthina.

» Hydrinä.

Gattungen: *Hydra*, *Eleutheria*, *Synhydra*.*Coryne*, *Syncoryne*, *Corymorpha*.

» Actinina.

II Ord. Bryozoa.

Klasse ACALEPHÆ.

I Ord. Siphonophora.

II Ord. Discophora.

Familie: Æquorina.

» Oceanidæ.

» Geryonidæ.

» Rhizostomidæ.

» Medusidæ.

III Ord. Ctenophora.

ÉTAT DES GENRES ET DES ESPÈCES

HYDROÏDES

Gen. *Acrochordium* MEYEN 1834.

Il est probable que l'animal décrit par MEYEN sous le nom d'*Acrochordium album* est une *Coryne*, comme le supposait L. AGASSIZ (1862). Le genre *Acrochordium* doit donc disparaître.

Gen. *Aglaophenia* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I, p. 422.

COSTA (1839), sans tenir compte de l'orthographe admise, cite l'*A. myriophyllum* sous le nom d'*Aglatophenia myriophyllum*.

Aglaophenia arcuata Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 422.

<i>Aglaophenia arcuata</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 16.
<i>Plumularia arcuata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 478.
»	»	EDWARDS, M.	1836 p. 466.
<i>Aglaophenia arcuata</i>	KRAUSS	1837	p. 24.
<i>Anisocalyx (Aglaophenia)</i>			
<i>arcuata</i>	COSTA	1838	p. 19.

Aglaophenia crucialis Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 422.

<i>Aglaophenia crucialis</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 17.
<i>Plumularia brachiata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 442.
<i>Plumularia crucialis</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
<i>Plumularia brachiata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 478.
<i>Plumularia crucialis</i>	BLAINVILLE	1834	p. 478.
<i>Plumularia brachiata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 163.
<i>Anisocalyx (Aglaophenia)</i>			
<i>crucialis</i>	COSTA	1838	p. 19.

Aglaophenia cupressina Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 422.

<i>Aglaophenia cupressina</i>	LAMOUROUX	1824 (b)	p. 612, pl. 91, fig. 1-3.
» »	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 16.
<i>Plumularia bipinnata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 442.
<i>Plumularia cupressina</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
<i>Plumularia bipinnata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 478.
<i>Plumularia cupressina</i>	BLAINVILLE	1834	p. 478.
<i>Plumularia bipinnata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 162.
<i>Anisocalyx (Aglaophenia)</i>			
<i>cupressina</i>	COSTA	1838	p. 19.

[*Aglaophenia dichotoma* Kirchenpauer 1872.]

<i>Plumularia cristata</i> var.	JOHNSTON	1838 (b)	p. 145, pl. 20, fig. 4.
» » »	JOHNSTON	1847	p. 94, pl. 24, fig. 4.

Aglaophenia elongata Meneghini.

<i>Aglaophenia elongata</i>	MENEGHINI.	1845	p. 12, pl. 13, fig. 2.
-----------------------------	------------	------	------------------------

Aglaophenia filamentosa (Lamarek).

Voir : Matériaux I, p. 422.

<i>Plumularia filamentosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
» »	BLAINVILLE	1834	p. 478.
» »	EDWARDS, M.	1836	p. 136.

Aglaophenia flexuosa Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 422.

<i>Aglaophenia flexuosa</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 16.
<i>Plumularia flexuosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 478.
»	»	EDWARDS, M.	1836 p. 166.
<i>Anisocalyx (Aglaophenia)</i>			
<i>flexuosa</i>	COSTA	1838	p. 19.

[*Aglaophenia fusca* Kirchenpauer 1872.]

Voir : Matériaux I, p. 423.

? <i>Aglaophenia hypnoides</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 19.
? <i>Plumularia hypnoides</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
? »	»	BLAINVILLE	1830 p. 479.
? <i>Plumularia hypnoides</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 168.

Aglaophenia myriophyllum Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 423.

<i>Aglaophenia myriophyllum</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 17.
<i>Sertularia myriophyllum</i>	BENNETT OLIVIER	1826	p. 186.
»	»	FLEMING	1826 p. 305.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	RISSE	1826	p. 312.
»	»	FLEMING	1828 p. 347.
»	»	STARK	1828 p. 440.
<i>Sertularia myriophyllum</i>	CHIAJE (delle)	1828-30 vol. 4,	p. 130, 145, pl. 63, fig. 2.
<i>Plumularia myriophylla</i>	BLAINVILLE	1830	p. 441.
<i>Sertularia myriophyllum</i>	CUVIER	1830	p. 301.
<i>Plumularia myriophylla</i>	BLAINVILLE	1834	p. 477, pl. 83, fig. 4, 4a.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 159.
<i>Plumularia myriophylla</i>	TEMPLETON	1836	p. 466.
<i>Anisocalyx myriophyllum</i>	COSTA	1838	p. 10.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 148, pl. 19, fig. 4-5.

<i>Aglatopenia myriophyllum</i>	COSTA	1839	p. 185.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	COUCH	1841	p. 44.
»	HASSAL	1841 (b)	p. 285.
<i>Sertularia myriophyllum</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 9, 17, pl. 157, fig. 2, 13.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 145.
»	HYNDMANN	1842	p. 20, note.
»	MACGILLIVRAY	1842	p. 465.
»	COUCH	1844	p. 36, pl. 9.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Aglaophenia myriophyllum</i>	MENEGHINI	1845	p. 12, pl. 13, fig. 1.
»	DENOTARIS	1846	p. 77.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	JOHNSTON	1847	p. 99, 118, pl. 23, fig. 4-5.
»	LANDSBOROUGH	1847	p. 292, 366, fig. p. 300.
<i>Aglaophenia myriophyllum</i>	GRAY	1848	p. 81.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	LANDSBOROUGH	1848	p. 232.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	COCKS	1849	p. 93.

Aglaophenia patagonica (d'Orbigny).

<i>Plumularia patagonica</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	p. 27, pl. 13, fig. 3-6.
------------------------------	--------------	---------	--------------------------

[*Aglaophenia patula* Kirchenpauer 1872]

Voir : Matériaux I, p. 424.

Aglaophenia pelagica Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 424.

<i>Aglaophenia pelagica</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 18.
<i>Plumularia pelagica</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 167.
<i>Anisocalyx (Aglaophenia) pelagica</i>	COSTA	1838	p. 19.

Aglaophenia pennatula Lamouroux.

Voir : Matériaux I. p. 424.

<i>Aglaophenia pennatula</i>	LAMOUROUX	1824 (c) p. 17.
<i>Plumularia pennatula</i>	FLEMING	1828 p. 546.
»	BLAINVILLE.	1830 p. 442.
<i>Sertularia pennatula</i>	CUVIER	1830 p. 301.
<i>Plumularia pennatula</i>	BLAINVILLE	1834 p. 478.
»	EDWARDS. M.	1836 p. 161. 165 (Excl. syn.).
<i>Aglaophenia pennatula</i>	KRAUSS	1837 p. 25.
<i>Anisocalyx (Aglaophenia) pennatula</i>	COSTA	1838 p. 19.
<i>Plumularia pennatula</i>	JOHNSTON	1838 (b) p. 445, pl. 18, fig. 1, 2.
»	THOMPSON	1840 p. 251.
»	COUCH	1841 p. 42.
»	HASSAL	1841 (b) p. 372.
»	COUCH	1844 p. 33.
»	THOMPSON	1844 p. 283.
»	JOHNSTON	1847 p. 94, pl. 22, fig. 1, 2.
<i>Aglaophenia pennatula</i>	GRAY	1848 p. 79.
<i>Plumularia pennatula</i>	COCKS	1849 p. 92.

Aglaophenia pluma Lamouroux.

Voir : Matériaux I. p. 425.

<i>Sertularia pluma</i>	SCHWEIGGER	1819 p. 19.
<i>Aglaophenia pluma</i>	LAMOUROUX	1824 (c) p. 17.
<i>Sertularia pluma</i>	BENNET et OLIVIER	1826 p. 188.
<i>Plumularia cristata</i>	RISSE	1826 p. 313.
<i>Plumularia pluma</i>	FLEMING	1828 p. 546.
<i>Plumularia cristata</i>	STARK	1828 p. 440.
<i>Sertularia pluma</i>	CHIAJE (delle)	1828-30 vol. 4. p. 127. 145. pl. 63. fig. 1.
<i>Plumularia pluma</i>	BLAINVILLE	1830 p. 441.
<i>Sertularia pluma</i>	CUVIER	1830 p. 301.
<i>Plumularia pluma</i>	BLAINVILLE	1834 p. 477.

<i>Sertularia pluma</i>	LISTER	1834	p. 369, pl. 8, fig. 2.
<i>Plumularia cristata</i>	MEYEN	1834	p. 207.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 161.
»	TEMPLETON	1836	p. 467.
<i>Plumularia pluma</i>	EDWARDS, M.	1836-49	pl. 67, fig. 5.
»	JOHNSTON	1837	p. 244, fig.
<i>Aglaophenia pluma</i>	KRAUSS	1837	p. 25.
<i>Anisocalyx pluma</i>	COSTA	1838	p. 1.
<i>Plumularia cristata</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 143, pl. 19, fig. 1-3 et (?) pl. 20, fig. 1.
»	COUCH	1841	p. 41.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 169.
»	HASSAL	1841 (b)	p. 285.
<i>Sertularia pluma</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 8, 17, pl. 157, fig. 1, 12, 23.
<i>Plumularia pluma</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 145.
<i>Plumularia cristata</i>	LANDSBOROUGH	1842	p. 259.
»	KROHN	1843	p. 180.
<i>Plumularia pluma</i>	WESTENDORP	1843	p. 33.
<i>Plumularia cristata</i>	COUCH	1844	p. 31, pl. 8.
»	FORBES	1844	p. 387, 389.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Aglaophenia pluma</i>	MENEGHINI	1845	p. 12, 15, pl. 12.
»	DENOTARIS	1846	p. 77.
<i>Plumularia cristata</i>	STEENSTRUP	1846	p. 67.
»	JOHNSTON	1847	p. 92, pl. 23, fig. 1-3 et (?), pl. 24, fig. 1.
<i>Aglaophenia pluma</i>	NARDO	1847 (a)	p. 8.
<i>Plumularia cristata</i>	THOMAS	1847	p. 471.
»	LANDSBOROUGH	1848	p. 232.
»	COCKS	1849	p. 92.

[*Aglaophenia Savignyana* Kirchenpauer 1872]

Voir : Matériaux I, p. 426.

Aglaophenia simplex (d'Orbigny).

Plumularia simplex ORBIGNY (d') 1839-46 p. 27, pl. 13, fig. 1-2.

Aglaophenia speciosa Lamouroux.

Voir : Matériaux I. p. 426.

<i>Aglaophenia speciosa</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 18.
<i>Plumularia speciosa</i>	BLAINVILLE	1830 p. 443.
» »	BLAINVILLE	1834 p. 478.
» »	EDWARDS, M.	1836 p. 167.
<i>Anisocalyx (Aglaophenia) speciosa</i>	COSTA	1838 p. 19.

Aglaophenia spicata Lamouroux.

Voir : Matériaux I. p. 426.

<i>Aglaophenia spicata</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 15.
<i>Plumularia spicata</i>	BLAINVILLE	1830 p. 443.
» »	BLAINVILLE	1834 p. 478.
» »	EDWARDS, M.	1836 p. 166.

Aglaophenia uncinata (Lamarck).

Voir : Matériaux I. p. 426.

<i>Aglaophenia pennaria</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 16 (Excl. syn.).
<i>Plumularia uncinata</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 161.
<i>Aglaophenia uncinata</i>	MENEGLINI	1845 p. 12.

Aglaophenia urceolifera (Lamarck).

Voir : Matériaux I. p. 427.

<i>Plumularia urceolifera</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 160.
-------------------------------	-------------	--------------

[*Aglaophenia urens* Kirchenpauer 1872.]

Voir : Matériaux I. p. 427.

? <i>Plumularia scabra</i>	BLAINVILLE	1830 p. 443.
? » »	BLAINVILLE	1834 p. 478.
? » »	EDWARDS, M.	1836 p. 164.

Gen. *Alcyonidium* Lamouroux 1813.

Ce genre, créé par LAMOUROUX dans son « Essai sur les genres de la famille des Thalassiophytes non articulées, Paris, 1813 » a été repris par JOHNSTON (1838 b) qui y fait rentrer l'*Alcyonidium echinatum*. Cette espèce est synonyme d'*Hydractinia echinata*. Le genre *Alcyonidium* ne rentre pas dans la classe des Hydroïdes.

Gen. *Alcyonium* Linné 1758.

FLEMING (1828) a fait rentrer dans ce genre l'*Alcyonium echinatum* qui est synonyme d'*Hydractinia echinata*. Ce genre ne doit pas figurer parmi les Hydroïdes.

Gen. *Anguinaria* Lamarck 1816.

BLAINVILLE (1830) a cru devoir placer ce genre parmi les *Sertulariæa*, mais il ne renferme pas d'Hydroïdes.

Gen. *Aram* Vigurs 1849 et 1853.

Ce genre est synonyme de *Myriothele* M. Sars.

Gen. *Anopora* Goldfuss sec. Blainville 1830.

Ce genre ne renferme que des espèces fossiles et pas d'Hydroïdes. Il avait été rangé par BLAINVILLE dans la famille des *Sertulariæa* et doit être supprimé.

Gen. *Biseriaria* Blainville 1830.

Ce genre, étant synonyme de *Thuiaria* (FLEMING 1828), doit être supprimé.

Gen. *Bougainvillia* Lesson 1836.

Le nom de *Bougainvillia* a été appliqué d'abord, par LESSON, à une Méduse. ALLMAN (1864) a ensuite donné ce nom à la forme Polype de cette Méduse.

[*Bougainvillia ramosa* Allman 1864.]

<i>Eudendrium ramosum</i>	BENEDEN (van)	1844 (b) p. 41 et p. 56. pl. 4.
»	BENEDEN (van)	1844 (c) p. 313.
»	DUJARDIN	1845 (b) p. 270.
<i>Tubularia (Sertularia) ramosa</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1, p. 64. pl. 11. fig. 1-8.
<i>Eudendrium ramosum</i>	LÜTKEN	1850 p. 34.

Gen. *Campanularia* Lamarck 1816.

Clytia Lamouroux 1812. — *Laomedea* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I. p. 428.

[*Campanularia antipathes* Bâle 1884.]*Laomedea antipathes* Lamouroux.

Voir : Matériaux I. p. 429.

<i>Laomedea antipathes</i>	FLEMING	1820 p. 88.
»	DESLONGCHAMPS	1824 p. 481.
»	BLAINVILLE	1830 p. 439.
»	BLAINVILLE	1834 p. 474.
<i>Sertularia antipathes</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 138.
»	EDWARDS, M.	1836-49 pl. 67, fig. 1.
<i>Laomedea antipathes</i>	DUCHASSAING	1850 p. 22.

Campanularia brasiliensis Meyen.

<i>Campanularia brasiliensis</i>	MEYEN	1834 p. 198. pl. 32, fig. 5.
»	EDWARDS, M.	1836 p. 136.

Campanularia dichotoma Lamarck.*Laomedea dichotoma* Lamouroux.[*Obelia dichotoma* Hincks 1868.]

Voir: Matériaux I. p. 429.



<i>Sertularia dichotoma</i>	SCHWEIGER	1819	p. 19.
»	FLEMING	1820	p. 88.
<i>Laomedea dichotoma</i>	DES LONGCHAMPS	1824	p. 482.
<i>Sertularia dichotoma</i>	BENNETT et OLIVIER	1826	p. 193.
<i>Campanularia dichotoma</i>	GRANT	1826	p. 150.
»	RISSE	1826	p. 309.
<i>Laomedea dichotoma</i>	RISSE	1826	p. 314.
<i>Sertularia dichotoma</i>	HOGG	1827	p. 33.
<i>Campanularia dichotoma</i>	FLEMING	1828	p. 548.
»	STARK	1828	p. 444.
<i>Sertularia dichotoma</i>	CHIAJE (delle)	1828-30	vol. 4, p. 126, 146, pl. 63, fig. 7.
<i>Laomedea dichotoma</i>	BLAINVILLE	1830	p. 439.
<i>Sertularia dichotoma</i>	CUVIER	1830	p. 300.
<i>Campanularia dichotoma</i>	JOHNSTON	1832 (a)	p. 255.
<i>Laomedea dichotoma</i>	BLAINVILLE	1834	p. 474.
<i>Campanularia dichotoma</i>	JOHNSTON	1834	p. 407.
»	MEYER	1834	p. 193, pl. 30, fig. 1-4 et pl. 31, fig. 1-2.
»	GRANT	1835-41	p. 10, fig. 5.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 132.
? <i>Sertularia dichotoma</i>	EHRENBERG	1836 (b)	p. 3.
<i>Campanularia dichotoma</i>	TEMPLETON	1836	p. 466.
»	EDWARDS, M.	1836-49	pl. 66- fig. 1.
<i>Laomedea dichotoma</i>	COSTA	1838	p. 15, pl. 10, fig. 2 aA.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 150, pl. 22, fig. 1-2.
»	COSTA	1839	p. 185.
»	COUCH	1841	p. 46.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 169.
<i>Sertularia dichotoma</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 7, 18, pl. 157, fig. 7, 18, 19.
<i>Campanularia dichotoma</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 143.

<i>Laomedea dichotoma</i>	MAGILLIVRAY	1842	p. 465.
<i>Campanularia dichotoma</i>	KROHN	1843	p. 176, 178.
" "	WESTENDORP	1843	p. 24.
<i>Laomedea dichotoma</i>	COUCH	1844	p. 37.
" "	THOMPSON	1844	p. 283.
" "	FORSTER	1847	p. 22.
<i>Laomedea dichotoma</i> var. α	JOHNSTON	1847	p. 102 et 466, pl. 26. fig. 1, 2.
? <i>Campanularia dichotoma</i>	LEUCKART	1847 (a)	p. 138.
<i>Laomedea dichotoma</i>	THOMAS	1847	p. 472
<i>Laomedea dichotoma</i> var. α	GRAY	1848	p. 83.
<i>Laomedea dichotoma</i>	LAND-SBOROUGH	1848	p. 233.
<i>Laomedea dichotoma</i> var. α	COCKS	1849	p. 93

[*Campanularia flexuosa* Hincks 1868.]

Voir: Matériaux I, p. 430.

?*Sertularia Monopyxis* *geniculata*

	EHRENBERG	1834	p. 297.
<i>Laomedea gelatinosa</i> var. α	JOHNSTON	1847	p. 104, pl. 25, fig. 3, 4.
? <i>Monopyxis geniculata</i>	NARDO	1847 (a)	p. 8.
<i>Laomedea gelatinosa</i> var. α	GRAY	1848	p. 85.

Campanularia gelatinosa Fleming.

Laomedea gelatinosa Lamouroux.

[*Obelia gelatinosa* Hincks 1868.]

Voir: Matériaux I, p. 430.

<i>Sertularia gelatinosa</i>	FLEMING	1822	vol. 2, p. 616, pl. 5. fig. 3.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 482.
<i>Sertularia gelatinosa</i>	BENNET et OLIVIER	1826	p. 190.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	FLEMING	1828	p. 549.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 439.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	JOHNSTON	1832 (a)	p. 254.
" "	JOHNSTON	1832 (b)	p. 631.

<i>Laomedea gelatinosa</i>	BLAINVILLE	1834	p. 475.
<i>Campanularia Flemingii</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 433.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 434.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 152, pl. 21, fig. 3, 4 et pl. 23, fig. 1.
»	THOMPSON	1840	p. 251.
»	COUCH	1841	p. 47.
»	GOULD	1841	p. 350.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 169.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	HASSAL	1841 (b)	p. 281.
»	HASSAL	1842	p. 342.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	MACGILLIVRAY	1842	p. 465.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	KROHN	1843	p. 177.
»	WESTENDORP	1843	p. 25.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	COUCH	1844	p. 39, pl. 10, fig. 2.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
»	FORSTER	1847	p. 22.
<i>Laomedea gelatinosa</i> var. β	JOHNSTON	1847	p. 104, pl. 27, fig. 1.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	LEUCKART	1847 (a)	p. 438. note.
? <i>Laomedea gelatinosa</i>	THOMAS	1847	p. 472.
<i>Laomedea gelatinosa</i> var. β	GRAY	1848	p. 85.
<i>Laomedea Flemingii</i>	GRAY	1848	p. 85.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	LANDSBOROUGH	1848	p. 233.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	DESOR	1849	p. 207, pl. 2, fig. 7-12.

Campanularia geniculata Fleming.*Laomedea geniculata* Lamouroux.[*Obelia geniculata* Allman 1864.]

Voir : Matériaux I, p. 430.

<i>Sertularia geniculata</i>	SCHWEIGGER	1819	p. 18-19.
»	FLEMING	1820	p. 88.
<i>Laomedea geniculata</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 482.
<i>Sertularia geniculata</i>	HOFFMANN	1824	p. 258.
»	BENNET et OLIVIER	1826	p. 192.
»	HOGG	1827	p. 33.

<i>Campanularia geniculata</i>	FLEMING	1828	p. 348.
<i>Sertularia geniculata</i>	CHIAJE (delle)	1828-30	vol. 4, p. 126, 143, pl. 64, fig. 28.
<i>Laomedea geniculata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 439.
<i>Sertularia geniculata</i>	CUVIER	1830	p. 300.
<i>Campanularia geniculata</i>	JOHNSTON	1832 (a)	p. 255.
<i>Laomedea geniculata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 474.
<i>Campanularia geniculata</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
? <i>Campanularia geniculata</i>	MEYEN	1834	p. 195, pl. 31, fig. 3-5.
<i>Campanularia prolifera</i>	MEYEN	1834	p. 198, pl. 33, fig. 1-5.
<i>Campanularia Carolinii</i>	EDWARDS. M.	1836	p. 133.
<i>Sertularia prolifera</i>	EDWARDS. M.	1836	p. 139.
<i>Sertularia geniculata</i>	EDWARDS. M.	1836	p. 149.
<i>Laomedea geniculata</i>	TEMPLETON	1836	p. 466.
<i>Campanularia geniculata</i>	EDWARDS. M.	1836-49	pl. 66, fig. 2.
<i>Laomedea geniculata</i>	COSTA	1838	p. 16.
» »	JOHNSTON	1838 (b)	p. 151, pl. 21, fig. 1, 2.
» »	COSTA	1839	p. 185.
» »	COUCH	1841	p. 46.
» »	HASSAL	1841 (a)	p. 169.
<i>Sertularia geniculata</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 8, 18, pl. 166, fig. 22, 24, 28.
<i>Campanularia caulinii</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 143.
<i>Laomedea geniculata</i>	LANDSBOROUGH	1842	p. 258.
» »	MACGILLIVRAY	1842	p. 465.
<i>Campanularia carolinii</i>	KROHN	1843	p. 176.
<i>Campanularia geniculata</i>	WESTENDORP	1843	p. 25, pl. fig. c, d.
<i>Laomedea geniculata</i>	COUCH	1844	p. 38, pl. 10, fig. 1.
» »	THOMPSON	1844	p. 283.
» »	COUCH	1845	p. 163.
» »	FORSTER	1847	p. 22.
» »	JOHNSTON	1847	p. 103, pl. 25, fig. 1, 2.
» »	LANDSBOROUGH	1847	p. 366.
? <i>Campanularia geniculata</i>	LEUCKART	1847 (a)	p. 138.
<i>Laomedea geniculata</i>	THOMAS	1847	p. 472.
» »	GRAY	1848	p. 84.
» »	LANDSBOROUGH	1848	p. 233.
» »	COCKS	1849	p. 93.

Campanularia integra Macgillivray.

<i>Campanularia integra</i>	MACGILLIVRAY	1842	p. 465.
? <i>Campanularia laevis</i>	COUCH	1844	p. 42.
<i>Campanularia integra</i>	THOMPSON	1844	p. 283.
»	JOHNSTON	1847	p. 109, pl. 28, fig. 2.
<i>Capsularia integra</i>	GRAY	1848	p. 86.
? <i>Capsularia laevis</i>	GRAY	1848	p. 87.
<i>Campanularia integra</i>	COCKS	1849	p. 93.

Campanularia Lairii M. Edwards.*Laomedea Lairii* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 431.

<i>Laomedea Lairii</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 482.
»	BLAINVILLE	1830	p. 439.
»	BLAINVILLE	1834	p. 474.
<i>Campanularia Lairii</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 135.

Campanularia macrocythara Blainville.*Clytia macrocyttara* Lamouroux.

<i>Clytia macrocyttara</i>	LAMOUREUX	1824 (b)	p. 617, pl. 93, fig. 4, 5.
»	LAMOUREUX	1824 (b)	p. 202.
<i>Campanularia macrocythara</i>	BLAINVILLE	1830	p. 437.
<i>Campanularia macrocythara</i>	BLAINVILLE	1834	p. 473.
<i>Campanularia macrocythara</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 135.

Campanularia maior Meyen.

<i>Campanularia maior</i>	MEYEN	1834	p. 196, pl. 32, fig. 1, 4.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 135.

Campanularia oliracea M. Edwards.*Clytia oliracea* Lamouroux.*Laomedea oliracea* Blainville.

Voir Matériaux I. p. 432.

<i>Clytia oliracea</i>	LAMOUROUX	1824 (c) p. 201.
<i>Laomedea oliracea</i>	BLAINVILLE	1830 p. 440.
»	BLAINVILLE	1834 p. 475.
<i>Campanularia oliracea</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 134.

Campanularia reptans Blainville.*Laomedea reptans* Lamouroux.

Voir : Matériaux I. p. 432.

<i>Laomedea reptans</i>	DESLONGCHAMPS	1824 p. 483.
<i>Campanularia reptans</i>	BLAINVILLE	1830 p. 437.
»	BLAINVILLE	1834 p. 473.
<i>Sertularia reptans</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 139.

Campanularia syringa Lamarck.*Clytia syringa* Lamouroux.[*Calycella syringa* Hincks 1868.]

Voir : Matériaux I. p. 432.

<i>Clytia syringa</i>	LAMOUROUX	1824 (c) p. 202.
<i>Sertularia syringa</i>	BENNET et OLIVIER	1826 p. 191.
<i>Sertularia repens</i>	HOGG	1827 p. 33.
<i>Campanularia syringa</i>	FLEMING	1828 p. 348.
»	BLAINVILLE	1830 p. 437.
»	JOHNSTON	1832 (a) p. 256.
»	BLAINVILLE	1834 p. 472.
»	JOHNSTON	1834 p. 107.
»	LOVÉN	1835 p. 262. Note.
»	EDWARDS, M.	1836 p. 132.
»	JOHNSTON	1838 (b) p. 155, fig. 48.
»	THOMPSON	1840 p. 231.
»	COUCH	1841 p. 48.

<i>Campanularia syringa</i>	HASSAL	1844 (a)	p. 169.
»	»	MAGILLIVRAY	1842 p. 465.
<i>Clytia syringa</i>	WESTENDORP	1843	p. 24.
<i>Campanularia syringa</i>	BENEDEN (VIII)	1844 (a)	p. 37, pl. 3, fig. 9.
»	»	COUCH	1844 p. 41.
»	»	THOMPSON	1844 p. 283.
»	»	FORSTER	1847 p. 22.
»	»	JOHNSTON	1847 p. 110.
»	»	THOMAS	1847 p. 472.
<i>Sertularia (Campanularia) syringa</i>	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 223, pl. 12, fig. 9, 10.
<i>Capsalaria syringa</i>	GRAY	1848	p. 86 et 151.
<i>Campanularia syringa</i>	COCKS	1849	p. 93.

Campanularia undulata M. Edwards.

Clytia undulata Lamouroux.

<i>Clytia undulata</i>	LAMOUREUX	1824 (b)	p. 617, pl. 94, fig. 4, 5.
»	»	LAMOUREUX	1824 (c) p. 202.
<i>Campanularia undulata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 135.

Campanularia urnigera Blainville.

Clytia urnigera Lamouroux.

Voir : Matériaux I. p. 433.

<i>Clytia urnigera</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 202.
<i>Campanularia urnigera</i>	BLAINVILLE	1830	p. 437.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 473.
»	»	EDWARDS, M.	1836 p. 135.

Campanularia verticillata Lamarck.

Clytia verticillata Lamouroux.

Laomedea verticillata Blainville.

Voir : Matériaux I. p. 433.

<i>Sertularia verticillata</i>	FLEMING	1820	p. 89.
<i>Clytia verticillata</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 210.

<i>Sertularia verticillata</i>	HOGG	1827	p. 34.
<i>Campanularia verticillata</i>	FLEMING	1828	p. 550.
»	»	STARK	1828 p. 441.
<i>Laomedea verticillata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 439.
<i>Sertularia verticillata</i>	CUVIER	1830	p. 300.
<i>Laomedea verticillata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 475.
<i>Campanularia verticillata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 131.
»	»	TEMPLETON	1836 p. 466.
»	»	JOHNSTON	1838 (b) p. 156, pl. 22, fig. 3, 4.
<i>Campanularia verticillata</i>	COUCH	1841	p. 49.
<i>Campanularia verticillata</i>	HASSAL	1841 (a)	p. 169.
»	»	COUCH	1844 p. 42, pl. 11, fig. 4.
»	»	THOMPSON	1844 p. 283.
»	»	JOHNSTON	1847 p. 112, pl. 26, fig. 3, 4.
»	»	THOMAS	1847 p. 472.
<i>Sertularia (Campanularia) verticillata</i>	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 218, pl. 12, fig. 4-8.
<i>Capsularia verticillata</i>	GRAY	1848	p. 87.
<i>Campanularia verticillata</i>	COCKS	1849	p. 93.

Campanularia volubilis (Linné)¹.

Voir : Matériaux I. p. 433.

<i>Campanularia volubilis</i>	SCHWEIGGER	1819	Tab. VIII.
<i>Sertularia volubilis</i>	FLEMING	1820	p. 88.
»	»	BENNET et OLIVIER	1826 p. 190.
<i>Campanularia volubilis</i>	RISSE	1826	p. 309.
<i>Sertularia volubilis</i>	HOGG	1827	p. 34.
<i>Campanularia volubilis</i>	FLEMING	1828	p. 548.
»	»	BLAINVILLE	1830 p. 437.
<i>Sertularia volubilis</i>	CUVIER	1830	p. 300.
<i>Campanularia volubilis</i>	BLAINVILLE	1834	p. 472, pl. 84, fig. 2, 2 a.
<i>Sertularia volubilis</i>	KIRBY	1835	p. XII et 169, pl. 2, fig. 2.

¹ Dans les « Matériaux, 1^{re} période, » p. 434, supprimer: *Sertularia volubilis* FABRICIUS 1780, p. 444.

<i>Campanularia volubilis</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 132.
»	»	TEMPLETON	1836 p. 466.
»	»	HASSAL	1841 (a) p. 169.
»	»	HYNDMANN	1842 p. 20.
»	»	MAGGILLIVRAY	1842 p. 465.
»	»	THOMPSON	1844 p. 283.
»	»	LEUCKART	1847 (a) p. 138.
»	»	LANDSBOROUGH	1848 p. 233.

Gen. *Campanulina* van Beneden 1847.

Campanulina tenuis van Beneden.

Campanulina tenuis BENEDEN (VAN) 1847 p. 457. pl. fig. 6.

Gen. *Candelabrum* Blainville 1830.

BLAINVILLE a créé ce genre pour y placer la *Lucernaria phrygia* de FABRICIUS (1780). Mais il n'indique pas de nom spécifique pour cette espèce et ne donne aucune diagnose du genre. Le nom de *Candelabrum* a donc été abandonné et a fait place à celui de *Myriothele* Sars.

Gen. *Capsularia* Cuvier 1798.

GRAY (1848) a essayé, mais sans succès, de reprendre ce genre en en faisant à peu près le synonyme de *Campanularia*.

Gen. *Cellaria* Ellis et Solander 1786.

Modifier comme suit l'article *Cellaria* des Matériaux. 1^{re} période, p. 434 :

Le genre *Cellaria* a été établi par ELLIS et SOLANDER pour des animaux appartenant aux Bryozoaires. LAMARCK (1816) a fait rentrer dans ce genre trois Hydroïdes auxquels il donne les noms de *Cellaria pectinata*, *C. thuia* et *C. lonchitis*. Le premier

est synonyme d'*Idia pristis* Lmx; les deux derniers seront placés plus tard dans le genre *Thuiaria* de FLEMING (1828). LAMOUREUX (1812) mettait le genre *Cellaria* dans la famille des Sertulariées. Aujourd'hui, ce genre ne fait plus partie des Hydroïdes.

Gen. *Cladonema* Dujardin 1843.

DUJARDIN a décrit sous le nom de *Cladonema radiatum* une Méduse provenant d'un Polype qu'il appelait Stauridie [*Stauridium*]. HINCKS (1862) a montré que l'on devait donner le nom de *Cladonema* au Polype produisant la Méduse décrite par DUJARDIN et réserver le nom de *Stauridium* pour un autre genre de Polype.

Cladonema radiatum Dujardin.

<i>Cladonema radiatum</i>	DUJARDIN	1843 p. 1134.
<i>Stauridie</i>	DUJARDIN	1843 p. 1133.
»	DUJARDIN	1845 (b) p. 271, pl. 14, fig. C.
<i>Cladonema</i>	DUJARDIN	1845 (b) p. 272, pl. 14, fig. C. pl. 45, fig. C.

Gen. *Clara* Gmelin 1788.

Voir : Matériaux I. p. 435.

Clara multicornis (Forskål).

Voir : Matériaux I. p. 435.

<i>Coryna multicornis</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 221.
»	BLAINVILLE	1830 p. 436.
<i>Hydra multicornis</i>	CUVIER	1830 p. 296.
<i>Coryna multicornis</i>	BLAINVILLE	1834 p. 474.
<i>Coryne multicornis</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 73.
<i>Synecoryna multicornis</i>	EHRENBERG	1836 (b) p. 2.
<i>Coryne multicornis</i>	TEMPLETON	1836 p. 449.
? <i>Coryne squamata</i> .	COLCH	1844 p. 28.
? »	HASSAL	1844 (h) p. 283, pl. 6, fig. 1.

<i>Coryna multicornis</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 59.
<i>Coryne squamata</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 7, 8, 41, 59, 60, pl. 5.
<i>Coryna squamata</i>	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 314.
<i>Coryne squamata</i>	COUCH	1844	p. 11, pl. 1, fig. 1, 2.
<i>Clava multicornis</i>	THOMPSON	1844	p. 283 (Excl. Syn.).
» » pp.	JOHNSTON	1847	p. 30, pl. 1, fig. 1-3.
<i>Synecoryne multicornis</i>	LEUCKART	1847 (a)	p. 137.
? <i>Clava multicornis</i>	THOMAS	1847	p. 467.
» » pp.	GRAY	1848	p. 60 (Excl. Syn. pp.).
» »	LANDSBOROUGH	1848	p. 230.
» »	COCKS	1849	p. 91.

Clava squamata (Müller)

Voir : Matériaux 1, p. 435.

<i>Coryna squamata</i>	FLEMING	1820	p. 87, note.
» »	FLEMING	1822	vol. 2, p. 616, pl. 5, fig. 1.
<i>Hydra squamata</i>	GUEMANN	1824	p. 169.
<i>Coryna squamata</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 221.
<i>Coryna pistillaris</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 222.
<i>Coryna squamata</i>	FLEMING	1828	p. 553.
<i>Coryne squamata</i>	STARK	1828	p. 443.
<i>Coryna squamata</i>	RAPP	1829 (a)	p. 15.
<i>Corina squamata</i>	SARS	1829	p. 1.
<i>Coryna squamata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 436.
<i>Clava parasitica</i>	BLAINVILLE	1830	p. 437.
<i>Coryna squamata</i>	CODSTREAM	1830	p. 234.
<i>Tabularia affinis</i>	CUVIER	1830	p. 296.
<i>Hydra squamata</i>	CUVIER	1830	p. 296.
<i>Coryna squamata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 471.
<i>Coryna multicornis</i>	EHRENBERG	1834	p. 293.
<i>Coryne squamata</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
» »	EDWARDS, M.	1836	p. 73.
<i>Coryna squamata</i>	WAGNER	1836	p. 5, 13, pl. 1, fig. 1.
<i>Coryne squamata</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 109, pl. 2, fig. 1-3.
» »	MAGILLIVRAY	1842	p. 463.

<i>Coryna squamata</i>	RATHKE	1844	p. 155.
»	DUJARDIN	1845 (b)	p. 270.
»	SARS	1846	p. 2, 5. 13.
<i>Coryne squamata</i>	STEENSTRUP	1846	p. 66, 68, pl. 1. fig. 17-21.
<i>Clara multicornis</i> pp.	JOHNSTON	1847	p. 30.
<i>Coryne squamata</i>	FREY U. LEUCKART	1847	p. 23 note, 27, 28. 31.
»	LEUCKART	1847 (a)	p. 137.
»	WAGENER	1847	p. 499.
<i>Clava multicornis</i> pp.	GRAY	1848	p. 60 (Excl. Syn. p.p.).
<i>Coryne squamata</i>	LÜTKEN	1850	p. 21.
<i>Clava parasitica</i>	LÜTKEN	1850	p. 33.

Il ne paraît nullement certain, jusqu'à présent, que la *Clara multicornis* soit réellement distincte de la *C. squamata*. Il règne, à cet égard, une confusion dans les descriptions des auteurs et il est possible que de nouvelles recherches permettent, plus tard, de réunir ces deux espèces.

Gen. *Clytia* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I, p. 436.

[*Clytia Johnstoni* Alder 1858.]

Clytia volubilis (Ellis et Solander) Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 436.

Cette espèce figure sous le nom de *Clytia volubilis* dans les Matériaux I, p. 436. Bien que ce nom, donné par LAMOUROUX, ait la priorité, il est préférable d'adopter, ainsi que le font les auteurs modernes, le nom de *Clytia Johnstoni* Alder, afin d'éviter une nouvelle confusion avec la *Campanularia volubilis*.

<i>Clytia volubilis</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 202.
<i>Campanularia volubilis</i>	JOHNSTON	1832 (a)	p. 255.
»	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 154, fig. 17.

<i>Campanularia volubilis</i>	COUCH	1841	p. 48.	
? <i>Glytia volubilis</i>	WESTENDORP	1843	p. 23.	
<i>Campanularia volubilis</i>	BENEDEN (van)	1844 (a)	p. 36. pl. 3. fig. 7. 8.	
»	»	COUCH	1844	p. 40. pl. 11. fig. 1.
<i>Glytia volubilis</i>	DENOTARIS	1846	p. 77.	
<i>Campanularia volubilis</i>	BENEDEN (van)	1847	p. 457. pl. fig. 7.	
»	»	FORSTER	1847	p. 22.
»	»	JOHNSTON	1847	p. 107. fig. 18.
»	»	NARDO	1847 (a)	p. 8.
»	»	THOMAS	1847	p. 472.
<i>Capsularia volubilis</i> p. p.	GRAY	1848	p. 86 (Excl. Syn. p. p.).	
<i>Campanularia volubilis</i>	COCKS	1849	p. 93.	
<i>Glytia volubilis</i>	DUCHASSAING	1850	p. 22.	

Gen. *Conchella* Gray 1848.

GRAY a établi ce genre pour y placer la *Campanularia intertexta* de COUCH (Syn. de *Sertularia Campanularia arcta* Dalyell). Ce genre étant synonyme de *Coppinia*, doit disparaître.

Gen. *Coppinia* Hassal 1848.

LEVINSEN (1892) a montré que ce genre devait disparaître, car les espèces qui la composent ne sont que des gonosomes appartenant à des Hydroïdes du genre *Lafea* et des genres voisins. Néanmoins, comme on n'a pas encore déterminé les espèces auxquelles on doit rattacher les différentes *Coppinies* décrites jusqu'à présent, nous conserverons provisoirement le genre *Coppinia*.

Coppinia arcta (Dalyell).

? <i>Campanularia intertexta</i>	COUCH	1844	p. 41. pl. 11. fig. 2.
? »	JOHNSTON	1847	p. 109.
<i>Sertularia arcta</i>	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 224. pl. 42.
<i>Conchella intertexta</i>	GRAY	1848	p. 88.
<i>Coppinia mirabilis</i>	HASSAL	1848 (a)	p. 2223.
»	HASSAL	1848 (b)	p. 144.

Gen. *Cordylophora* Allman 1844.

Ce genre a été créé par ALLMAN pour y placer une espèce vivant dans l'eau douce.

Cordylophora lacustris Allman.

<i>Cordylophora lacustris</i>	ALLMAN	1844 (b) p. 330.
<i>Cordylophora</i>	BENEDEN (van)	1844 (c) p. 310 (Excl. Syn.).
<i>Cordylophora lacustris</i>	THOMPSON	1844 p. 283, 285.
»	QUATREFAGES	1845 p. 118.
»	JONHSTON	1847 p. 44, fig. 5.
»	GRAY	1848 p. 62, 150.
»	ALLMAN	1850 p. 72.

Gen. *Corydendrium* van Beneden 1844.

Voir : Matériaux I, p. 437.

Corydendrium parasiticum (Linné) van Beneden.¹

Voir : Matériaux I, p. 437.

<i>Sertularia parasitica</i>	SCHWEIGGER	1819 p. 19.
»	CHIAJE (delle)	1828-30 vol. 4, p. 124, 148. pl. 64, fig. 47.
<i>Syncoryna parasitica</i>	EIRENBERG	1834 p. 295.
<i>Sertularia parasitica</i>	CHIAJE (delle)	1841-44 vol. 5, p. 7, 18, 143. pl. 166, fig. 17-18.
<i>Syncoryna parasitica</i>	KROHN	1843 p. 178.
<i>Sertularia parasitica</i>	BENEDEN (van)	1844 (b) p. 41, 45.
<i>Corydendrium parasiticum</i>	BENEDEN (van)	1844 (c) p. 313.
<i>Sertularia (Syncoryne) parasitica</i>	FREY H. LEUCKART	1847 p. 28.

¹ Dans les « Matériaux, 1^{re} période » p. 437, supprimer : *Sertularia parasitica* FABICIUS 1780 p. 447.

Gen. *Corymorpha* Sars 1835.[*Corymorpha nana* Alder 1857.]

<i>Hydractinia</i>	ALDER	1847	p. 463, fig. 79 a.
<i>Hydractinia</i> ? (<i>alderi</i>)	GRAY	1848	p. 61.

Corymorpha nutans Sars.

<i>Corymorpha nutans</i>	SARS	1835	p. 7, pl. 1, fig. 3 a. g. 3
»	LOVÉN	1835	p. 279.
<i>Ellisia flosmaris</i>	FORBES & GOODSIR	1840	p. 309.
<i>Corymorpha nutans</i>	FORBES & GOODSIR	1840	p. 309.
»	STEENSTRUP	1842	p. 21, 24, 25 (trad. allemande), pl. 1, fig. 47.
»	THOMPSON	1844	p. 285.
»	SARS	1846	p. 10, 14.
»	FREY & LEUCKART	1847	p. 24.
»	JOHNSTON	1847	p. 54, pl. 7, fig. 3, 6.
»	GRAY	1848	p. 65.
»	LÜTKEN	1850	p. 34.

Gen. *Coryne* Gaertner 1774.

Voir : Matériaux I, p. 437.

Coryne muscoides (Linné).[*Coryne vaginata* Hincks 1861].

Voir : Matériaux I, p. 438.

<i>Tubularia muscoides</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 758.
<i>Coryne</i>	LISTER	1834	p. 376, pl. 10, fig. 3.
? <i>Hermia glandulosa</i>	HASSAL	1844 (b)	p. 283, pl. 6, fig. 2.
<i>Coryne ramosa</i>	JOHNSTON	1847	p. 42, pl. 6, fig. 4, 7.
<i>Coryne pusilla</i> var. <i>muscoides</i> .	JOHNSTON	1847	Expl. pl. 6, fig. 4, 7.
<i>Coryne pusilla</i> var. <i>c</i>	GRAY	1848	p. 62.

Coryne pusilla Gaertner.

Voir : Matériaux I. p. 438.

<i>Coryna glandulosa</i>	FLEMING	1820	p. 87 note.
»	FLEMING	1822	vol. 2. p. 616. pl. 5. fig. 2.
»	FLEMING	1823 (b)	p. 295.
<i>Coryna prolifica</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 224.
<i>Coryna glandulosa</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 222.
<i>Tubularia coryna</i>	BENNET et OLIVIER	1826	p. 177.
<i>Coryna glandulosa</i>	FLEMING	1828	p. 553.
<i>Stipula ramosa</i>	SARS	1829	p. 4. pl. 1, fig. 1. 2.
<i>Coryna glandulosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 436.
<i>Coryna prolifica</i>	BLAINVILLE	1830	p. 436.
<i>Coryne pusilla</i>	CUVIER	1830	p. 296.
<i>Coryne glandulosa</i>	JOHNSTON	1832 (a)	p. 253.
»	JOHNSTON	1832 (b)	p. 631.
<i>Coryna glandulosa</i>	BLAINVILLE	1834	p. 471, pl. 85. fig. 3. 3 a.
<i>Coryna prolifica</i>	BLAINVILLE	1834	p. 472.
<i>Syncoryna pusilla</i>	EHRENBERG	1834	p. 294.
<i>Syncoryna ramosa</i>	EHRENBERG	1834	p. 295.
<i>Coryne glandulosa</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 74.
<i>Syncorina ramosa</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 74, note.
<i>Coryne prolifica</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 75.
<i>Hernia glandulosa</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 111 et p. 109, fig. 12. pl. 4. fig. 1, 2.
»	THOMPSON	1840	p. 249.
<i>Coryne glandulosa</i>	THOMPSON	1840	p. 250.
<i>Hernia glandulosa</i>	COUCH	1841	p. 29.
<i>Syncoryna ramosa</i>	KROHN	1843	p. 175.
? <i>Syncoryna glandulosa</i>	KROHN	1843	p. 178.
<i>Syncoryna ramosa</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 25. 41. 55.
»	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 313.
<i>Syncoryna pusilla</i>	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 313.

<i>Hermia glandulosa</i>	COUCH	1844	p. 12, pl. 1, fig. 3.
<i>Coryne pusilla</i>	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Syncoryna ramosa</i>	SARS	1846	p. 2, 3, 10.
<i>Coryne pusilla</i>	JOHNSTON	1847	p. 39, pl. 2.
<i>Coryne Listerii</i>	JOHNSTON	1847	p. 41, pl. 2 (Excl. syn.)
? <i>Coryne pusilla</i>	THOMAS	1847	p. 467.
<i>Coryna glandulosa</i>	DALYELL	1847-48	vol. 2, p. 69, pl. 21, 22.
<i>Coryne pusilla</i> p. p.	GRAY	1848	p. 61.
<i>Coryne pusilla</i> var. <i>b</i> , p. p.	GRAY	1848	p. 62.
<i>Coryne pusilla</i>	LANDSBOROUGH	1848	p. 230.
» »	COCKS	1849	p. 91.
? <i>Coryne ramosa</i>	COCKS	1849	p. 91.
? <i>Coryne Loreni</i>	LÜTKEN	1850	p. 32.

[*Coryne van Benedeni* Hincks 1868].

<i>Syncoryna pusilla</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 38, 41, 53, pl. 3, fig. 1, 10.
» »	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 313.
<i>Coryne pusilla</i> , var.	JOHNSTON	1847	p. 41, pl. 4, fig. 1, 2.
<i>Coryne pusilla</i> , var. <i>a</i>	GRAY	1848	p. 62 (Ex. syn. p. p.).

Gen. *Danacea* d'Orbigny 1839-46.

D'ORBIGNY en décrivant sa *Thoa Edwardsiana* dit que cette espèce lui paraît devoir former un genre nouveau, et il ajoute : « En attendant que ce genre puisse être plus amplement étudié, je proposerai de le nommer *Danæa*, et l'espèce *Danæa Edwardsiana*. » Le caractère sur lequel d'ORBIGNY se basait pour établir ce nouveau genre est que les tiges de cette espèce ne sont pas « simples, mais formées de tubes réunis. » Or ce caractère se retrouve chez plusieurs espèces d'*Halecium* et l'on a vu (Matériaux I, p. 478) que *Thoa* est synonyme d'*Halecium*. Il n'y a donc aucune raison de maintenir le genre *Danacea*.

[Gen. *Diphasia* L. Agassiz 1862].

Voir : Matériaux I. p. 439.

[*Diphasia attenuata* Hincks 1866].

Voir : Matériaux I, p. 439.

? *Lily* or *Pomegranate* flo-

<i>wering</i> <i>Coralline</i>	ELLIS	1755 (c) p. 9, pl. 4. fig. c.
<i>Sertularia pinaster</i> var.	JOHNSTON	1847 p. 72, fig. 12, c. d.
<i>Sertularia rosacea</i>	JOHNSTON	1847 p. 470.
» »	THOMAS	1847 p. 468.
<i>Sertularia pinnaster</i>	THOMAS	1847 p. 470.

[Gen. *Diplura* Allman 1864.]

Ce genre a été créé par ALLMAN pour y placer la *Coryne fritillaria* de STEENSTRUP.

[*Diplura fritillaria* Allman 1864.]

<i>Coryne fritillaria</i>	STEENSTRUP	1842 p. 20 (trad. allemande) pl. 1. fig. 41-46.
<i>Coryna fritillaria</i>	RATHKE	1844 p. 164.
» »	SARS	1846 p. 14.
<i>Coryne fritillaria</i>	STEENSTRUP	1846 p. 66.
» »	FREY U. LEUCKART	1847 p. 24.
<i>Clara fritillaria</i>	LUTKEN	1850 p. 34.

Gen. *Dynamena* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I. p. 439.

GRAY (1843), p. 294) écrit *Dynamene*. Sa *Dynamene abietinoides* est, d'après BALE (1884), synonyme de *Sertularia elongata*.

Dynamena barbata Lamouroux.[*Sertularia barbata* Bale 1884].

Voir : Matériaux I. p. 439.

<i>Sertularia ciliata</i>	LAMARCK	1816	p. 121.
<i>Dynamena barbata</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 289.
»	BLAINVILLE	1830	p. 449.
»	BLAINVILLE	1834	p. 484.
<i>Sertularia ciliata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 451.

Dynamena distans Lamouroux.*Sertularia Lamourousii* M. Edwards.

Voir : Matériaux I. p. 440.

<i>Dynamena distans</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 290.
»	BLAINVILLE	1830	p. 449.
»	BLAINVILLE	1834	p. 484.
<i>Sertularia Lamourousii</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 453.
? <i>Dynamena distans</i>	WESTENDORP	1843	p. 27.

Dynamena disticha Lamouroux.*Sertularia disticha* Bosc.

Voir : Matériaux I. p. 440.

<i>Dynamena disticha</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 290.
»	BLAINVILLE	1830	p. 449.
<i>Sertularia disticha</i>	CUVIER	1830	p. 304.
<i>Dynamena disticha</i>	BLAINVILLE	1834	p. 484.
<i>Sertularia disticha</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 454.
<i>Dynamena disticha</i>	DUCHASSAING	1850	p. 22.

Dynamena divergens Lamouroux.*Sertularia divergens* M. Edwards.

Voir : Matériaux I. p. 440.

<i>Dynamena divergens</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 290.
»	BLAINVILLE	1830	p. 449.
»	BLAINVILLE	1834	p. 484.
<i>Sertularia divergens</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 453.

Dynamena Eransii Lamouroux.*Sertularia Eransii* Ellis et Solander.

Voir : Matériaux I, p. 440.

<i>Dynamena Eransii</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 289.
» »	FLEMING	1828 p. 545.
<i>Dynamena Ecanii</i>	BLAINVILLE	1830 p. 448.
» »	BLAINVILLE	1834 p. 484.
<i>Sertularia Eransii</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 154.
<i>Dynamena Eransii</i>	COSTA	1838 p. 20, pl. 8, fig. 4 a. A.
<i>Sertularia Eransii</i>	JOHNSTON	1838 (b) p. 127.
» »	THOMPSON	1844 p. 285.
» »	JOHNSTON	1847 p. 67.
» »	GRAY	1848 p. 71.

Dynamena obliqua Lamouroux.*Sertularia obliqua* M. Edwards.

Voir : Matériaux I, p. 440.

<i>Dynamena obliqua</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 290.
» »	BLAINVILLE	1830 p. 449.
» »	BLAINVILLE	1834 p. 484.
<i>Sertularia obliqua</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 154.

Dynamena operculata Lamouroux.*Sertularia operculata* Linné.

Voir : Matériaux I, p. 441.

<i>Sertularia operculata</i>	SCHWEIGGER	1819 Tab. VIII.
<i>Dynamena operculata</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 288.
<i>Sertularia operculata</i>	BENNET ET OLIVIER	1826 p. 182.
» »	HOGG	1827 p. 32.
<i>Dynamena operculata</i>	FLEMING	1828 p. 544.
» »	BLAINVILLE	1830 p. 447.
<i>Sertularia operculata</i>	CUVIER	1830 p. 301.
» »	JOHNSTON	1832 (a) p. 258, pl. 11, fig. 2.

<i>Dynamena operculata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 483, pl. 83, fig. 5. 5 a.
<i>Sertularia operculata</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
<i>Dynamena operculata</i>	ORRIGNY (d')	1834	p. 150.
<i>Sertularia operculata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 144.
» »	TEMPLETON	1836	p. 468.
<i>Dynamena operculata</i>	EDWARDS, M.	1836-49	pl. 67, fig. 4.
» »	KRAUSS	1837	p. 27.
<i>Sertularia operculata</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 132, pl. 11, fig. 2, 2*.
<i>Sertularia operculata</i>	COUCH	1841	p. 35.
» »	HASSAL	1841 (a)	p. 168.
» »	MAGILLIVRAY	1842	p. 464.
<i>Dynamena operculata</i>	WESTENDORP	1843	p. 26.
<i>Sertularia operculata</i>	COUCH	1844	p. 23.
» »	FORBES	1844	p. 388.
» »	THOMPSON	1844	p. 283.
» »	FORSTER	1847	p. 22.
» »	JOHNSTON	1847	p. 77, pl. 14, fig. 2, 2*.
» »	LANDSBOROUGH	1847	p. 366.
» »	THOMAS	1847	p. 471.
» »	GRAY	1848	p. 73.
» »	LANDSBOROUGH	1848	p. 231.
» »	LOCKS	1849	p. 92.

Dynamena pinaster Lamouroux.

Sertularia pinaster Ellis et Solander.

Voir : Matériaux I, p. 442.

<i>Sertularia pectinata</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 680.
<i>Dynamena pinaster</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 288.
<i>Sertularia pectinata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 445.
<i>Dynamena pinaster</i>	BLAINVILLE	1830	p. 448.
<i>Sertularia pinastrum</i>	CUVIER	1830	p. 301.
<i>Sertularia pectinata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 481.
<i>Dynamena pinaster</i>	BLAINVILLE	1834	p. 484.
<i>Sertularia pectinata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 140.
<i>Sertularia margarita</i>	HASSAL	1841 (b)	p. 284, pl. 6, fig. 3-4.
<i>Sertularia pinaster</i>	THOMPSON	1844	p. 283.

<i>Sertularia pinaster</i>	JOHNSTON	1847	p. 71.
<i>Sertularia margareta</i>	JOHNSTON	1847	p. 72.
»	THOMAS	1847	p. 470.
»	GRAY	1848	p. 71.
<i>Sertularia pinaster</i>	GRAY	1848	p. 71.
<i>Sertularia pectinuta</i>	GRAY	1848	p. 73.
<i>Sertularia margareta</i>	JOHN	1848	p. 71.
<i>Sertularia margarita</i>	JOHN	1848	p. 71.
<i>Sertularia Tudori</i>	RYLAND	1848	p. 71.
<i>Sertularia margareta</i>	COCKS	1849	p. 92.

Dynamena pulchella d'Orbigny.

<i>Dynamena pulchella</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	p. 26, pl. 11, fig. 9-11.
---------------------------	--------------	---------	---------------------------

Dynamena pumila Lamouroux.

Sertularia pumila Linné.

Voir : Matériaux 1, p. 442.

<i>Sertularia thua</i>	FABRICIUS	1780	p. 444.
<i>Sertularia pumila</i>	SCHWEIGGER	1819	p. 19.
»	FABRICIUS	1824	p. 34.
<i>Dynamena pumila</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 290.
<i>Sertularia pumila</i>	BENNETT OLIVIER	1826	p. 181.
»	HOGG	1827	p. 32.
<i>Dynamena pumila</i>	FLEMING	1828	p. 544.
<i>Sertularia pumila</i>	STARK	1828	p. 440.
»	CHIAJE (delle)	1828	vol. 4, p. 128, 142. pl. 63, fig. 10.
<i>Dynamena pumila</i>	BLAINVILLE	1830	p. 448.
<i>Sertularia pumila</i>	CUVIER	1830	p. 301.
»	JOHNSTON	1832 (a)	p. 257.
<i>Dynamena pumila</i>	BLAINVILLE	1834	p. 484.
<i>Sertularia pumila</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	LISTER	1834	p. 371, pl. 8, fig. 3.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 145.
»	TEMPLETON	1836	p. 468.
<i>Dynamena pumila</i>	EDWARD, M.	1836-49	pl. 67; fig. 3.

<i>Dynamena pumila</i>	KRAUSS	1837	p. 28.
»	COSTA	1838	p. 22 [? pl. 8, fig. 3].
<i>Sertularia pumila</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 125, pl. 9, fig. 3, 4.
»	COSTA	1839	p. 185.
»	COUCH	1841	p. 33.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 168.
»	HASSAL	1841 (b)	p. 282, 284, pl. 6, fig. 5.
»	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 8, 18, 144, pl. 157, fig. 10, 22, 23.
»	HASSAL	1842	p. 342.
»	LANDSBOROUGH	1842	p. 257.
»	MACGILLIVRAY	1842	p. 463.
<i>Dynamena pumila</i>	WESTENDORP	1843	p. 26.
<i>Sertularia pumila</i>	COUCH	1844	p. 19.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
»	COUCH	1845	p. 164.
»	DUJARDIN	1845 (b)	p. 262.
<i>Dynamena pumila</i>	DENOTARIS	1846	p. 77.
<i>Sertularia pumila</i>	FORSTER	1847	p. 21.
»	JOHNSTON	1847	p. 66, pl. 11, fig. 3, 4.
»	LANDSBOROUGH	1847	p. 366.
<i>Dynamena pumila</i>	NARDO	1847 (a)	p. 8.
<i>Sertularia pumila</i>	THOMAS	1847	p. 469.
»	DALYELL	1847-48	vol. 1, pl. 161, pl. 26, fig. 14, 21.
»	GRAY	1848	p. 70.
»	LANDSBOROUGH	1848	p. 231.
»	COCKS	1849	p. 92.

Dynamena rosacea Lamouroux.

Sertularia rosacea Linné.

[*Diphasia rosacea* L. Agassiz 1862.]

Voir : Matériaux I, p. 444.

<i>Dynamena rosacea</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 289.
<i>Sertularia rosacea</i>	HOGG	1827	p. 32.
<i>Dynamena rosacea</i>	FLEMING	1828	p. 544.
»	BLAINVILLE	1830	p. 448.

<i>Sertularia rosacea</i>	CUVIER	1830	p. 301.
»	JOHNSTON	1832 (a)	p. 258.
<i>Dynamena rosacea</i>	BLAINVILLE	1834	p. 484.
<i>Sertularia rosacea</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 145.
»	TEMPLETON	1836	p. 468.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 124, pl. 9, fig. 1, 2.
»	COSTA	1839	p. 185.
»	COUCH	1841	p. 33.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 167.
»	MACGILLIVRAY	1842	p. 463.
<i>Dynamena rosacea</i>	WESTENDORP	1843	p. 27.
<i>Sertularia rosacea</i>	COUCH	1844	p. 18.
»	FORBES	1844	p. 388, pl. 10, fig. 8.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
»	COUCH	1845	p. 165.
»	FORSTER	1847	p. 24.
»	JOHNSTON	1847	p. 64, pl. 11, fig. 1.
»	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 159, pl. 26, fig. 1, 43.
»	GRAY	1848	p. 69.
»	COCKS	1849	p. 92.

Cette espèce a été pendant longtemps confondue avec la *Diphasia attenuata*. Le principal caractère permettant de les distinguer est la structure des gonothèques. Mais, comme beaucoup d'auteurs ne donnent pas de renseignements à ce sujet, il est probable que plusieurs des citations mentionnées dans la synonymie de cette espèce devraient figurer dans celle de *Diphasia attenuata*.

Dynamena sertularioides Lamouroux.

[*Sertularia sertularioides* Bale 1884.]

Voir : Matériaux I. p. 445.

<i>Dynamena sertularioides</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 289.
»	BLAINVILLE	1830	p. 449.
»	BLAINVILLE	1834	p. 485.

Dynamena tubiformis Lamouroux.*Sertularia tubiformis* M. Edwards.

Voir : Matériaux I. p. 445.

<i>Dynamena tubiformis</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 289.
»	»	BLAINVILLE	1830 p. 449.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 485.
<i>Sertularia tubiformis</i>	EDWARDS. M.	1836	p. 453.

Cette espèce, dont on ne connaît pas le gonosome, est très douteuse. JOHNSTON (1847, p. 73) l'indiquait, avec un point d'interrogation, comme synonyme de *Sertularia fallax*. MARK-TANNER-TURNERETSCHER (1890, p. 248), croit qu'on peut la rapporter au *Synthecium campylocarpum* d'ALLMAN.

Dynamena turbinata Lamouroux.*Sertularia turbinata* M. Edwards.

Voir : Matériaux I. p. 445.

<i>Dynamena turbinata</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 290.
»	»	BLAINVILLE	1830 p. 449.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 484.
<i>Sertularia turbinata</i>	EDWARDS. M.	1836	p. 454.

Gen. *Dysmorphosa* Philippi 1842.

Ce genre a été créé par PHILIPPI pour une espèce, *D. conchicola*, qu'ALLMAN considère comme synonyme d'*Hydractinia echinata*. SARS et KROHN sont d'un avis différent et regardent *Dysmorphosa conchicola* comme synonyme de *Podocoryne carnea*. Cette dernière opinion paraît d'autant plus acceptable que la *Podocoryne carnea* est une espèce très commune à Naples. Le genre *Dysmorphosa* doit donc disparaître.

Gen. *Echinocorium* Hassal 1841.

Ce genre étant synonyme d'*Hydractinia* doit disparaître.

Gen. *Electra* Lamouroux sec. Schweigger 1819.

SCHWEIGGER (1819) faisait rentrer le genre *Electra* de LAMOUROUX dans les *Sertulariæ*. Mais la seule espèce appartenant à ce genre ne fait pas partie des Hydroïdes.

Gen. *Ellisia* Forbes et Goodsir 1840.

Ce nom est synonyme de *Corymorpha*. FORBES lui-même l'a abandonné après avoir eu connaissance du travail de SARS (1835). WESTENDORP (1843) a également créé un genre *Ellisia* dans lequel il place l'*E. rugosa*, synonyme de *Sertularella rugosa*. Il n'y a aucune raison pour conserver ce nom d'*Ellisia*.

Gen. *Epistomia* Gray 1848.

Le genre *Epistomia* que GRAY place dans la famille des *Sertulariadae* ne renferme pas d'Hydroïdes et doit par conséquent disparaître.

Gen. *Eudendrium* Ehrenberg 1834.

Voir : Matériaux I, p. 445.

Eudendrium racemosum (Cavolini) Ehrenberg.

Voir : Matériaux I, p. 446.

<i>Sertularia racemosa</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 683.
<i>Sertularia ramosa</i>	RUSO	1826	p. 310.
<i>Sertularia racemosa</i>	CHIAJE (delle)	1828-30	vol. 4, p. 123, 142, pl. 63, fig. 4.
<i>Sertularia ramosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 445.
<i>Sertularia racemosa</i>	CUVIER	1830	p. 301.
<i>Sertularia ramosa</i>	BLAINVILLE	1834	p. 480.

<i>Eudendrium racemosum</i>	EHRENBERG	1834	p. 296.
<i>Campanularia racemosa</i>	EDWARDS. M.	1836	p. 134.
<i>Sertularia racemosa</i>	COSTA	1838	p. 9.
<i>Pyramena racemosa</i>	COSTA	1839	p. 185.
<i>Sertularia racemosa</i>	CHIAJE (delle)	1844-44	vol. 5, p. 6, 18, pl. 157, fig. 4, 26, pl. 166, fig. 23.
<i>Campanularia racemosa</i>	CHIAJE (delle)	1844-44	vol. 5, p. 143, pl. 104, fig. 24.
<i>Eudendrium racemosum</i>	KROHN	1843	p. 178-181.
<i>Sertularia (Eudendrium) racemosum</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 5.
<i>Eudendrium racemosum</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 12.
»	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 314.
»	KÖLLIKER	1847	p. 49, pl. 2, fig. 20.

Eudendrium rameum (Pallas) Thompson.

Voir : Matériaux I, p. 446.

? <i>Thoa Savignyi</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 742.
? »	BLAINVILLE	1830	p. 452.
? »	BLAINVILLE	1834	p. 488.
? <i>Tubularia ramosa</i> var.	JOHNSTON	1834	p. 107.
<i>T. ramea</i>			
? <i>Thoa Savignyi</i>	EDWARDS. M.	1836	p. 147.
<i>Tubularia ramea</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 117, pl. 5, fig. 1, 2.
»	COUCH	1841	p. 30.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 167.
»	MACGILLIVRAY	1842	p. 463.
»	COUCH	1844	p. 15.
<i>Eudendrium rameum</i>	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Tabularia ramea</i>	FÖRSTER	1847	p. 21.
<i>Eudendrium rameum</i>	JOHNSTON	1847	p. 45, pl. 5, fig. 1, 2.
»	THOMAS	1847	p. 467.
<i>Tubularia (Sertularia) ramea</i>	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 50, pl. 6-10.
<i>Halecium rameum</i>	GRAY	1848	p. 67.
<i>Eudendrium rameum</i>	COCKS	1849	p. 92.

Eudendrium ramosum (Linné) Ehrenberg.¹

Voir : Matériaux I, p. 446.

<i>Sertularia volubilis</i>	FABRICIUS	1780	p. 444.
<i>Tubularia ramosa</i>	SCHWEIGGER	1819	p. 49, tab. VIII.
» »	FLEMING	1820	p. 86.
» »	DESLONGCHAMPS	1824	p. 758.
<i>Tubularia trichoides</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 758.
<i>Fistulana ramosa</i>	FABRICIUS	1824	p. 31.
<i>Tubularia ramosa</i>	BENNET ON OLIVIER	1826	p. 175.
» »	HOGG	1827	p. 34.
» »	FLEMING	1828	p. 552.
» »	STARK	1828	p. 441.
» »	RAPP	1829 (a)	p. 15.
» »	BLAINVILLE	1830	p. 435.
<i>Tubularia trichoides</i>	BLAINVILLE	1830	p. 435.
<i>Tubularia ramosa</i>	CUVIER	1830	p. 299.
<i>Tubularia trichoides</i>	CUVIER	1830	p. 299.
<i>Tubularia ramosa</i>	JOHNSTON	1832 (a)	p. 253, pl. 40.
» »	BLAINVILLE	1834	p. 470, pl. 80, fig. 3. 3 a.
<i>Tubularia trichoides</i>	BLAINVILLE	1834	p. 470.
<i>Eudendrium ramosum</i>	EHRENBURG	1834	p. 296.
<i>Tubularia ramosa</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
» »	EDWARDS, M.	1836	p. 126.
» »	TEMPLETON	1836	p. 466.
» »	JOHNSTON	1838 (b)	p. 116.
» »	THOMPSON	1840	p. 250, note.
» »	COUCH	1841	p. 30.
» »	GOULD	1841	p. 350.
» »	WESTENDORP	1843	p. 36.
» »	COUCH	1844	p. 14.
<i>Eudendrium ramosum</i>	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Tubularia ramosa</i>	DENOTAMS	1846	p. 77.
<i>Eudendrium ramosum</i>	STEENSTRUP	1846	p. 67.

¹ Dans les « Matériaux, 1^{re} période » p. 446, supprimer : *Fistulana ramosa* FABRICIUS 1820 p. 444.

<i>Eudendrium ramosum</i>	JOHNSTON	1847	p. 46, pl. 6, fig. 1-3.
»	LEUCKART	1847 (a)	p. 137.
»	NARDO	1847 (a)	p. 8.
»	THOMAS	1847	p. 467.
»	GRAY	1848	p. 63.
»	COCKS	1849	p. 92.

Gen. *Filillum* Hincks 1868.

Ce genre a été créé par HINCKS pour y placer la *Campanularia serpens* de HASSAL.

[*Filillum serpens* (Hassal) Hincks 1868.]

<i>Campanularia serpens</i>	HASSAL	1848 (a)	p. 2223.
<i>Capsularia serpens</i>	GRAY	1848	p. 151.

[Gen. *Gonothyræa* Allman 1864.]

Voir : Matériaux I, p. 448.

[*Gonothyræa Loveni* Allman 1864.]

Voir : Matériaux I, p. 448.

<i>Sertularia dichotoma</i>	LISTER	1834	p. 372, pl. 9 et pl. 10, fig. 4.
<i>Campanularia dichotoma</i>	LISTER	1834	p. 386, pl. 9 et pl. 10, fig. 4.
<i>Sertularia geniculata</i>	LOVÉN	1835	p. 261, pl. 6, 7.
<i>Campanularia geniculata</i>	LOVÉN	1835	p. 281, pl. 6, 7.
»	STEENSTRUP	1842	p. 27 (trad. allemande) pl. 1, fig. 48, 57.
»	KROHN	1843	p. 175-181.
»	BENEDEX (van)	1844 (a)	p. 34, pl. 3, fig. 1-6.
<i>Campanularia dichotoma</i>	BENEDEX (van)	1844 (b)	p. 41.
<i>Campanularia geniculata</i>	STEENSTRUP	1846	p. 65, 67.
»	FREY U. LEUCKART	1847	p. 24, 31.
»	LÜTKEN	1850	p. 32, 33.

Gen. *Halecina* J. V. Thompson 1848.

D'après GRAY (1848, p. 66), l'*Halecium halecinum* est décrit sous le nom d'*Halecina Ellisii* dans un manuscrit de J. V. THOMPSON. Ce nom n'a jamais été adopté.

Gen. *Halecium* Oken 1815.

Voir : Matériaux I, p. 448.

Nous avons fait rentrer dans ce genre les espèces de *Thoa* décrites par d'ORBIGNY (voir : *Thoa*) et qui demandent à être étudiées de nouveau.

Halecium Beani Johnston.

<i>Thoa Beani</i>	JOHNSTON	1838 (b) p. 120, pl. 7, fig. 1, 2.
» »	THOMPSON	1840 p. 250.
» »	HASSAL	1841 (a) p. 167.
» »	HYNDMANN	1842 p. 20.
» »	FORBES	1844 p. 388, pl. 10, fig. 12, 13.
» »	THOMPSON	1844 p. 283.
<i>Halecium Beani</i>	JOHNSTON	1847 p. 59, pl. 9, fig. 1, 2.
<i>Thoa Beani</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1, p. 169.
<i>Sertularia (Thoa) Beani</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1, pl. 31.
<i>Halecium Beani</i>	GRAY	1848 p. 67.

Halecium Edwardsianum (d'Orbigny).

<i>Thoa Edwardsiana</i>	ORBIGNY (d')	1839-46 p. 25, pl. 12, fig. 6, 8.
<i>Danaea Edwardsiana</i>	ORBIGNY (d')	1839-46 p. 25, pl. 12, fig. 6, 8.

Halecium halecinum Oken¹.

Voir : Matériaux I, p. 448.

<i>Halecium halecinum</i>	SCHWÆIGGER	1819 Tab. VIII.
<i>Sertularia halecina</i>	FLEMING	1820 p. 89.

¹ Dans les « Matériaux, 1^{re} période » p. 449, supprimer : *Sertularia halecina* FABRICIUS 1780 p. 443.

<i>Thoa halecina</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 742.
<i>Sertularia halecina</i>	FABRICIUS	1824	p. 33.
<i>Sertularia palecina</i>	HOGG	1827	p. 32.
<i>Sertularia halecina</i>	FLEMING	1828	p. 542.
<i>Thoa halecina</i>	BLAINVILLE	1830	p. 452.
<i>Sertularia halecina</i>	CUVIER	1830	p. 302.
<i>Sertularia halecina</i>	JOHNSTON	1832 (a)	p. 259, pl. 12, fig. 2.
<i>Thoa halecina</i>	BLAINVILLE	1834	p. 488, pl. 84, fig. 4, 4 a.
»	JOHNSTON	1834	p. 107.
<i>Sertularia halecina</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 146.
<i>Thoa halecina</i>	TEMPLETON	1836	p. 468.
<i>Thoa halecina</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 119, pl. 6.
»	COUCH	1844	p. 31.
<i>Thoa halecina</i>	HASSAL	1841 (a)	p. 167.
»	MAGGILLIVRAY	1842	p. 463.
<i>Thoa halecina</i>	WESTENDORP	1843	p. 30.
»	COUCH	1844	p. 15, pl. 3.
»	FORBES	1844	p. 388.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
»	BENEDEN (van)	1847	p. 449, pl. fig. 1.
»	FORSTER	1847	p. 21.
<i>Halecium halecinum</i>	JOHNSTON	1847	p. 58, pl. 8.
<i>Thoa halecina</i>	LANDSBOROUGH	1847	p. 366.
<i>Sertularia halecina</i>	LEUCKART	1847 (a)	p. 137.
<i>Thoa halecina</i>	NARDO	1847 (a)	p. 8.
<i>Halecium halecinum</i>	THOMAS	1847	p. 468.
<i>Sertularia halecina</i>	DALYELL	1847-48	vol. 1, pl. 162, pl. 27, 30.
<i>Halecium halecinum</i>	GRAY	1848	p. 66.
»	LANDSBOROUGH	1848	p. 231.
<i>Halecina Ellisii</i>	THOMPSON	1848	p. 66.
<i>Halecium halecinum</i>	COCKS	1849	p. 92.

Halecium Lamourouxianum (d'Orbigny).

<i>Thoa Lamourouxiana</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	p. 24, pl. 11, fig. 1, 2.
---------------------------	--------------	---------	---------------------------

Halecium muricatum (Ellis et Solander).

Voir : Matériaux I. p. 449.

<i>Sertularia muricata</i>	FLEMING	1820	p. 88.
<i>Laomedea muricata</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 482.
<i>Sertularia muricata</i>	HOGG	1827	p. 34.
»	FLEMING	1828	p. 543.
<i>Campanularia muricata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 438.
<i>Sertularia muricata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 445.
»	CUVIER	1830	p. 300.
<i>Campanularia muricata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 473.
<i>Sertularia muricata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 480.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 147.
<i>Thoa muricata</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 121, pl. 7, fig. 3, 4.
»	COUCH	1841	p. 31.
»	HASSAL	1841 (b)	p. 284, 372.
»	MACGILLIVRAY	1842	p. 463.
»	COUCH	1844	p. 16.
»	FORBES	1844	p. 387, pl. 10, fig. 5, 6.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
»	FORSTER	1847	p. 21.
<i>Halecium muricatum</i>	JOHNSTON	1847	p. 60, pl. 9, fig. 3, 4.
<i>Sertularia muricata</i>	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 475, pl. 32.
<i>Halecium muricatum</i>	GRAY	1848	p. 67.
»	LANDSBOROUGH	1848	p. 234.
»	COCKS	1849	p. 92.

Halecium patagonicum (d'Orbigny).

<i>Thoa patagonica</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	p. 24, pl. 11, fig. 1, 3.
------------------------	--------------	---------	---------------------------

Halecium tehuelchum (d'Orbigny).

<i>Thoa tehuelcha</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	p. 25, pl. 12, fig. 4, 5.
-----------------------	--------------	---------	---------------------------

Gen. *Hermia* Johnston 1838.Ce genre étant synonyme de *Coryne* doit être supprimé.

Gen. *Hydra* Linné 1746.

Voir : Matériaux 1, p. 450.

BORY de St-VINCENT (1824, p. 461) a changé le nom d'*Hydra* contre celui de *Polypus*. Mais ce changement n'a pas été adopté.

Hydra attenuata Pallas.

Voir : Matériaux 1, p. 450.

<i>Polypus isochirus</i>	BORY de St-VINCENT	1824	p. 634.
<i>Hydra pallens</i>	GLIEMANN	1824	p. 169.
» »	BENNET et OLIVIER	1826	p. 202.
» »	BLAINVILLE	1830	p. 459.
» »	CUVIER	1830	p. 295.
» »	BLAINVILLE	1834	p. 495.
<i>Hydra attenuata</i>	EURENBERG	1834	p. 292.
<i>Hydra pallens</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 71.
<i>Hydra vulgaris</i> var. <i>b.</i> <i>grisea</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 95, pl. 1, fig. 1.
<i>Hydra attenuata</i>	JOHNSTON	1847	p. 123, pl. 29, fig. 1.
» »	GRAY	1848	p. 90.

Hydra oligactis Pallas.

Voir : Matériaux 1 p. 451.

<i>Hydra fusca</i>	SCHWEIGGER	1819	Tab. IV.
» »	SERRES	1822	p. 81.
<i>Polypus megalochirus</i>	BORY de St-VINCENT	1824	p. 635.
? <i>Blassbraune Armpolyp</i>	GRUTHUISEN	1824	p. 154. Note.
<i>Hydra fusca</i>	BENNET et OLIVIER	1826	p. 200.
» »	HOEVEN (van der)	1827	p. 555.
<i>Hydra oligactis</i>	HOEVEN (van der)	1827	p. 555.
? <i>Blassbraune Armpolyp</i>	GRUTHUISEN	1828	p. 506.
<i>Hydra fusca</i>	BLAINVILLE	1830	p. 459.
» »	CUVIER	1830	p. 295.
» »	MEYEN	1830	p. 490.
? » »	WOODWARD	1830	p. 349.
» »	BLAINVILLE	1834	p. 495.

<i>Hydra oligactis</i>	EHRENBERG	1834	p. 292.
<i>Hydra fusca</i> var. <i>galian-</i> <i>conu</i>	CORDA	1836	p. 297. pl. 14-16.
<i>Hydra fusca</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 71.
<i>Hydra oligactis</i>	EHRENBERG	1836 (c)	p. 27.
<i>Hydra verrucosa</i>	TEMPLETON	1836	p. 418, fig. 57.
<i>Hydra fusca</i>	QUATREFAGES	1836-49	pl. 64, fig. 1.
" "	JOHNSTON	1838 (a)	p. 329.
<i>Hydra verrucosa</i>	JOHNSTON	1838 (a)	p. 330.
<i>Hydra fusca</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 96 et 93, fig. 11.
<i>Hydra verrucosa</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 97.
<i>Hydra fusca</i>	OWEN	1843	p. 82, fig. 45.
<i>Hydra grisea</i>	OWEN	1843	p. 83.
<i>Hydra fusca</i>	ALLMAN	1844 (a)	p. 77.
" "	ALLMAN	1844 (b)	p. 328.
" "	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Hydra verrucosa</i>	THOMPSON	1844	p. 283.
? <i>Hydre brune</i>	DEJARDIN	1845 (b)	p. 262.
<i>Hydra oligactis</i>	JOHNSTON	1847	p. 124 et 120, fig. 27.
<i>Hydra fusca</i>	DALVELL	1847-48	vol. I, p. 74, pl. 42.
<i>Hydra oligactis</i>	GRAY	1848	p. 90.
<i>Hydra fusca</i>	LEYDIG	1848	p. 165.

Hydra viridis Linné.

Voir : Matériaux I, p. 452.

<i>Hydra viridis</i>	URE	1793	p. 232.
" "	SCHWEIGGER	1819	Tab. IV.
" "	SERRES (de)	1822	p. 81.
<i>Polypus viridis</i>	BORY de St-VINCENT	1824	p. 633.
<i>Hydra viridis</i>	BENNETT OLIVIER	1826	p. 199.
" "	BLAINVILLE	1826	p. 77.
" "	HOEVEN (vander)	1827	p. 551.
" "	FLEMING	1828	p. 553 (Excl. Syn. p. p.).
" "	STARK	1828	p. 443.
" "	BLAINVILLE	1830	p. 459.
" "	CIVIER	1830	p. 295.

<i>Hydra viridis</i>	WOODWARD	1830	p. 349.
»	BLAINVILLE	1834	p. 494, pl. 85, fig. 1, 1 a.
»	EHRENBERG	1834	p. 291.
»	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	MEYEN	1834	p. 176.
»	ROGET	1834-40	vol. I. p. 162, fig. 59 et p. 176-178, fig. 73-76.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 70.
»	EHRENBERG	1836 (c)	p. 27.
»	JOHNSTON	1837	fig. p. 236.
»	JOHNSTON	1838 (a)	p. 330.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 93 et 37, fig. 4.
»	ERDL	1841 (a)	p. 43, pl. 34, fig. 10-14.
»	ERDL	1841 (b)	p. 429.
»	WAGNER	1841	p. 43, pl. 34, fig. 10-14.
»	ALLMAN	1844 (b)	p. 330.
»	LAURENT	1844	
»	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Hydre verte</i>	DUJARDIN	1845 (b)	p. 262.
<i>Hydra viridis</i>	SCHULTZE	1846	p. 118.
»	JOHNSTON	1847	p. 121.
»	DALYELL	1847-48	vol. I. p. 74, pl. 12.
»	GRAY	1848	p. 89.
»	LANDSBOROUGH	1848	p. 233.
»	HANCOCK	1850 (a)	p. 285, pl. 7, fig. 6.
»	HANCOCK	1850 (b)	p. 410, 443, pl. 8, fig. 6.
<i>Hydre verte</i>	LAURENT	1850	p. 822.

Hydra vulgaris Pallas.

Voir : Matériaux I. p. 453.

<i>Hydra grisea</i>	URE	1793	p. 233.
<i>Polypus biareus</i>	BORY de St-VINCENT	1824	p. 634.
<i>Hydra grisea</i>	BENNET et OLIVIER	1826	p. 201.
»	HOEVEN (van der)	1827	p. 554.
<i>Hydra vulgaris</i>	HOEVEN (van der)	1827	p. 554.

<i>Hydra grisea</i>	HALL	1828	p. 326.
»	STARK	1828	p. 443.
»	BLAINVILLE	1830	p. 459.
»	CUVIER	1830	p. 295.
»	BLAINVILLE	1834	p. 495.
? <i>Hydre rose</i>	BLAINVILLE	1834	pl. 85, fig. 2.
<i>Hydra vulgaris</i>	EHRENBERG	1834	p. 292.
<i>Hydra grisea</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 71.
<i>Hydra vulgaris</i>	EHRENBERG	1836 (c)	p. 27.
<i>Hydra brunnea</i>	TEMPLETON	1836	p. 417, fig. 56.
<i>Hydra grisea</i>	TEMPLETON	1836	p. 418.
<i>Hydra vulgaris aurantiaca</i>	EHRENBERG	1838 (a)	p. 115, 133-135, pl. 2, fig. 1-3.
<i>Hydra vulgaris</i>	EHRENBERG	1838 (b)	p. 14.
»	JOHNSTON	1838 (a)	p. 327.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 95, pl. 1.
<i>Hydra vulgaris</i> var. <i>a aurantiaca</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 95, pl. 1, fig. 2.
<i>Hydra vulgaris grisea</i>	LAURENT	1839	p. 820.
»	LAURENT	1841 (c)	p. 79.
<i>Hydra vulgaris aurantiaca</i>	WAGNER	1841	p. 43, pl. 34, fig. 8-9.
<i>Hydra vulgaris</i>	WAGNER	1841	p. 43, pl. 34, fig. 15.
<i>Hydra grisea vulgaris</i>	BLAINVILLE	1842	p. 373.
<i>Hydra orangée</i>	LAURENT	1843	p. 59, 62.
<i>Hydra vulgaris</i>	ALLMAN	1844 (b)	p. 330.
»	COUCH	1844	p. 136.
»	LAURENT	1844	
»	THOMPSON	1844	p. 283.
»	SCHULZE	1846	p. 118.
»	JOHNSTON	1847	p. 122, pl. 29, fig. 2 et p. 473.
»	GRAY	1848	p. 90.
»	LANDSBOROUGH	1848	p. 233.
<i>Hydra vulgaris aurantiaca</i>	LEVIG	1848	p. 165.
<i>Hydra vulgaris</i>	COCKS	1849	p. 93.
<i>Hydra fusca</i> var. ?	HANCOCK	1850 (a)	p. 281, pl. 6, 7.
»	HANCOCK	1850 (b)	p. 405, pl. 7, 8.

Gen. *Hydractinia* van Beneden, 1841.

Voir : Matériaux I. p. 453.

Hydractinia echinata van Beneden.

<i>Alcyonium echinatum</i>	FLEMING	1828 p. 517.
»	FLEMING	1832 (a) p. 252, pl. 9, fig. 2.
»	BLAINVILLE	1834 p. 525.
»	JOHNSTON	1834 p. 108.
<i>Corium parasites</i>	QUATREFAGES	1836-49 p. 64, fig. 1.
<i>Coryne squamata</i> var.	JOHNSTON	1838 (b) p. 109 (p.p.), pl. 2, fig. 4, 5.
<i>Alcyonidium echinatum</i>	JOHNSTON	1838 (b) p. 304, pl. 42, fig. 3, 4.
»	THOMPSON	1840 p. 254.
<i>Hydractinie</i>	BENEDEN (van)	1841 p. 89, pl. fig. 1-4.
<i>Echinocorium clarigerum</i>	HASSAL	1844 (b) p. 371, pl. 10, fig. 5.
? <i>Hydractinia neapolitana</i>	CHIAJE (delle)	1844-44 vol. 8, p. 45, pl. 174, fig. 19-22.
<i>Alcyonidium echinatum</i>	COUCH	1842 p. 44.
<i>Echinocorium clarigerum</i>	MAGGILLIVRAY	1842 p. 463.
<i>Echinocorium</i>	FORBES	1843 p. 188.
<i>Alcyonidium echinatum</i>	FORBES	1843 p. 188.
<i>Coryne Hassalli</i>	FORBES	1843 p. 189.
<i>Alcyonium echinatum</i>	GRAY	1843 (b) p. 204.
<i>Siphyleta parasites</i>	QUATREFAGES	1843 p. 230, pl. 8 et 9.
<i>Hydractinia lactea</i>	BENEDEN (van)	1844 (b) p. 41 et 64, pl. 6, fig. 7-14.
<i>Hydractinia rosea</i>	BENEDEN (van)	1844 (b) p. 41 et 63, pl. 6, fig. 1-6.
<i>Hydractinia lactea</i>	BENEDEN (van)	1844 (c) p. 314.
<i>Hydractinia rosea</i>	BENEDEN (van)	1844 (c) p. 314.
<i>Alcyonidium echinatum</i>	COUCH	1844 p. 134.
<i>Clara capitata</i>	THOMPSON	1844 p. 283.
<i>Hydractinia echinata</i>	BENEDEN (van)	1845 p. 124.
<i>Siphyleta parasites</i>	QUATREFAGES	1845 p. 118.
<i>Hydractinia lactea</i>	QUATREFAGES	1845 p. 118.
»	STEENSTRUP	1846 p. 68.

<i>Hydractinia rosea</i>	STEENSTRUP	1846	p. 68.
<i>Hydractinia lactea</i>	BENEDEN (VAN)	1847	p. 455.
<i>Hydractinia rosea</i>	BENEDEN (VAN)	1847	p. 455.
<i>Synhydra</i>	FREY u. LEUCKART	1847	p. 27. 28. Note.
<i>Hydractinia grisea</i>	FREY u. LEUCKART	1847	p. 28.
<i>Hydractinia echinata</i>	JOHNSTON	1847	p. 34, pl. 1. fig. 4-6.
<i>Hydractinia grisea</i>	LEUCKART	1847 (a)	p. 137, 138.
<i>Hydractinia echinata</i>	THOMAS	1847	p. 467.
? <i>Hydra (Coryna) squamata</i>	DALYELL	1847-48	vol. 2, p. 52, pl. 18, fig. 1-10.
<i>Hydractinia echinata</i>	GRAY	1848	p. 61.
» »	LANDSBOROUGH	1848	p. 230.
» »	COCKS	1849	p. 91.
<i>Hydractinia rosea</i>	COCKS	1849	p. 91.
<i>Synhydra parasites</i>	COCKS	1849	p. 91.
<i>Hydractinia echinata</i>	LÜTKEN	1850	p. 33.

[Gen. *Hydrallmania* Hincks 1868.]

Voir : Matériaux I. p. 454.

[*Hydrallmania falcata* (Linné)]

Voir : Matériaux I. p. 454 et 470.

<i>Sertularia falcata</i>	SCHWEIGGER	1819	Tab. VIII.
<i>Aglaophenia falcata</i>	LAMOUREUX	1824	p. 20.
<i>Sertularia falcata</i>	BENNET et OLIVIER	1826	p. 187.
<i>Plumularia falcata</i>	GRANT	1826	p. 151.
» »	RISSE	1826	p. 313.
<i>Sertularia falcata</i>	HOGG	1827	p. 32.
<i>Plumularia falcata</i>	FLEMING	1828	p. 546.
» »	BLAINVILLE	1830	p. 441.
<i>Sertularia falcata</i>	CUVIER	1830	p. 301.
<i>Plumularia falcata</i>	JOHNSTON	1832 (a)	p. 259.
» »	LINK	1832	p. 113.
» »	BLAINVILLE	1834	p. 477.
» »	JOHNSTON	1834	p. 107.

<i>Plumularia falcata</i>	LOVÉN	1835	p. 256, note.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 160.
»	TEMPLETON	1836	p. 466.
<i>Anisocotyle (Aglaophenia)</i> <i>falcata</i>	COSTA	1838	p. 19.
<i>Plumularia falcata</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 141, pl. 17, fig. 1, 2.
»	COUCH	1841	p. 40.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 169.
«	HYNDMANN	1842	p. 20.
»	MACGILLIVRAY	1842	p. 464.
<i>Sertularia falcata</i>	WESTENDORP	1843	p. 34.
<i>Plumularia falcata</i>	COUCH	1844	p. 30.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Aglaophenia falcata</i>	MENECHINI	1845	p. 7. 12.
<i>Plumularia falcata</i>	FORSTER	1847	p. 22.
»	JOHNSTON	1847	p. 90, pl. 21, fig. 1, 2.
»	LANDSBOROUGH	1847	p. 366.
»	LEUCKART	1847 (a)	p. 137.
»	THOMAS	1847	p. 471.
<i>Sertularia (Plumularia)</i> <i>falcata</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1.	p. 176, pl. 33, 34.
<i>Aglaophenia falcata</i>	GRAY	1848	p. 78.
<i>Plumularia falcata</i>	LANDSBOROUGH	1848	p. 232.
»	COCKS	1849	p. 92.

Gen. *Idia* Lamouroux 1816.

Voir : Matériaux I, p. 454.

Idia pristis Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 454.

<i>Cellaria pectinata</i>	LAMARCK	1816	vol. 2. p. 138.
<i>Sertularia pristis</i>	SCHWEIGGER	1819	Tab. VIII.
<i>Idia pristis</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 462.
»	BLAINVILLE	1830	p. 447.
»	BLAINVILLE	1834	p. 483, pl. 84, fig. 1, 1d.
<i>Cellaria pectinata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 183.

Gen. *Lafira* Lamouroux 1821.

La seule espèce que LAMOUROUX (1821) plaçait dans ce genre, *L. cornuta*, est très probablement synonyme de l'espèce décrite par FLEMING en 1820 sous le nom de *Sertularia dumosa*.

Il semble probable, d'après les recherches de LEVINSEN (1892) que l'on devra faire rentrer dans ce genre les espèces décrites sous le nom de *Coppinia*.

Lafira dumosa (Fleming).

<i>Sertularia volubilis</i> β	PALLAS	1766	p. 123.
? <i>Siphyltus obconicus</i>	RAFINESQUE-		
	SCHMALTZ	1810	p. 96, pl. 20, fig. 8.
<i>Sertularia dumosa</i>	FLEMING	1820	p. 83.
? <i>Lafira cornuta</i>	LAMOUROUX	1821	p. 8, pl. 65, fig. 12-14.
? " "	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 480.
<i>Tubularia tubifera</i>	JOHNSTON	1825	p. 222.
<i>Campanularia dumosa</i>	FLEMING	1828	p. 548.
<i>Lammedea dumosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 439.
<i>Campanularia dumosa</i>	JOHNSTON	1832 (a)	p. 254, pl. 11, fig. 1.
<i>Lammedea dumosa</i>	BLAINVILLE	1834	p. 474.
<i>Campanularia dumosa</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
<i>Cornularia rugosa</i>	GRAY	1838	p. 238 (Excl. syn.).
<i>Campanularia dumosa</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 157, pl. 23, fig. 2-5.
" "	THOMPSON	1840	p. 251.
" "	HASSAL	1841 (a)	p. 169.
" "	MACGILLIVRAY	1842	p. 465.
" "	COUCH	1844	p. 42, pl. 11, fig. 2.
" "	THOMPSON	1844	p. 283.
" "	REID	1845	p. 385.
" "	FORSTER	1847	p. 22.
" "	JOHNSTON	1847	p. 113, pl. 27, fig. 2-5.
" "	LEUCKART	1847 (ii)	p. 138.
? " "	THOMAS	1847	p. 472.

<i>Sertularia alex</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1, p. 221, pl. 26, fig. 22-25.
<i>Sertularia (Campanularia)</i>		
<i> dumosa</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1, p. 221, pl. 26, fig. 22-25.
<i>Capsularia dumosa</i>	GRAY	1848 p. 88.
<i>Campanularia dumosa</i>	LANDSBOROUGH	1848 p. 233.
" "	COCKS	1849 p. 93.

Gen. *Laomedea* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I. p. 454.

Laomedea gracilis Pickering.

<i>Laomedea gracilis</i>	PICKERING	1846-49 p. 689, pl. 61, fig. 7.
" "	DANA	1846-49 p. 689, pl. 61, fig. 7.

Espèce douteuse!

Gen. *Liriozoa* Lamarck 1816.

Le genre *Liriozoa*, tel qu'il a été établi par LAMARCK, ne renfermait pas d'Hydroïdes. D'ORBIGNY (1834) a cru devoir le faire rentrer dans la famille des *Sertulariæ*. La seule espèce qu'il mentionne, *L. sex-dentata* est décrite trop sommairement pour qu'il soit possible de la reconnaître. Le genre *Liriozoa* doit donc disparaître de la nomenclature des Hydroïdes.

Gen. *Listera* Meneghini 1845.

Le genre *Listera* avait été établi par MENEIGHINI: mais cet auteur ayant reconnu (1845, p. 16, note) que ce nom était déjà employé dans la nomenclature botanique, le remplaça par celui d'*Anisocalyx*. L'espèce que MENEIGHINI fait rentrer dans ce genre est une Plumulaire.

[Gen. *Lorenella* Hincks 1868.]

HINCKS a créé ce genre pour y placer la *Campanularia clausa* de LOVÉN.

[*Lorenella clausa* Hincks 1868.]

Campanularia clausa LOVÉN 1835 p. 262, note.

Gen. *Lourenia* Meneghini 1845.

Ce genre, dans lequel se trouvaient réunies des Plumulaires et des Nemertesies, n'a pas été adopté.

Gen. *Lucernaria* Fabricius 1780.

FABRICIUS comprenait dans ce genre sa *Lucernaria phrygia* qui aujourd'hui représente le type du genre *Myriothela*.

[Gen. *Lyptoscyphus* Pictet 1893.]

C'est dans ce genre — établissant un terme de passage des Campanularides aux Sertularides — que doit rentrer, ainsi que PICTET l'a montré, la *Sertularia fruticosa* d'ESPER. Cette opinion est partagée par HARTLAUB (1901, p. 102) qui, par erreur, écrit ce nom : *Lyptoscyphus*, au lieu de *Lyptoscyphus*.

Il me semble que c'est également dans ce genre que l'on doit placer la *Laomedea articulata* de LAMOUREUX (1824 b) (synonyme de *Sertularia articulata* M. Edwards non Pallas).

[*Lyptoscyphus articulatus* (Lamouroux).]

Laomedea articulata LAMOUREUX 1824 (b) p. 619, pl. 91, fig. 4
et 5.

Sertularia articulata EDWARDS, M. 1836 p. 139.

[*Lytoscyphus fruticosus* (Esper).]

Syn. : *Sertularia fruticosa* Esper.

Voir : Matériaux I. p. 471.

<i>Laomedea Sauragii</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 481.
<i>Sertularia lara</i>	STARK	1828	p. 440.
<i>Laomedea fruticosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 438.
»	BLAINVILLE	1834	p. 474.
<i>Sertularia lara</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 139.

Gen. *Monopysis* Nardo 1847.

Voir : *Monopyxis*.

Sous-gen. *Monopyxis* Ehrenberg 1834.

et

Gen. *Monopyxis* Meneghini 1845.

EHRENBURG (1834) avait divisé le genre *Sertularia* en 4 sous-genres : *Monopyxis*, *Podopyxis*, *Peripyxis* et *Sporadopyxis*. Quelques auteurs, suivant l'exemple de MENEGHINI (1847), ont employé à tort le nom de *Monopyxis* comme nom générique. NARDO (1847 a) le transforme en *Monopysis* !

Gen. *Myriothela* M. Sars 1850.

M. SARS a établi le genre *Myriothela* pour y placer une espèce (*M. arctica*) décrite autrefois par FABRICIUS (1780) sous le nom de *Lucernaria phrygia* et pour laquelle BLAINVILLE (1830) avait proposé le nom générique de *Candelabrum*.

En 1849, VIGURS a donné le nom d'*Arion Cocksii* à une espèce que la plupart des zoologistes, à l'exemple de HINCKS et d'ALLMAN, ont considérée comme identique à la *Lucernaria phrygia* de FABRICIUS et à la *Myriothela arctica* de M. SARS. Mais G.-O. SARS (1873) et plus tard K. BONNEVIE (1899) ont montré que ces deux espèces étaient bien distinctes.

[*Myriothele Cocksii* G.-O. Sars 1873.]

<i>Arum Cocksii</i>	VIGERS	1849	p. 90.
»	COCKS	1849	p. 90.

Myriothele phrygia (Fabricius).

<i>Lucernaria phrygia</i>	FABRICIUS	1780	p. 343.
»	GMELIN	1788-93	p. 3151.
<i>Caudelabrum</i>	BLAINVILLE	1830	p. 284.
»	BLAINVILLE	1834	p. 318.

Gen. *Nemertesia* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I, p. 455.

Nemertesia antennina Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 455.

<i>Antennularia indivisa</i>	SCHWEIGGER	1819	Tab. VIII.
<i>Nemertesia antennina</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 566.
<i>Sertularia antennina</i>	GLIEMANN	1824	p. 169.
<i>Sertularia antennina</i> p. p.	BENNET et OLIVIER	1826	p. 188.
»	HOGG	1827	p. 33.
<i>Antennularia antennina</i>	FLEMING	1828	p. 546.
<i>Sertularia antennina</i>	CHIAJE (delle)	1828-30	vol. 4, p. 132, 144.
<i>Antennularia indicisa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 450.
<i>Sertularia antennina</i>	CUVIER	1830	p. 304.
<i>Antennularia antennina</i> var. 1	JOHNSTON	1832 (a)	p. 260.
<i>Antennularia indivisa</i>	BLAINVILLE	1834	p. 486, pl. 83, fig. 3, 3 a.
<i>Antennularia antennina</i> var. <i>A. indivisa</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
<i>Antennularia indivisa</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 156.
»	TEMPLETON	1836	p. 468.
<i>Nemertesia antennina</i>	COSTA	1838	p. 1, pl. 9, fig. 4-8.
<i>Antennularia antennina</i> var. 1	JOHNSTON	1838 (b)	p. 139, pl. 16, fig. 1 et 3.

Lobster's-Horn Coralline

var. 1	COUCH	1841	p. 39.
<i>Antennularia antennina</i>	HASSAL	1841 (a)	p. 168, pl. 5, fig. 3.
<i>Sertularia antennina</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 10.
<i>Antennularia antennina</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 144.
»	HYNDMANN	1842	p. 20.
»	MACGILLIVRAY	1842	p. 464.
<i>Antennularia indirisa</i>	WESTENDORP	1843	p. 32.
<i>Antennularia antennina</i>			
var. 1.	COUCH	1844	p. 29, pl. 7.
<i>Antennularia antennina</i>	THOMPSON	1844	p. 283 (Excl. Syn.)
<i>Nemertesia antennina</i>	MENEGHINI	1845	p. 13, pl. 14, fig. 1.
<i>Antennularia antennina</i>	FORSTER	1847	p. 22.
»	JOHNSTON	1847	p. 86, pl. 19, fig. 1 et 3.
»	THOMAS	1847	p. 471.
<i>Sertularia antennina</i>	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 198, pl. 39, fig. 1-6.
<i>Sertularia (Nemertesia) ant-</i> <i>ennina</i>	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 198, pl. 39, fig. 1-6.
<i>Nemertesia antennina</i>	GRAY	1848	p. 77.
<i>Antennularia antennina</i>	LANDSBOROUGH	1848	p. 231.
<i>Plumularia verticillata</i>	THOMPSON	1848	p. 77.
<i>Antennularia antennina</i>	COCKS	1849	p. 92.

Nemertesia Janini Lamouroux.

Voir : Matériaux 1, p. 456.

<i>Nemertesia Janini</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 566.
<i>Antennularia Janini</i>	BLAINVILLE	1830	p. 451.
»	BLAINVILLE	1834	p. 486.
»	ORBIGNY (d')	1834	p. 151.
»	EDWARDS. M.	1836	p. 156.

Nemertesia ramosa Lamouroux.

Voir : Matériaux 1, p. 457.

? <i>Tubularia fruticulosa</i>	SCHWEIGER	1819	Tab. VIII
<i>Nemertesia ramosa</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 566.

? <i>Cymodocea ramosa</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 236.
<i>Sertularia antennina</i> p.p.	BENNET et OLIVIER	1826 p. 189.
<i>Sertularia seticornis</i>	HOGG	1827 p. 33.
<i>Antennularia ramosa</i>	STARK	1828 p. 440.
» »	BLAINVILLE	1830 p. 451.
? <i>Cymodocea ramosa</i>	BLAINVILLE	1830 p. 451.
<i>Nemertesia ramosa</i>	CUVIER	1830 p. 301.
<i>Antennularia antennina</i>		
var. 2	JOHNSTON	1832 (a) p. 260.
<i>Antennularia ramosa</i>	BLAINVILLE	1834 p. 486.
? <i>Cymodocea ramosa</i>	BLAINVILLE	1834 p. 487.
<i>Antennularia antennina</i>		
var. A. <i>ramosa</i>	JOHNSTON	1834 p. 107.
<i>Antennularia ramosa</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 456.
» »	TEMPLETON	1836 p. 468.
» »	EDWARDS, M.	1836-49 pl. 68, fig. 1.
<i>Antennularia antennina</i>		
var. 2	JOHNSTON	1838 (b) p. 140, pl. 16, fig. 2.
<i>Lobster's-Horn Coralline</i>		
var. 2	COUCH	1841 p. 39.
<i>Antennularia ramosa</i>	HASSAL	1841 (a) p. 168, pl. 5, fig. 1, 2.
<i>Antennularia arborescens</i>	HASSAL	1843 p. 111.
<i>Antennularia ramosa</i>	WESTENDORP	1843 p. 32.
<i>Antennularia antennina</i>		
var. 2	COUCH	1844 p. 29.
<i>Antennularia arborescens</i>	THOMPSON	1844 p. 283.
? <i>Aglaophenia tetrasticha</i>	MENECHINI	1845 p. 12, 15 [pl. 14, fig. 2].
? <i>Lowenia tetrasticha</i>	MENECHINI	1845 p. 12, 15, pl. 14, fig. 2.
<i>Antennularia ramosa</i>	JOHNSTON	1847 p. 88 et 464, pl. 19, fig. 2 et pl. 20.
» »	THOMAS	1847 p. 471.
<i>Sertularia (Antennularia) ramosa</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1, p. 202, pl. 39, fig. 7-19 et pl. 40.
<i>Sertularia (Nemertesia) ramosa</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1, pl. 39, fig. 7-19 et pl. 40.

<i>Nemertesia ramosa</i>	GRAY	1848	p. 77.
<i>Antennularia ramosa</i>	LANDSBOROUGH	1848	p. 231.
»	COCKS	1849	p. 92.

Gen. *Nigellastrum* Oken 1815.

GRAY (1848) a tenté, mais sans succès, de reprendre le genre *Nigellastrum*.

Gen. *Obelia* Péron et Lesueur 1810.

Voir : Matériaux I. p. 457.

LAMOUREUX (1821, p. 81), a donné le nom d'*Obelia* à un genre de Polypiers que l'on place aujourd'hui parmi les Bryozoaires.

[*Obelia flabellata* Hincks 1866.]

? <i>Sertularia dichotoma</i>	DALYELL	1836	p. 91, fig. 1.
? <i>Sertularia</i> (<i>Campanularia</i>) <i>dichotoma</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1.	p. 212, pl. 41.

Obelia longissima (Pallas).

Voir : Matériaux I. p. 457.

<i>Sertularia longissima</i>	EHRENBERG	1834	p. 297.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	BENEDEN (van)	1844 (a)	p. 33, pl. 1, 2.
<i>Laomedea dichotoma</i> var. β	JOHNSTON	1847	p. 102.
»	»	GRAY	1848 p. 83.
? »	»	COCKS	1849 p. 93.

Gen. *Opercularella* Hincks 1868.

Genre créé par HINCKS pour la *Campanularia lacerata* de JOHNSTON.

[*Opercularella lacerata* Hincks 1868.]

<i>Campanularia lacerata</i>	JOHNSTON	1847	p. 111, pl. 28, fig. 3.
<i>Capsularia lacerata</i>	GRAY	1848	p. 87.

Gen. *Pasythea* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I. p. 458.

Pasythea gracilis Dana.

<i>Pasythea gracilis</i>	DANA	1846-49 p. 25, fig. 11 et p. 688.
--------------------------	------	-----------------------------------

Pasythea quadridentata Lamouroux.

Voir : Matériaux I. p. 458.

<i>Pasythea quadridentata</i>	SCHWEIGGER	1819 Tab. VIII.
»	DESLONGCHAMPS	1824 p. 603.
<i>Tuliparia quadridentata</i>	BLAINVILLE	1830 p. 450.
»	BLAINVILLE	1834 p. 485.
<i>Sertularia quadridentata</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 150.
<i>Pasythea quadridentata</i>	EDWARDS, M.	1836-49 pl. 68, fig. 2.

Gen. *Pennaria* Oken 1815.

Voir : Matériaux I. p. 458.

Pennaria disticha Goldfuss.

Voir : Matériaux, I. p. 459.

<i>Sertularia pennaria</i>	SCHWEIGGER	1819 p. 19.
»	CHIAJE (delle)	1828-30 vol. 4. p. 122, 145. pl. 63, fig. 3.
<i>Plumularia pennaria</i>	BLAINVILLE	1830 p. 442 (Excl. syn. p.p.).
»	BLAINVILLE	1834 p. 447 (Excl. syn. p.p.).
<i>Pennaria Carolinii</i>	EHRENBERG	1834 p. 297.
<i>Anisocalyx pinnarium</i>	COSTA	1838 p. 18.
<i>Aglatophenia pinnaria</i>	COSTA	1839 p. 185.
<i>Sertularia pennaria</i>	CHIAJE (delle)	1841-44 vol. 5, p. 5, 17, pl. 157, fig. 3, 14, 15.
<i>Pennaria Caulini</i>	CHIAJE (delle)	1841-44 vol. 5. p. 145.
<i>Pennaria Carolinii</i>	KROHN	1843 p. 179.
»	BENEDEN (Van)	1844 (b) p. 12.

<i>Sertularia pennaria</i>	BENEDEN (VAN)	1844 (b) p. 45.
<i>Pennaria Carolinii</i>	BENEDEN (VAN)	1844 (c) p. 312.
" "	STEENSTRUP	1846 p. 67.
" "	KOELLIKER	1847 p. 49, pl. 2, fig. 24.
<i>Sertularia pennaria</i>	LÜTKEN	1850 p. 32.

Gen. *Perigonimus* Sars 1846.

Ce genre a été établi par SARS pour une nouvelle espèce d'Hydroïde découverte sur les côtes de la Norvège.

Perigonimus muscoides Sars.

<i>Perigonimus muscoides</i>	SARS	1846 p. 8, 10, 14. pl. 1, fig. 19-21.
------------------------------	------	---------------------------------------

Sous-Gen. *Peripyxis* Ehrenberg 1834.

Voir à : *Monopyxis*. Ce sous-genre du genre *Sertularia* ne renfermait qu'une espèce, qui n'est pas un Hydroïde. Il doit donc disparaître.

Gen. *Peritricha* Bory de St-Vincent 1824.

Ce genre n'appartient pas aux Hydroïdes, mais B. de St-VINCENT a décrit sous le nom de *Peritricha polyporum* une espèce qui, d'après EHRENBURG (1838 a) n'est pas autre chose que des œufs d'*Hydra*.

Gen. *Plumularia* Lamarek 1816.

Voir : Matériaux I. p. 459.

Plumularia catharina Johnston.

<i>Plumularia catharina</i>	JOHNSTON	1833 p. 497, fig. 61. 62.
" "	JOHNSTON	1834 p. 107.

<i>Plumularia catharina</i>	JOHNSTON	1838 (b) p. 147 et p. 79, fig. 8.
<i>Plumularia catherina</i>	COUCH	1844 p. 44.
<i>Plumularia catharina</i>	HASSAL	1841 (b) p. 285.
<i>Plumularia catherina</i>	MAGILLIVRAY	1842 p. 465.
» »	COUCH	1844 p. 35.
<i>Plumularia catharina</i>	THOMPSON	1844 p. 283.
» »	JOHNSTON	1847 p. 97 et p. 3, fig. 1 et p. 465.
» »	LANDSBOROUGH	1847 p. 292, 366.
» »	LEUCKART	1847 (a) p. 137, 139.
<i>Plumularia catherina</i>	THOMAS	1847 p. 471.
<i>Aglaophenia catharina</i>	GRAY	1848 p. 81.
<i>Plumularia catharina</i>	LANDSBOROUGH	1848 p. 232.
» »	COCKS	1849 p. 93.

Plumularia echinulata Lamarek.

Voir : Matériaux, I p. 459.

<i>Plumularia echinulata</i>	BLAINVILLE	1830 p. 442.
» »	BLAINVILLE	1834 p. 477.
<i>Sertularia setacea</i>	LISTER	1834 p. 371, pl. 8, fig. 4.
<i>Plumularia echinulata</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 162.
» »	WESTENDORP	1843 p. 34.
» »	JOHNSTON	1847 p. 464.
<i>Aglaophenia echinulata</i>	GRAY	1848 p. 81.
<i>Plumularia echinulata</i>	COCKS	1849 p. 93.

Plumularia frutescens (Ellis et Solander).

Voir : Matériaux I, p. 460.

<i>Aglaophenia frutescens</i>	LAMBOURX	1824 p. 19.
<i>Sertularia frutescens</i>	HOGG	1827 p. 33.
<i>Plumularia frutescens</i>	FLEMING	1828 p. 547.
» »	BLAINVILLE	1830 p. 442.
<i>Sertularia frutescens</i>	CUVIER	1830 p. 301.
<i>Plumularia frutescens</i>	BLAINVILLE	1834 p. 477.
» »	EDWARDS, M.	1836 p. 166.
<i>Aglaophenia frutescens</i>	KRAUSS	1837 p. 26.

<i>Anisocalyx</i> (<i>Aglaophenia</i>)	COSTA	1838	p. 19.
<i>frutescens</i>			
<i>Plumularia frutescens</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 149, pl. 20, fig. 2. 3.
»	»	COUCH	1841 p. 45.
»	»	HASSAL	1841 (b) p. 285.
»	»	COUCH	1844 p. 37.
»	»	THOMPSON	1844 p. 283.
<i>Aglaophenia frutescens</i>	MENECHINI	1845	p. 12.
<i>Plumularia frutescens</i>	FORSTER	1847	p. 22.
»	»	JOHNSTON	1847 p. 100, pl. 24, fig. 2. 3.
<i>Aglaophenia frutescens</i>	NARDO	1847 (a)	p. 8.
<i>Plumularia frutescens</i>	THOMAS	1847	p. 472.
<i>Aglaophenia frutescens</i>	GRAY	1848	p. 82.
<i>Plumularia frutescens</i>	COCKS	1849	p. 93.

Plumularia Gaimardi (Lamouroux.)

<i>Aglaophenia Gaimardi</i>	LAMOUROUX	1824 (b)	p. 611, pl. 95, fig. 9. 10.
<i>Aglaophenia Gaymardi</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 18.
»	»	EDWARDS, M.	1836 p. 167.

[*Plumularia Helleri* Hincks 1872.]

? <i>Sertularia pinnata</i>	CHIAJE (delle)	1828-30	vol. 4, p. 133, 144.
? »	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 10, 144.
? <i>Anisocalyx hyalinus</i>	COSTA	1838	p. 16, pl. 2, fig. 3.

[*Plumularia obliqua* Hincks 1862.]

<i>Campanularia</i>	LISTER	1834	p. 372, pl. 8, fig. 5.
<i>Laomedea obliqua</i>	THOMPSON	1844	p. 285.
<i>Monopyxis dichotoma</i>	MENECHINI	1845	p. 13, pl. 13, fig. 3 (Excl. Syn.).
<i>Laomedea obliqua</i>	JOHNSTON	1847	p. 106, pl. 28, fig. 1.
»	»	GRAY	1848 p. 85.

Plumularia pinnata (Linné) Lamareck.

Voir : Matériaux I, p. 460.

<i>Aglaophenia pinnata</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 19.
<i>Plumularia pinnata</i>	RISSO	1826 p. 343.
» »	BLAINVILLE	1830 p. 442.
» »	JOHNSTON	1832 (a) p. 260.
» »	JOHNSTON	1833 p. 497.
» »	BLAINVILLE	1834 p. 477.
» »	JOHNSTON	1834 p. 107.
» »	EDWARDS, M.	1836 p. 164.
<i>Anisocalyx pinnatum</i> p. p.	COSTA	1838 p. 17.
<i>Plumularia pinnata</i>	JOHNSTON	1838 (b) p. 145, pl. 17, fig. 4, 5.
» »	COUCH	1841 p. 43.
» »	HASSAL	1841 (a) p. 169.
» »	HASSAL	1841 (b) p. 285.
» »	MACGILLIVRAY	1842 p. 464.
? <i>Plumularia Macrodii</i>	WESTENDORP	1843 p. 33.
<i>Plumularia pinnata</i>	COUCH	1844 p. 34.
» »	FORBES	1844 p. 388.
» »	THOMPSON	1844 p. 283.
? <i>Aglaophenia pinnata</i>	MENEGHINI	1845 p. 42, 44.
? <i>Lowenia pinnata</i>	MENEGHINI	1845 p. 44, pl. 44, fig. 3.
<i>Plumularia pinnata</i>	FORSTER	1847 p. 22.
» »	JOHNSTON	1847 p. 95, pl. 21, fig. 4, 5.
» »	LANDSBOROUGH	1847 p. 292, 366.
» »	THOMAS	1847 p. 471.
<i>Sertularia (Plumularia)</i>		
<i>pinnata</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1, p. 185, pl. 35.
<i>Aglaophenia pinnata</i>	GRAY	1848 p. 80.
<i>Plumularia pinnata</i>	LANDSBOROUGH	1848 p. 232.
» »	COCKS	1849 p. 93.

Plumularia secundaria (Gmelin) Blainville.

Voir : Matériaux I, p. 461.

<i>Sertularia secundaria</i>	SCHWEIGGER	1819 p. 49.
<i>Aglaophenia secundaria</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 19.

<i>Sertularia secundaria</i>	CHIAJE (delle)	1828-30	vol. 4, p. 129, 146, pl. 63, fig. 8.
<i>Plumularia secundaria</i>	BLAINVILLE	1830	p. 442.
»	BLAINVILLE	1834	p. 477.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 167.
<i>Anyscalyx secundarius</i>	COSTA	1838	p. 12.
<i>Aglaophenia secundaria</i>	COSTA	1839	p. 185.
<i>Sertularia secundaria</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 9, 18, pl. 157, fig. 8, 20.
<i>Plumularia secundaria</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 145.
<i>Aglaophenia secundaria</i>	MENECHINI	1845	p. 13, 15.
<i>Listera (Aglaophenia) se-</i> <i>cundaria</i>	MENECHINI	1845	p. 15.
<i>Anisocalyx secundarius</i>	MENECHINI	1845	p. 15, 16 note, pl. 14, fig. 4.

Plumularia setacea (Linné) Lamarek.

Voir : Matériaux I. p. 461.

? <i>Sertularia (new species)</i>	FLEMING	1820	p. 88.
<i>Aglaophenia setacea</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 48.
<i>Sertularia setacea</i>	BENNET et OLIVIER	1826	p. 194.
<i>Plumularia setacea</i>	RISSE	1826	p. 313.
<i>Sertularia setacea</i>	HOGG	1827	p. 33.
<i>Sertularia Templetoni</i>	FLEMING	1828	p. 543.
<i>Plumularia setacea</i>	FLEMING	1828	p. 547.
»	STARK	1828	p. 440.
»	BLAINVILLE	1830	p. 442.
<i>Sertularia Templetoni</i>	BLAINVILLE	1830	p. 445.
<i>Sertularia setacea</i>	CUVIER	1830	p. 301.
<i>Sertularia pinnata</i>	CUVIER	1830	p. 301.
<i>Plumularia setacea</i>	JOHNSTON	1833	p. 497.
»	BLAINVILLE	1834	p. 477.
<i>Sertularia Templetoni</i>	BLAINVILLE	1834	p. 480.
<i>Plumularia setacea</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	LOVÉN	1835	p. 256 note.
<i>Sertularia Templetoni</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 152.

<i>Plumularia setacea</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 165.
» »	TEMPLETON	1836	p. 467.
<i>Anisocalyx pinnatum</i> p. p.	COSTA	1838	p. 17.
<i>Sertularia Templetoni</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 123.
<i>Plumularia setacea</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 146, pl. 18, fig. 3-5.
» »	COUCH	1841	p. 42.
» »	HASSAL	1841 (b)	p. 285.
» »	MACGILLIVRAY	1842	p. 465.
» »	COUCH	1844	p. 33.
» »	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Aglaophenia setacea</i>	MENEGHINI	1845	p. 14, 15.
<i>Lowenia setacea</i>	MENEGHINI	1845	p. 14, 15.
? <i>Sertularia pinnata</i>	DENOTARIS	1846	p. 77 et 79.
<i>Plumularia setacea</i>	FORSTER	1847	p. 22.
» »	JOHNSTON	1847	p. 97, pl. 22, fig. 3-5.
? » »	LANDSBOROUGH	1847	p. 366
» »	THOMAS	1847	p. 471.
<i>Aglaophenia setacea</i>	GRAY	1848	p. 80.
? <i>Plumularia setacea</i>	LANDSBOROUGH	1848	p. 232.
» »	COCKS	1849	p. 93.

HINCKS (1868 p. 303) rapporte la *Plumularia setacea* de LANDSBOROUGH à sa *Plumularia similis*. Cette synonymie ne me paraît nullement certaine.

Gen. *Podocoryna* Sars 1846.

Voir : *Podocoryne*.

Gen. *Podocoryne* Sars 1846.

SARS a établi ce genre sous le nom de *Podocoryna*. L'orthographe admise aujourd'hui (soit *Podocoryne*) a été employée pour la première fois par LÜTKEN (1850). Il est probable que le genre *Dysmorphosa* de PHILIPPI est synonyme de *Podocoryne*, bien qu'ALLMAN le considère, avec doute, comme synonyme d'*Hydractinia*.

Podocoryne aculeata (Wagner.)

<i>Hydra oripara s. aculeata</i>	WAGNER	1833	p. 256. pl. 11. fig. 4-10.
<i>Coryna aculeata</i>	EURENBERG	1834	p. 294.
<i>Coryne aculeata</i>	LOVÉN	1835	p. 279.
» »	EDWARDS, M.	1836	p. 73.
<i>Coryna aculeata</i>	WAGNER	1836	p. 5. note.
? <i>Coryne vulgaris</i>	WAGNER	1841	p. 43. pl. 34. fig. 16, 17.
? » »	STEENSTRUP	1842	p. 24. 25.
? <i>Coryne echinata</i>	STEENSTRUP	1842	p. 25.
<i>Coryne aculeata</i>	KROHN	1843	p. 175. 178.
<i>Coryne vulgaris</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 7. 27.
<i>Coryna aculeata</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 8. 41.
» »	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 314.
» »	RATHKE	1844	p. 164.
<i>Hydra aculeata</i> Wagner			
sec.	SARS	1846	p. 5. 8.
<i>Coryne aculeata</i>	FREY II. LEUCKART	1847	p. 24.

Podocoryne carnea Sars.

? <i>Dysmorphosa conchicola</i>	PHILIPPI	1842	p. 37.
? » »	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 8. p. 45. note.
? » »	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 11.
? » »	QUATREFAGES	1845	p. 118.
<i>Podocoryna carnea</i>	SARS	1846	p. 4. pl. 1. fig. 7-18. pl. 2. fig. 5-11.
<i>Podocoryna albida</i>	SARS	1846	p. 7.
? <i>Dysmorphosa conchicola</i>	SARS	1846	p. 8. note.
<i>Podocoryna albida</i>	BENEDEN (van)	1847	p. 455 (excl. syn.).
<i>Podocoryna carnea</i>	BENEDEN (van)	1847	p. 455 (excl. syn.).
» »	LÜTKEN	1850	p. 33. 34.
? <i>Podocoryne Sarsii</i> Stp.			
sec.	LÜTKEN	1850	p. 33.

ALLMAN considère la *Dysmorphosa conchicola* de PHILIPPI comme synonyme d'*Hydractinia echinata*, mais on peut aussi

bien, avec SARS et KROHN, l'identifier avec la *Podocoryne carnea* qui paraît être beaucoup plus abondante dans le golfe de Naples.

Sous-gen. *Podopyxis* Ehrenberg 1834.

A supprimer. Voir à *Monopyxis*.

Gen. *Polypus* B. de St-Vincent 1824.

BORY DE ST-VINCENT a voulu remplacer le nom générique d'*Hydra* par celui de *Polypus*. Mais cette tentative a échoué et le genre *Polypus* n'a jamais été adopté.

[Gen. *Selaginopsis* Allman 1876, Modif.]

Voir : Matériaux I. p. 462.

Gen. *Sertularia* Lamarck 1816.

Voir : Matériaux I. p. 462.

WESTENDORP (1843) faisait rentrer dans ce genre la *Sertularia falcata* [*Hydrallmania falcata*.]

Gen. *Sertularella* Gray 1848.

GRAY, qui est l'auteur de ce genre, n'en a pas indiqué les caractères distinctifs. Cette lacune a été comblée par HINCKS (1868). ALLMAN après avoir adopté le genre *Sertularella* (1877, etc.) a modifié ses idées (1888) et fait rentrer les Sertularelles dans le genre *Sertularia*.

HARTLAUB (1901) a eu l'heureuse idée de soumettre les espèces du genre *Sertularella* à une revision complète. Grâce à cet auteur, le genre *Sertularella* semble être établi sur des bases solides. Nous avons adopté la synonymie qu'il a établie, bien qu'il soit

parfois difficile, lorsqu'il s'agit de descriptions d'anciens naturalistes, de retrouver les caractères distinctifs du genre *Sertularia*.

Sertularella Gaudichaudi (Lamouroux).

<i>Sertularia gaudichaudii</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 682.
»	»	LAMOUREUX	1824 (b) p. 615, pl. 90, fig. 4, 5.
»	»	EDWARDS. M.	1836 p. 152.

Sertularella Gayi (Lamouroux).

Syn. : *Sertularia Gayi* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 472.

? <i>Sertularia ericoïdes</i> var.	PALLAS	1766	p. 127.
<i>Sertularia Gayi</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 682.
»	»	BLAINVILLE	1830 p. 445.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 481.
»	»	EDWARDS. M.	1836 p. 152.
»	»	WESTENDORP	1843 p. 30.
<i>Sertularia polyzonias</i>			
var. β .	JOHNSTON	1847	p. 61, pl. 10, fig. 2.
<i>Sertularella polyzonias</i>			
var. β .	GRAY	1848	p. 69.

Sertularella Johnstoni (Gray).

<i>Sertularia Johnstoni</i>	GRAY	1843 (a)	p. 294.
-----------------------------	------	----------	---------

Sertularella milneana (d'Orbigny).

<i>Sertularia milneana</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	p. 26, pl. 11, fig. 6-8.
----------------------------	--------------	---------	--------------------------

Sertularella picta (Meyen).

<i>Sertularia picta</i>	MEYEN	1834	p. 201, pl. 34, fig. 1-3.
»	»	EDWARDS. M.	1836 p. 155.

Sertularella polyzonias (Linné).Syn. : *Sertularia polyzonias* Linné.

Voir : Matériaux I, p. 473.

<i>Sertularia polyzonias</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 681.
»	FABRICIUS	1824	p. 36.
»	BENNET et OLIVIER	1826	p. 195.
»	Risso	1826	p. 310.
»	HOGG	1827	p. 31.
»	FLEMING	1828	p. 542.
»	CHIAJE (delle)	1828-30	vol. 4, p. 128, 144, pl. 63, fig. 9.
»	RAPP	1829 (a)	p. 15.
»	BLAINVILLE	1830	p. 444.
»	CUVIER	1830	p. 301.
»	JOHNSTON	1832 (a)	p. 256.
»	BLAINVILLE	1834	p. 480.
»	DALYELL	1834	p. 415.
»	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	DALYELL	1835	p. 607.
»	EDWARDS. M.	1836	p. 142.
<i>Sertularia Ellisii</i>	EDWARDS. M.	1836	p. 142.
<i>Sertularia nigra</i> ?	JOHNSTON	1836	p. 468. note.
<i>Sertularia polyzonius</i>	TEMPLETON	1836	p. 468.
<i>Sertularia pinnata</i>	TEMPLETON	1836	p. 468.
? <i>Sertularia polyzonias</i>	COSTA	1838	p. 2, pl. 2, fig. 1 (Excl. syn. p. p.).
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 122, pl. 8, fig. 1-3.
<i>Sertularia Ellisii</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 123.
<i>Sertularia hibernica</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 128.
<i>Dynamena polyzonias</i>	COSTA	1839	p. 185.
<i>Sertularia polyzonias</i>	THOMPSON	1840	p. 250. note.
»	COUCH	1841	p. 32.
<i>Ellis Coralline</i>	COUCH	1841	p. 32.
<i>Sertularia polyzonias</i>	HASSAL	1841 (a)	p. 167.
<i>Sertularia ericoides</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 9.
<i>Sertularia polyzonias</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, pl. 18, 144, pl. 157, fig. 21.

<i>Sertularia polygonias</i>	HYNDMANN	1842	p. 20.
»	LANDSBOROUGH	1842	p. 258.
<i>Sertularia Ellisii</i>	COUCH	1844	p. 17.
<i>Sertularia polygonias</i>	COUCH	1844	p. 17.
»	FORBES	1844	p. 388.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Sertularia pinnata</i>	THOMPSON	1844	p. 285.
<i>Sertularia polygonias</i>	COUCH	1845	p. 165, pl. 13 A, fig. 10, 11.
»	DENOTARIS	1846	p. 77.
»	FORSTER	1847	p. 21.
<i>Sertularia polygonias</i> var. α .	JOHNSTON	1847	p. 61, pl. 10, fig. 1, 3.
<i>Sertularia polygonias</i>	LANDSBOROUGH	1847	p. 366.
<i>Sertularia Ellisii</i>	NARDO	1847 (a)	p. 8.
<i>Sertularia polygonias</i>	NARDO	1847 (a)	p. 8.
»	THOMAS	1847	p. 468.
»	DALYELL	1847-48 vol. 1,	p. 143, pl. 22.
<i>Sertularella polygonias</i> var. α .	GRAY	1848	p. 68.
<i>Sertularia polygonias</i>	LANDSBOROUGH	1848	p. 231.
»	COCKS	1849	p. 92.

Sertularella rugosa (Linné) Gray.¹

Syn. : *Sertularia rugosa* Linné.

Voir : Matériaux I, p. 475.

<i>Clytia rugosa</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 203.
<i>Sertularia rugosa</i>	BENNET et OLIVIER	1826	p. 185.
»	HOGG	1827	p. 32.
»	FLEMING	1828	p. 542.

¹ Nous avons cité, dans les « Matériaux, 1^{re} période », p. 475, comme synonyme de cette espèce, mais avec un ?, la *Sertularia rugosa* de FABRICIUS (1780, p. 443). D'après HARTLAUB (Revision der Sertularella-Arten, 1901, p. 127, note 2), WINTHER n'admet pas la présence de *S. rugosa* au Groënland et rapporte la citation de FABRICIUS à la *Sertularella tricuspidata*. Mais HARTLAUB croit plutôt qu'il s'agit de *S. tenella* (*geniculata* Hincks), car on ne peut guère admettre une confusion entre *S. rugosa* et *S. tricuspidata*.

<i>Campanularia rugosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 438.
<i>Sertularia rugosa</i>	CUVIER	1830	p. 300.
» »	JOHNSTON	1832 (a)	p. 257, pl. 11, fig. 3.
<i>Campanularia rugosa</i>	BLAINVILLE	1834	p. 473.
<i>Sertularia rugosa</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
» »	EDWARDS, M.	1836	p. 149.
<i>Clglia rugosa</i>	TEMPLETON	1836	p. 466.
<i>Sertularia rugosa</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 423, pl. 8, fig. 4-6.
? <i>Sertularia patagonica</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	p. 25, pl. 11, fig. 3-5.
<i>Sertularia rugosa</i>	COUCH	1841	p. 32.
» »	HASSAL	1841 (a)	p. 167.
» »	MACGILLIVRAY	1842	p. 463.
<i>Ellisia rugosa</i>	WESTENDORP	1843	p. 22, pl. fig. g, h, i, k.
<i>Sertularia rugosa</i>	COUCH	1844	p. 18.
» »	THOMPSON	1844	p. 283.
» »	FORSTER	1847	p. 21.
» »	JOHNSTON	1847	p. 63, pl. 10, fig. 4-6.
» »	LANDSBOROUGH	1847	p. 366.
» »	THOMAS	1847	p. 468.
<i>Sertularella rugosa</i>	GRAY	1848	p. 69.
<i>Sertularia rugosa</i>	LANDSBOROUGH	1848	p. 231.
» »	COCKS	1849	p. 92.

[*Sertularella tenella* (Alder 1856).]

<i>Sertularia rugosa</i> var.	JOHNSTON	1847	p. 64, fig. 8, c.
-------------------------------	----------	------	-------------------

[*Sertularella tricuspidata* (Alder 1856).]

Syn. : *Sertularia tricuspidata* Alder.

Voir : Matériaux I. p. 477.

Sertularella unilateralis (Lamouroux).

<i>Sertularia unilateralis</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 682.
» »	LAMOUROUX	1824 (b)	p. 615, pl. 90, fig. 1-3.
» »	EDWARDS, M.	1836	p. 152.

Gen. *Sertularia* Linné 1748.

Voir : Matériaux I, p. 463.

Sertularia abietina Linné.¹

Voir : Matériaux I, p. 463.

<i>Sertularia abietina</i>	SCHWEIGGER	1819	Tab. VIII.
»	FLEMING	1820	p. 88.
»	DESLONGCHAMPS	1824	p. 680.
»	FABRICIUS	1824	p. 32.
»	GLIEMANN	1824	p. 469.
»	HOFFMANN	1824	p. 259.
»	BENNETT ou OLIVIER	1826	p. 183.
»	RISSE	1826	p. 311.
»	HOGG	1827	p. 31.
<i>Dynamena abietina</i>	FLEMING	1828	p. 543.
<i>Sertularia abietina</i>	STARK	1828	p. 440.
»	BLAINVILLE	1830	p. 445.
»	CUVIER	1830	p. 301.
»	JOHNSTON	1832 (a)	p. 256.
»	BLAINVILLE	1834	p. 480, pl. 83, fig. 6, 6 a.
»	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	LISTER	1834	p. 371.
»	ORBIGNY (d ¹)	1834	p. 150.
»	DALYELL	1835	p. 602.
»	EDWARDS. M.	1836	p. 141.
»	TEMPLETON	1836	p. 468.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 130, pl. 10, fig. 1, 4.
»	COUCH	1841	p. 35.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 168.
»	HYNDMANN	1842	p. 20.
»	MAGGILLIVRAY	1842	p. 464.
»	WESTENDORP	1843	p. 28.
»	COUCH	1844	p. 22.

¹ Dans les « Matériaux, 1^{re} période », p. 465, supprimer : *Sertularia abietina* FABRICIUS 1780, p. 442.

<i>Sertularia alietina</i>	FORBES	1844	p. 388.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
»	DENOTARIS	1846	p. 77.
»	FORSTER	1847	p. 22.
»	JOHNSTON	1847	p. 75, pl. 13, fig. 1, 1'.
»	KÖLLIKER	1847	p. 49, pl. 2, fig. 21.
»	LEUCKART	1847 (a)	p. 137.
»	THOMAS	1847	p. 471.
»	DALYELL	1847-48 vol. I,	p. 150, pl. 23, 24.
<i>Sertularia abietinula</i>	DALYELL	1847-48 vol. I,	p. 157. pl. 25.
<i>Sertularia abietina</i>	GRAY	1848	p. 72.
»	LANDSBOROUGH	1848	p. 231.
»	COCKS	1849	p. 92.

Sertularia arbuscula Lamouroux.

Voir : Matériaux I. p. 465.

<i>Sertularia arbuscula</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 681.
»	BLAINVILLE	1830	p. 445.
»	BLAINVILLE	1834	p. 481.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 151.
»	KRAUSS	1837	p. 30.

Sertularia argentea Linné.

Voir : *Thuiaria argentea* (Linné).

Sertularia articulata Pallas

Voir : *Thuiaria articulata* (Pallas).

Sertularia bicuspidata Lamarck.

Voir : Matériaux I. p. 467.

<i>Sertularia bicuspidata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 150.
-------------------------------	-------------	------	---------

Sertularia bispinosa (Gray).

<i>Dynamene bispinosa</i>	GRAY	1843	p. 294.
---------------------------	------	------	---------

Sertularia cedrina Linné.[*Selaginopsis cedrina* Kirchenpauer 1884.]

Voir : Matériaux I, p. 467.

Sertularia conferræformis Esper.

Voir : Matériaux I, p. 468.

<i>Sertularia conferriformis</i>	BLAINVILLE	1830	p. 445.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 481.
<i>Sertularia conferræformis</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 140, 149.

Sertularia cupressina Linné.Voir : *Thuiaria cupressina* (Linné).*Sertularia cupressoides* Lepechin.Voir : *Thuiaria cupressoides* (Lepechin).*Sertularia dentata* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 469.

<i>Sertularia dentata</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 680.
»	»	BLAINVILLE	1830 p. 444.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 480.

Sertularia distans Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 469.

<i>Sertularia distans</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 681.
»	»	BLAINVILLE	1830 p. 445.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 481.
»	»	EDWARDS, M.	1836 p. 151.

Sertularia divaricata Lamareck.

Voir : Matériaux I. p. 469.

<i>Sertularia rigida</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 681.
»	BLAINVILLE	1830	p. 445.
<i>Sertularia divergens</i>	BLAINVILLE	1830	p. 446.
<i>Sertularia rigida</i>	BLAINVILLE	1834	p. 481.
<i>Sertularia divergens</i>	BLAINVILLE	1834	p. 481.
<i>Sertularia divaricata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 443.

Sertularia elongata Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 469.

<i>Sertularia elongata</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 681.
? <i>Sertularia scandens</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 681.
<i>Sertularia elongata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 445.
? <i>Sertularia scandens</i>	BLAINVILLE	1830	p. 445.
? <i>Sertularia millefolium</i>	BLAINVILLE	1830	p. 445.
<i>Sertularia lycopodium</i>	BLAINVILLE	1830	p. 446.
<i>Sertularia elongata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 481.
? <i>Sertularia scandens</i>	BLAINVILLE	1834	p. 481.
? <i>Sertularia millefolium</i>	BLAINVILLE	1834	p. 481.
<i>Sertularia lycopodium</i>	BLAINVILLE	1834	p. 481.
? <i>Sertularia millefolium</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 441.
<i>Sertularia lycopodium</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 442.
<i>Sertularia elongata</i>	KRAUSS	1837	p. 29.
»	COSTA	1838	p. 13.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 136.
<i>Dynamene abietinoides</i>	GRAY	1843 (a)	p. 294.
<i>Sertularia elongata</i>	JOHNSTON	1847	p. 82.
»	GRAY	1848	p. 75.

Sertularia falcata Linné.Voir : *Hydrallmania falcata* (Linné).

Sertularia fallax Johnston.[*Diphasia fallax* L. Agassiz 1862.]

<i>Dynamena pinnata</i>	FLEMING	1828	p. 545 (Excl. Syn.).
<i>Sertularia pinnata</i>	JOHNSTON	1838 (h)	p. 127, pl. 9, fig. 5, 6.
♀ " "	GOULD	1841	p. 350.
♀ " "	MACGILLIVRAY	1842	p. 463.
<i>Sertularia fallax</i>	JOHNSTON	1847	p. 73, pl. 11, fig. 2, 5, 6.
" "	THOMAS	1847	p. 469.
" "	GRAY	1848	p. 71.

Sertularia filicula Ellis et Solander.

Voir : Matériaux I. p. 471.

<i>Sertularia filicula</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 680.
" "	HOGG	1827	p. 32.
<i>Dynamena filicula</i>	FLEMING	1828	p. 544.
" "	BLAINVILLE	1830	p. 448.
<i>Sertularia filicula</i>	CUVIER	1830	p. 301.
" "	JOHNSTON	1832 (a)	p. 257.
<i>Dynamena filicula</i>	BLAINVILLE	1834	p. 483.
<i>Sertularia filicula</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
" "	EDWARDS, M.	1836	p. 146.
" "	JOHNSTON	1838 (b)	p. 131, pl. 11, fig. 1, 1'.
" "	THOMPSON	1840	p. 250.
" "	COUCH	1841	p. 35.
" "	HASSAL	1841 (a)	p. 168.
" "	HASSAL	1841 (b)	p. 284, 372.
" "	MACGILLIVRAY	1842	p. 464.
" "	COUCH	1844	p. 23.
" "	THOMPSON	1844	p. 283.
" "	FORSTER	1847	p. 21.
" "	JOHNSTON	1847	p. 76, pl. 14, fig. 1, 1'.
" "	THOMAS	1847	p. 471.
" "	GRAY	1848	p. 72.
" "	LANDSBOROUGH	1848	p. 231.
" "	COCKS	1849	p. 92.

Sertularia fruticosa Esper.Voir : *Lyptoscyphus fruticosus* (Esper).*Sertularia fusca* Johnston.

<i>Sertularia nigra</i>	JAMESON	1811	p. 565.
<i>Dynamena nigra</i>	FLEMING	1828	p. 545 (Excl. syn. p.p.)
»	BLAINVILLE	1830	p. 449 (Excl. syn.)
»	BLAINVILLE	1834	p. 484 (Excl. syn.)
? <i>Sertularia nigra</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 128 et 119, fig. 13.
<i>Sertularia fusca</i>	JOHNSTON	1847	p. 70, fig. 11 et p. 57, fig. 6.
»	THOMAS	1847	p. 470.
<i>Nigellastrum fusca</i>	GRAY	1848	p. 75.
<i>Nigellastrum fuscum</i>	GRAY	1848	p. 151.

Sertularia Gayi LamourouxVoir : *Sertularella Gayi* (Lamouroux).*Sertularia gracilis* Hassal.

? <i>Dynamena reptans</i>	COSTA	1838	p. 23, pl. 8 [?], fig. 2.
<i>Sertularia pumila</i> var.	JOHNSTON	1847	p. 67.
<i>Sertularia pumila</i> var. β	THOMAS	1847	p. 469.
<i>Sertularia gracilis</i>	GRAY	1848	p. 150.
»	HASSAL	1848 (a)	p. 2223.

Sertularia lichenastrum Pallas.Voir : *Thuiaria lichenastrum* (Pallas).*Sertularia obsoleta* Lepechin.[*Selaginopsis obsoleta* Kirchenpauer.]

Voir : Matériaux I, p. 472.

<i>Sertularia obsoleta</i>	CUVIER	1830	p. 301.
----------------------------	--------	------	---------

Sertularia pinnata Pallas (non Linné)¹.[*Diphasia pinnata* L. Agassiz 1862.]

Voir : Matériaux I, p. 472.

<i>Sertularia fuscescens</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 683.
<i>Sertularia nigra</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 683.
<i>Sertularia fuscescens</i>	BENNET et OLIVIER	1826	p. 183.
<i>Dynamena fuscescens</i>	BLAINVILLE	1830	p. 448.
<i>Sertularia fuscescens</i>	CUVIER	1830	p. 301.
<i>Dynamena fuscescens</i>	BLAINVILLE	1834	p. 483.
<i>Sertularia nigra</i>	EDWARDS. M.	1836	p. 155.
<i>Sertularia pinnata</i>	COUCH	1841	p. 34.
? <i>Sertularia nigra</i>	COUCH	1841	p. 34.
? " "	MAGILLIVRAY	1842	p. 463.
" "	COUCH	1844	p. 20, pl. 6.
<i>Sertularia pinnata</i>	COUCH	1844	p. 20 (Excl. syn. p.p.).
? <i>Sertularia nigra</i>	THOMPSON	1844	p. 285.
<i>Sertularia pinnata</i>	FORSTER	1847	p. 21.
<i>Sertularia nigra</i>	JOHNSTON	1847	p. 68, pl. 12, fig. 1, 2.
<i>Sertularia pinnata</i>	JOHNSTON	1847	p. 69, pl. 12, fig. 3, 4.
<i>Nigellastrum nigra</i>	GRAY	1848	p. 75.
<i>Nigellastrum pinnata</i>	GRAY	1848	p. 75.
<i>Nigellastrum nigrum</i>	GRAY	1848	p. 151.
<i>Nigellastrum pinnatum</i>	GRAY	1848	p. 151.
<i>Sertularia pinnata</i>	COCKS	1849	p. 92.
? <i>Sertularia nigra</i>	COCKS	1849	p. 92.

Sertularia pinus Gmelin.[*Selaginopsis pinus* Kirchenpauer 1884.]

Voir : Matériaux I, p. 473.

<i>Sertularia pinus</i>	CUVIER	1830	p. 301.
-------------------------	--------	------	---------

Sertularia polyzonias Linné.Voir : *Sertularella polyzonias* Linné).

¹ Dans les « Matériaux 1^{re} période », p. 473, supprimer : *Sertularia nigra* JAMESON 1811, p. 564.

Sertularia purpurea Linné.[*Selaginopsis purpurea* Kirchenpauer 1884.]

Voir : Matériaux I, p. 474.

Sertularia rugosa Linné.Voir : *Sertularella rugosa* (Linné).*Sertularia serra* Lamarck.

Voir : Matériaux I, p. 475.

<i>Sertularia serra</i>	RISSE	1826	p. 311.
<i>Dynamena serra</i>	BLAINVILLE	1830	p. 448.
»	BLAINVILLE	1834	p. 484.
<i>Sertularia serra</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 445.

Sertularia splendens Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 476.

<i>Sertularia splendens</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 681.
»	BLAINVILLE	1830	p. 444.
»	BLAINVILLE	1834	p. 480.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 451.

Sertularia tamarisca Linné.[*Diphasia tamarisca* L. Agassiz 1862.]

Voir : Matériaux I, p. 476.

<i>Sertularia tamarisca</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 680.
<i>Dynamena tamarisca</i>	FLEMING	1828	p. 543.
»	BLAINVILLE	1830	p. 448.
<i>Sertularia tamariscus</i>	CUVIER	1830	p. 301.
<i>Dynamena tamarisca</i>	BLAINVILLE	1834	p. 483.
<i>Sertularia tamarisca</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 453.
»	COSTA	1838	p. 13.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 130, pl. 10, fig. 2, 4.

<i>Sertularia tamerisca</i>	COSTA	1839	p. 185.
<i>Sertularia tamarisca</i>	COUCH	1841	p. 34.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 168.
»	MAGILLIVRAY	1842	p. 464.
»	WESTENDORP	1843	p. 28.
»	COUCH	1844	p. 21.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
»	FORSTER	1847	p. 21.
»	JOHNSTON	1847	p. 74, pl. 13, fig. 2-4.
»	THOMAS	1847	p. 470.
»	GRAY	1848	p. 72.
»	COCKS	1849	p. 92.

Sertularia thuja Linné.

Voir : *Thuiaria thuja* (Linné).

Sertularia tricuspidata Alder.

Voir : *Sertularella tricuspidata* (Alder).

Sertularia tridentata Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 477.

<i>Sertularia tridentata</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 680.
»	BLAINVILLE	1830	p. 445.
»	BLAINVILLE	1834	p. 481.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 151.

Gen. *Silicularia* Meyen 1834.

Le genre *Silicularia* appartient à la famille des Campanulacées. MEYEN, qui l'a établie, y faisait rentrer deux espèces : *S. rosea* et *S. gracilis*. Cette dernière ne peut pas être identifiée avec certitude vu l'absence d'individus reproducteurs. Quant à la *Silicularia rosea* elle semble être très voisine de l'espèce décrite par ALLMAN (1888) sous le nom d' *Hypanthea aggregata*.

Malheureusement, cet auteur ne paraît pas avoir eu connaissance du travail de MEYEN, qui a très bien représenté sur la figure IV de la pl. XXXV, le caractère principal sur lequel ALLMAN s'est appuyé pour établir le genre *Hypanthea*, soit l'épaisseur remarquable des parois de l'hydrothèque dont la cavité est très réduite. Il est donc juste de conserver le genre *Silicularia* dont *Hypanthea* n'est qu'un synonyme.

Silicularia rosea Meyen.

<i>Silicularia rosea</i>	MEYEN	1834	p. 204, pl. 35, fig. 4-11.
" "	EDWARDS, M.	1836	p. 136.

Gen. *Siphorus* Rafinesque-Schmaltz 1810.

GRAY (1848) fait figurer le genre *Siphorus* parmi les synonymes d'*Eudendrium*, mais en l'accompagnant d'un ? La description de RAFINESQUE-SCHMALTZ est si incomplète que cette synonymie paraît extrêmement douteuse. Ce genre n'a jamais été admis.

Gen. *Siphytus* Rafinesque-Schmaltz 1810.

Le *Siphytus obconicus* de RAFINESQUE-SCHMALTZ est considéré par GRAY (1848) comme synonyme de sa *Capsularia dumosa*, soit de la *Lafva dumosa*. Cette synonymie est très douteuse et, dans tous les cas, le genre *Siphytus* dont les caractères sont mal définis, doit disparaître.

Sous-gen. *Sporadopyxis* Ehrenberg 1834.

Voir à *Monopyxis*. Ce sous-genre n'a jamais été adopté et ne doit pas être conservé.

Gen. *Stauridium* Dujardin 1843.

Genre établi par DUJARDIN sous le nom de Stauridie. Modifié par HINCKS (1862). Voir à *Cladonema*.

Gen. *Stipula* Sars 1829.

Le genre *Stipula* de SARS est synonyme de *Coryne* et doit par conséquent disparaître.

Gen. *Syncoryne* Ehrenberg 1834.

EHRENBURG orthographiait, par erreur, ce nom : *Syncoryna*, au lieu de *Syncoryne*.

Les espèces qu'EHRENBURG réunissait sous le nom de *Syncoryna* appartiennent à des genres différents (*Coryne*, *Clava*, *Corydendrrium*). Il eût donc été naturel de supprimer ce nom. Mais ALLMAN (1871, p. 274) a préféré conserver le genre *Syncoryne* en lui attribuant de nouveaux caractères.

Syncoryne decipiens Dujardin.

<i>Syncoryna decipiens</i>	DUJARDIN	1845 (a) p. 1276.
" "	DUJARDIN	1845 (b) p. 262, 275. pl. 14. fig. B.

Syncoryne glandulosa Dujardin.

<i>Syncoryna glandulosa</i>	DUJARDIN	1845 (a) p. 1276.
" "	DUJARDIN	1845 (b) p. 262, 277.

Espèce douteuse.

Syncoryne Listeri van Beneden.

<i>Syncoryna Listerii</i>	BENEDEN (van)	1844 (b) p. 54. pl. 3. fig. 11-12 (Excl. Syn.).
" "	BENEDEN (van)	1844 (c) p. 313 (Excl. Syn.).

Espèce douteuse.

Syncoryne Loveni Sars.

<i>Syncoryna ramosa</i>	LOVÉN	1835	p. 275, pl. 8, fig. 1-6 (Excl. Syn.).
<i>Syncoryne ramosa</i>	STEENSTRUP	1842	p. 24, 25 (de la trad. allemande).
<i>Syncoryna Lovenii</i>	SARS	1846	p. 2, note.
<i>Syncoryne ramosa</i>	FREY U. LEUCKART	1847	p. 24.

[*Syncoryne mirabilis* (Agassiz 1862)].

<i>Syncoryne</i> sp.	DESOR	1849	p. 205, pl. 2, fig. 13-16.
----------------------	-------	------	----------------------------

Syncoryne Sarsi Lovén.

<i>Syncoryna Sarsii</i>	LOVÉN	1835	p. 275, pl. 8, fig. 7-10.
<i>Syncoryne Sarsii</i>	STEENSTRUP	1842	p. 21, 25 (de la trad. allemande).
<i>Syncoryna Sarsii</i>	KROHN	1843	p. 175, 176,
» »	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 25, 41, 53, 55.
» »	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 313.
» »	DUJARDIN	1845 (b)	p. 275.
» »	SARS	1846	p. 2, 10, 14, pl. 1, fig. 1-6.
<i>Syncoryne Sarsii</i>	FREY U. LEUCKART	1847	p. 20.
<i>Coryne Sarsii</i>	JOHNSTON	1847	p. 43.

Gen. *Synhydra* de Quatrefages 1843.

Ce genre doit disparaître. étant synonyme d'*Hydractinia*.

Gen. *Thoa* Lamouroux 1816.

Voir : Matériaux I, p. 478.

D'ORBIGNY (1839-46) a décrit sous le nom de *Thoa* plusieurs espèces nouvelles de Patagonie. Il est probable qu'elles doivent rentrer dans le genre *Halecium* (où nous les avons placées),

mais cela n'est pas absolument certain. Cette question ne pourra être résolue que par l'examen des types originaux ou de spécimens provenant des mêmes localités.

TEMPLETON (1836) écrivait *Thoea* au lieu de *Thoa*.

Gen. *Thuiaria* Fleming 1828.

Voir : Matériaux I. p. 478.

Ce genre a été établi par FLEMING d'après des caractères insuffisants. ALLMAN (1875) a modifié la diagnose de FLEMING en cherchant à la compléter, mais il n'est pas arrivé à un résultat très satisfaisant, car aujourd'hui encore certaines espèces sont placées tantôt dans le genre *Sertularia*, tantôt dans le genre *Thuiaria*. Tel est le cas pour les *Sertularia argentea* et *cupressina* que HINCKS (1868), et plus tard HARTLAUB (1894), maintiennent dans le genre *Sertularia*, tandis qu'ALLMAN (1875 et 1888) insiste pour qu'on les place dans le genre *Thuiaria*. Cette opinion a été adoptée par NUTTING (1901) et d'autres auteurs. Nous placerons donc ces espèces dans le genre *Thuiaria* tout en reconnaissant que les espèces de ce genre devront être soumises à une revision complète.

KIRCHENPAUER (1862) considère les *S. argentea* et *cupressina* comme synonymes, ou comme représentant tout au plus des variétés d'une même espèce.

Thuiaria argentea (Linné).

Syn. : *Sertularia argentea* Linné.

Voir : Matériaux I. p. 465.

<i>Sertularia fastigiata</i>	FABRICIUS	1780	p. 445.
<i>Sertularia argentea</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 682.
»	FABRICIUS	1824	p. 35.
»	BENNETT et OLIVIER	1826	p. 185.
»	HOGG	1827	p. 32.
<i>Dynamena argentea</i>	FLEMING	1828	p. 544.

<i>Sertularia argentea</i>	BLAINVILLE	1830	p. 445.
»	CEVIER	1830	p. 301.
»	JOHNSTON	1832 (a)	p. 258, pl. 11, fig. 4.
»	BLAINVILLE	1834	p. 480.
<i>Sertularia uber</i>	DALYELL	1834	p. 412.
<i>Sertularia argentea</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
<i>Dynamena argentea</i>	ORBIGNY (d')	1834	p. 150.
<i>Sertularia uber</i>	DALYELL	1835	p. 601.
<i>Sertularia argentea</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 143.
»	TEMPLETON	1836	p. 468.
»	COSTA	1838	p. 13.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 134, pl. 11, fig. 3, 3', pl. 12
»	COUCH	1841	p. 36.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 168.
»	MAGGILLIVRAY	1842	p. 464.
»	WESTENDORP	1843	p. 29.
»	COUCH	1844	p. 25.
»	FORBES	1844	p. 388.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
»	FORSTER	1847	p. 22.
»	JOHNSTON	1847	p. 79, pl. 15 et pl. 14, fig. 3, 3'.
»	THOMAS	1847	p. 471.
»	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 189, pl. 37, 38.
»	GRAY	1848	p. 73.
»	COCKS	1849	p. 92.

Thuiaria articulata (Pallas).

Syn. : *Sertularia articulata* Pallas.

Voir : Matériaux I, p. 467.

<i>Thuiaria articulata</i>	FLEMING	1828	p. 345.
<i>Biseriaria articulata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 446.
»	BLAINVILLE	1834	p. 482.
<i>Cellaria louchatis</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 186.

<i>Thuiaria articulata</i>	JOHNSTON	1838 (b) p. 138, pl. 15, fig. 3, 4.
»	COUCH	1841 p. 38.
»	HASSAL	1841 (b) p. 284, pl. 7, fig. 1, 2.
»	HYNDMANX	1842 p. 20.
»	COUCH	1844 p. 28, pl. 4.
»	THOMPSON	1844 p. 283.
»	JOHNSTON	1847 p. 84, pl. 18, fig. 3, 4.
»	THOMAS	1847 p. 471.
»	GRAY	1848 p. 76.
»	LANDSBOROUGH	1848 p. 241.
»	COCKS	1849 p. 92.

Thuiaria crisioides (Lamouroux).

<i>Dynamena crisioides</i>	LAMOUREUX	1824 (b) p. 613, pl. 90, fig. 11, 12.
»	LAMOUREUX	1824 (c) p. 291.
<i>Sertularia crisioides</i>	EDWARDS, M.	1836 p. 152.

Thuiaria cupressina (Linné).

Syn. : *Sertularia cupressina* Linné.

Voir : Matériaux I, p. 468.

<i>Sertularia cupressina</i>	DESLONGCHAMPS	1824 p. 682.
»	BENNET et OLIVIER	1826 p. 184.
»	RISSE	1826 p. 311.
»	HOGG	1827 p. 32.
<i>Dynamena cupressina</i>	FLEMING	1828 p. 543.
<i>Sertularia cupressina</i>	STARK	1828 p. 440.
»	BLAINVILLE	1830 p. 444.
»	CUVIER	1830 p. 301.
»	LINK	1832 p. 113.
»	BLAINVILLE	1834 p. 480.
»	EDWARDS, M.	1836 p. 144.
»	TEMPLETON	1836 p. 468.
»	COSTA	1838 p. 13.
»	JOHNSTON	1838 (b) p. 135, pl. 13.
<i>Dynamena cupressina</i>	COSTA	1839 p. 185.

<i>Sertularia cupressina</i>	COUCH	1844	p. 37.
" "	HASSAL	1844 (a)	p. 168.
" "	MAGILLIVRAY	1842	p. 464.
" "	WESTENDORP	1843	p. 29.
" "	COUCH	1844	p. 26.
" "	THOMPSON	1844	p. 283.
" "	BENEDEN (van)	1847	p. 453. pl. fig. 2-5.
" "	FÖRSTER	1847	p. 22.
" "	JOHNSTON	1847	p. 80, pl. 46.
" "	THOMAS	1847	p. 471.
" "	GRAY	1848	p. 74.
" "	COCKS	1849	p. 92.

Thuiaria cupressoides (Lepechin).

Syn. : *Sertularia cupressoides* Lepechin.

Voir : Matériaux I, p. 469.

<i>Sertularia cupressoides</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 683.
" "	FABRICIUS	1824	p. 36.
" "	BLAINVILLE	1830	p. 445.
" "	CUVIER	1830	p. 301.
" "	BLAINVILLE	1834	p. 480.
" "	JOHNSTON	1838 (b)	p. 436.
" "	JOHNSTON	1847	p. 82.
" "	GRAY	1848	p. 75.

[*Thuiaria fabricii* Nutting 1901]

<i>Sertularia fastigiata</i>	sec FABRICIUS	1780	p. 445.
------------------------------	---------------	------	---------

[*Thuiaria fenestrata* Bale 1884.]

Voir : Matériaux I, p. 478.

<i>Salacia tetracythura</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 673.
" "	BLAINVILLE	1830	p. 452.
" "	BLAINVILLE	1834	p. 487.

Thuiaria lichenastrum (Pallas).Syn. : *Sertularia lichenastrum* Pallas.

Voir : Matériaux I, p. 472.

<i>Sertularia lichenastrum</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 683,
»	CUVIER	1830	p. 301.

Thuiaria thuja (Linné).¹Syn. : *Sertularia thuja* Linné.

Voir : Matériaux I. p. 476.

<i>Sertularia tuja</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 682.
<i>Sertularia thuja</i>	FABRICIUS	1824	p. 34.
»	BENNET ou OLIVIER	1826	p. 186.
<i>Sertularia thuja</i>	RISSE	1826	p. 314.
<i>Sertularia thuja</i>	HOGG	1827	p. 32.
<i>Thuiaria thuia</i>	FLEMING	1828	p. 545.
<i>Biseriaria thuia</i>	BLAINVILLE	1830	p. 446.
<i>Sertularia thuja</i>	CUVIER	1830	p. 301.
<i>Thuiaria thuia</i>	JOHNSTON	1832 (a)	p. 261.
<i>Biseriaria thuia</i>	BLAINVILLE	1834	p. 482.
<i>Sertularia thuja</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
<i>Cellaria thuia</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 185.
<i>Thuiaria thuia</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 137, pl. 14 et pl. 15, fig. 1, 2.
»	COUCH	1841	p. 37.
»	HASSAL	1841 (b)	p. 372.
<i>Thuiaria thuia</i>	MAGILLIVRAY	1842	p. 464.
»	COUCH	1844	p. 27, pl. 5.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
»	FORSTER	1847	p. 22.
»	JOHNSTON	1847	p. 83, pl. 17 et pl. 18, fig. 1, 2.

¹ Dans les « Matériaux, 1^{re} période » p. 477, supprimer : *Sertularia thuja* FABRICIUS, 1780, p. 444.

<i>Thuaria thuia</i>	LANDSBOROUGH	1847	p. 366.
»	THOMAS	1847	p. 471.
<i>Sertularia thuia</i>	DALYELL	1847-48	vol. 2, p. 57, pl. 19. fig. 1-6.
<i>Thuaria thuja</i>	GRAY	1848	p. 76.
<i>Thuaria thuia</i>	COCKS	1849	p. 92.

Thuaria zelandica Gray.

<i>Thuaria zelandica</i>	GRAY	1843 (a)	p. 294.
--------------------------	------	----------	---------

Gen. *Tubularia* Linné 1758.

Voir : Matériaux I, p. 478.

Tubularia coronata Abildgaard.

Voir : Matériaux I, p. 479.

<i>Tubularia coronata</i>	EHRENBERG	1834	p. 295.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 426.
»	COUTHOFY	1839	p. 56.
»	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 8, p. 45 (Excl. Syn. ?).
»	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 6 et 49, pl. 1, fig. 7-19.
»	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 313.
»	DUJARDIN	1845 (b)	p. 270.
»	LEUCKART	1847 (a)	p. 137.
»	WAGENER	1847	p. 197, pl. 8, fig. 6-11.

Tubularia Dumortieri van Beneden.

<i>Tubularia Dumortieri</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 41, 50, pl. 2.
»	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 313.
»	DUJARDIN	1845 (b)	p. 270.
»	JOHNSTON	1847	p. 50, pl. 7, fig. 1-2.
»	GRAY	1848	p. 64.

Tabularia indivisa Linné.

Voir : Matériaux I. p. 479.

<i>Tabularia indivisa</i>	SCHWEIGGER	1819	p. 19, Tab. VIII.
»	DESLONGCHAMPS	1824	p. 757.
»	BENNET et OLIVIER	1826	p. 174.
»	FLEMING	1828	p. 552.
»	BLAINVILLE	1830	p. 435.
»	CUVIER	1830	p. 299.
»	JOHNSTON	1832 (a)	p. 252.
»	BLAINVILLE	1834	p. 470.
»	DALYELL	1834	p. 411.
<i>Tabularia calamaris</i>	EHRENBERG	1834	p. 295.
<i>Tabularia indivisa</i>	JOHNSTON	1834	p. 107.
»	LISTER	1834	p. 366, pl. 8, fig. 1.
»	DALYELL	1835	p. 600, 607.
»	DALYELL	1836	p. 93.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 125.
»	HARVEY	1838	p. 541.
»	JOHNSTON	1838 (b)	p. 113, pl. 3, fig. 1, 2.
»	COUTHOUY	1839	p. 55.
»	THOMPSON	1840	p. 250.
»	COUCH	1841	p. 29.
»	GOULD	1841	p. 350.
»	HASSAL	1841 (a)	p. 467.
9 »	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 5, p. 141, vol. 8, p. 45, pl. 100, fig. 14- 20 (Excl. syn.).
»	MACGILLIVRAY	1842	p. 463.
»	KROHN	1843	p. 178, 180.
»	WESTENDORP	1843	p. 35.
»	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 12.
<i>Tabularia calamaris</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 44, 46, pl. 1, fig. 1-6.
»	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 313.
<i>Tabularia indivisa</i>	COUCH	1844	p. 13, pl. 2, fig. 1, 2.
»	THOMPSON	1844	p. 283.
<i>Tabularia calamaris</i>	DUJARDIN	1845 (b)	p. 270.
2 <i>Tabularia ornata</i>	COUTHOUY	1846	p. 19, fig. 1.

<i>Tubularia indivisa</i>	DENOTARIS	1846	p. 77.
»	STEENSTRUP	1846	p. 67.
? <i>Tubularia ornata</i>	DANA	1846-49	p. 49, fig. 1 et p. 691.
<i>Tubularia indivisa</i>	FORSTER	1847	p. 21.
»	JOHNSTON	1847	p. 48, pl. 3, fig. 1, 2.
? <i>Tubularia coronata</i>	MENECHINI	1847	p. 103, pl. 2.
<i>Tubularia indivisa</i>	NARDO	1847 (a)	p. 8.
? <i>Tubularia Griselinii</i>	NARDO	1847 (b)	p. 104.
? <i>Tubularia indivisa</i>	RENIER	1847	p. 101, pl. 2.
»	THOMAS	1847	p. 467.
»	DALELL	1847-48	vol. 1, p. 2. pl. 1-4.
»	GRAY	1848	p. 64.
»	LANDSBOROUGH	1848	p. 230.
»	COCKS	1849	p. 92.

Tubularia larynx Ellis et Solander.

Voir : Matériaux I, p. 480.

<i>Corallina Tubularia la-</i>			
<i>ryngi similis</i>	BOMME	1771	p. 286, pl., fig. 1-7.
<i>Tubularia muscoides</i>	BENNET et OLIVIER	1826	p. 176 (Excl. syn. p.p.).
<i>Tubularia larynx</i>	HOGG	1827	p. 34.
<i>Tubularia muscoides</i>	FLEMING	1828	p. 552.
<i>Tubularia larynx</i>	RAPP	1829 (a)	p. 15.
<i>Tubularia muscoides</i>	BLAINVILLE	1830	p. 435 (Excl. syn. p.p.).
»	CUVIER	1830	p. 299.
»	BLAINVILLE	1834	p. 470 (Excl. syn. p.p.).
<i>Eudendrium bryoides</i>	EHRENBERG	1834	p. 296.
? <i>Eudendrium splendidum</i>	EHRENBERG	1834	p. 296.
<i>Tubularia larynx</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 126.
? <i>Eudendrium splendidum</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 127.
<i>Tubularia gracilis</i>	HARVEY	1836	p. 54.
<i>Tubularia larynx</i>	JOHNSTON	1838 (b)	p. 115, pl. 3, fig. 3 et pl. 4, fig. 4, 5.
»	THOMPSON	1840	p. 250.
<i>Tubularia muscoides</i>	THOMPSON	1840	p. 250.
<i>Windpipe coralline</i>	COUCH	1841	p. 30.
<i>Tubularia larynx</i>	GOULD	1841	p. 350.

<i>Tubularia larynx</i>	HASSAL	1841 (b) p. 284.
" "	CHIAJE (delle)	1841-44 vol. 8, p. 45 (Excl. syn.).
" "	MAGGILLIVRAY	1842 p. 463.
<i>Tubularia muscoides</i>	WESTENDORP	1843 p. 36.
<i>Tubularia laryngea</i>	BENEDEN (van)	1844 (b) p. 49.
<i>Tubularia larynx</i>	BENEDEN (van)	1844 (b) p. 48.
<i>Eudendrium bryoides</i>	BENEDEN (van)	1844 (c) p. 313.
<i>Eudendrium splendidum</i>	BENEDEN (van)	1844 (c) p. 314.
<i>Tubularia larynx</i>	COUCH	1844 p. 43. pl. 2, fig. 3.
" "	THOMPSON	1844 p. 283.
<i>Tubularia muscoides</i>	THOMPSON	1844 p. 283.
<i>Tubularia larynx</i>	FORSTER	1847 p. 21.
" "	JOHNSTON	1847 p. 50. pl. 3, fig. 3. pl. 5, fig. 3, 4.
<i>Tubularia gracilis</i>	JOHNSTON	1847 p. 52. pl. 4, fig. 3-5.
<i>Tubularia muscoides</i>	RENIER	1847 p. 104.
<i>Eudendrium bryoides</i>	RENIER	1847 p. 104.
<i>Tubularia larynx</i>	THOMAS	1847 p. 467.
" "	DALYELL	1847-48 vol. I, p. 42. pl. 5.
" "	GRAY	1848 p. 64.
<i>Tubularia gracilis</i>	GRAY	1848 p. 65.
<i>Tubularia larynx</i>	KOREN et DANIELS-SEN	1848 p. 254.
" "	LANDSBOROUGH	1848 p. 230.
" "	COCKS	1849 p. 92.
<i>Tubularia gracilis</i>	COCKS	1849 p. 92.

Gen. *Tuliparia* Blainville 1830.

Ce genre est synonyme du genre *Pasythea* de LAMOUREUX. Il doit donc disparaître.

Gen. *Zelleria* Duchassaing 1850.

Ce genre devrait rentrer probablement dans les Campanulacées, mais on n'en connaît pas le gonosome. La description de DUCHASSAING étant très incomplète, ce genre n'a jamais été adopté.

MÉDUSES

(Anthoméduses — Leptoméduses.)

Æquorea ciliata Eschscholtz.

<i>Æquorea ciliata</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 109, pl. 9, fig. 1.
<i>Æquorea ciliata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 279.
<i>Æquorea ciliata</i>	LESSON	1843	p. 306.

Æquorea eurodina Péron et Lesueur.

Voir : Matériaux I, p. 481.

<i>Æquorea eurodina</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 371.
»	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 110.
»	BLAINVILLE	1830	p. 255.
»	BLAINVILLE	1834	p. 277.
»	DUJARDIN	1840	p. 220.
»	LESSON	1843	p. 310.

Æquorea forskalea Péron et Lesueur.

Voir : Matériaux I, p. 482.

<i>Æquorea forskalea</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 370.
<i>Medusa æquorea</i>	BENNET et OLIVIER	1826	p. 98.
<i>Æquorea forskaliana</i>	RISSE	1826	p. 294.
<i>Æquorea forskalina</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 109.
<i>Æquorea forskalea</i>	BLAINVILLE	1830	p. 255.
? <i>Medusa æquorea</i>	CUVIER	1830	p. 276.
<i>Æquorea forskalea</i>	BLAINVILLE	1834	p. 277.
»	DUJARDIN	1840	p. 136.
»	CHIAJE (delle)	1841-44, vol. 4,	p. 92, 105 et vol. 5, p. 130, pl. 148, fig. 7.
»	LESSON	1843	p. 305.
<i>Æquorea forskalii</i>	VERANY	1846	p. 85.

Æquorea violacea M. Edwards.

<i>Æquorea violacea</i>	EDWARDS, M.	1836-49, pl. 42, fig. 1.
»	EDWARDS, M.	1841 p. 195. pl. 1.
»	LESSON	1843 p. 306.

Amphinema titania Hæckel.

Voir : Matériaux I. p. 482.

<i>Dianura dinema</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 247.
<i>Oceania diadema</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 98.
<i>Oceania dinema</i>	BLAINVILLE	1830 p. 258.
»	BLAINVILLE	1834 p. 282.
<i>Dianura diadema</i>	DUJARDIN	1840 p. 155.
<i>Oceania diadema</i>	DUJARDIN	1840 p. 163.
<i>Oceania dinema</i>	LESSON	1843 p. 319.
<i>Sapientia dinema</i>	FORBES	1846 p. 286.
»	FORBES	1848 p. 25, pl. 2. fig. 4 (Excl. syn.)
<i>Oceania diadema</i>	GRAY	1848 p. 33.
<i>Sapientia dinema</i>	COCKS	1849 p. 90.

Berenice rosea Eschscholtz.

Voir : Matériaux I. p. 482.

<i>Æquorea euchroma</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 372.
<i>Æquorea rosea</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 372.
»	STARK	1828 p. 413.
<i>Berenice carisochroma</i>	STARK	1828 p. 414.
<i>Berenice euchroma</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 120.
<i>Berenice rosea</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 120.
<i>Curieria carisochroma</i>	CUVIER	1830 p. 280.
<i>Berenice curieria</i>	BLAINVILLE	1834 p. 276.
<i>Berenice carisochroma</i>	PÉRON et LESUEUR	1836-39, pl. 53, fig. 1.
<i>Æquorea euchroma</i>	DUJARDIN	1840 p. 132.
<i>Æquorea rosea</i>	DUJARDIN	1840 p. 132.
<i>Berenice curiera</i>	LESSON	1843 p. 297.

Catablema campanula Hæckel.

Voir : Matériaux I. p. 482.

<i>Dianæa campanula</i>	LAMOUROUX	1824 (c) p. 249.
<i>Melicertum campanula</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 105.
<i>Melicerta campanula</i>	BLAINVILLE	1830 p. 260.
»	BLAINVILLE	1834 p. 284.
<i>Dianæa campanula</i>	DUJARDIN	1840 p. 158.
<i>Campanella fabricii</i>	LESSON	1843 p. 281.

Cladocanna thalassina Hæckel.

Voir : Matériaux I. p. 482.

<i>Æquorea thalassina</i>	LAMOUROUX	1824 (c) p. 373.
<i>Berenice thalassina</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 120.
<i>Berenice euchroma</i>	BLAINVILLE	1830 p. 254.
<i>Berenice thalassina</i>	BLAINVILLE	1830 p. 254.
<i>Berenice euchroma</i>	BLAINVILLE	1834 p. 276, pl. 32, fig. 1.
<i>Berenice thalassina</i>	BLAINVILLE	1834 p. 276.
<i>Berenix euchroma</i>	PÉRON et LESUEUR	1836-49, pl. 53, fig. 2.
<i>Æquorea thalassina</i>	DUJARDIN	1840 p. 133.
<i>Berenix euchroma</i>	LESSON	1843 p. 296.
<i>Berenix thalassina</i>	LESSON	1843 p. 297.

Cladonema radiatum Dujardin.

<i>Cladonema radiatum</i>	DUJARDIN	1843 p. 1134.
»	DUJARDIN	1845 (b) p. 272, pl. 15, fig. C.

Codonium gemmiferum Hæckel.

<i>Sarsia gemmifera</i>	FORBES	1848 p. 57, pl. 7, fig. 2.
»	LOCKS	1850 p. 12.
»	HUXLEY	1850 p. 66.
»	LÜTKEN	1850 p. 34.

Codonium pulchellum Hæckel.

<i>Sarsia pulchella</i>	FORBES	1848 p. 57, pl. 6, fig. 3.
»	LOCKS	1850 p. 12.

Conis mîtrata Brandt.

<i>Conis mîtrata</i>	BRANDT	1834	p. 19 (du tirage à part).
»	»	BRANDT	1838 p. 355, pl. 2.
»	»	DUJARDIN	1840 p. 167.
»	»	LESSON	1843 p. 286.

Cytacis tetrastyla Eschscholtz.

<i>Cytacis tetrastyla</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 104, pl. 8, fig. 2.
<i>Cytacis tetrastylla</i>	BLAINVILLE	1834	p. 285, pl. 38, fig. 2.
<i>Cytacis tetrastylis</i>	LOVÉN	1835	p. 280.
<i>Cytacis tetrastyla</i>	DUJARDIN	1840	p. 166.
»	»	LESSON	1843 p. 280.
»	»	WILL	1844 p. 67.
»	»	LÜTKEN	1850 p. 29.

Dinema Slabberi van Beneden.

Voir : Matériaux I. p. 483.

<i>Oceania microscopica</i>	BLAINVILLE	1830	p. 258.
»	»	EHRENBERG	1836 (a) p. 538.
»	»	LESSON	1843 p. 321.

Diporena halterata Hæckel.

<i>Slabberia halterata</i>	FORBES	1846	p. 286.
»	»	GRAY	1848 p. 35.
»	»	FORBES	1848 p. 53, pl. 6, fig. 1.
»	»	COCKS	1849 p. 91.

Eleutheria dichotoma Quatrefages.

<i>Eleutheria dichotoma</i>	QUATREFAGES	1842 (a)	p. 168.
»	»	QUATREFAGES	1842 (b) p. 270, pl. 8.
»	»	BENEDEN (van)	1844 (c) p. 305.
»	»	BENEDEN (van)	1845 p. 124.
»	»	QUATREFAGES	1845 p. 116.
»	»	FREY u. LEUCKART	1847 p. 24.

Epenthesis cymbaloidea Hæckel.

Voir : Matériaux I. p. 483.

<i>Dianæa cymbalarioides</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 250.
<i>Thaumantias cymbaloidea</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 102.
<i>Oceania cymballoidea</i>	BLAINVILLE	1830	p. 258.
<i>Medusa cymballoides</i>	CUVIER	1830	p. 277.
<i>Thaumantias cymbaloidia</i>	BLAINVILLE	1834	p. 285, pl. 37, fig. 2-4.
<i>Dianæa cymbalarioides</i>	DUJARDIN	1840	p. 158.
<i>Thaumantias cymballoidea</i>	DUJARDIN	1840	p. 161.
<i>Thaumantias Thompsonii</i>	FORBES	1841	p. 84, pl. 1, fig. 4 a et b.
<i>Thaumantias cymballoiden</i>	FORBES	1841	p. 85.
<i>Thaumantias cymballoiden</i>	LESSON	1843	p. 334.
<i>Thaumantias Thompsonii</i>	LESSON	1843	p. 336.
" "	THOMPSON	1844	p. 281.
" "	FORBES	1848	p. 49, pl. 11, fig. 5.
<i>Thaumantias cymbaloidea</i>	GRAY	1848	p. 35.
<i>Thaumantias Thompsonii</i>	GRAY	1848	p. 35.
" "	COCKS	1850	p. 12.

Epenthesis maculata Hæckel.

<i>Thaumantias maculata</i>	FORBES	1848	p. 45, pl. 9, fig. 4.
-----------------------------	--------	------	-----------------------

Eucope octona Hæckel.

<i>Thaumantias octonn</i>	FORBES	1848	p. 44, pl. 8, fig. 4.
" "	COCKS	1849	p. 91.

Eucopium quadratum Hæckel.

<i>Thaumantias quadrata</i>	FORBES	1848	p. 43, pl. 9, fig. 2.
" "	COCKS	1850	p. 12.

Euphysa aurata Forbes.

<i>Euphysa aurata</i>	FORBES	1848	p. 71, pl. 13, fig. 3.
-----------------------	--------	------	------------------------

Hippocrene macleodiana Hæckel.

<i>Cyanea Bougainvillii</i>	LESSON	1830	p. 148, pl. 14, fig. 3 gn.
<i>Bougainvillia macleodiana</i>	LESSON	1836	p. 262 (Excl. syn.)
<i>Bougainvillia macleodiana</i>	LESSON	1843	p. 290.

Hippocrene mertensi Hæckel.

<i>Hippocrene Bougainvillii</i>	BRANDT	1834	p. 29 (du tirage à part).
»	»	BRANDT	1838 p. 393, pl. 20.
»	»	DUJARDIN	1840 p. 151.
»	»	FORBES	1841 p. 83.

Hippocrene superciliaris L. Agassiz.

<i>Hippocrene superciliaris</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	p. 273, pl. 1-3.
---------------------------------	-------------	----------	------------------

Irene pellucida Hæckel.

Voir : Matériaux I. p. 483.

<i>Dianaea gibbosa</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 247.
? <i>Oceania gibbosa</i>	RISSE	1826	p. 300.
<i>Dianaea lucullana</i>	CHIAJE (delle)	1828-30	pl. 74, fig. 1.
? <i>Eirene gibbosa</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 94.
<i>Oceania gibba</i>	BLAINVILLE	1830	p. 258.
<i>Dianaea gibbosa</i>	BLAINVILLE	1834	p. 289.
»	»	DUJARDIN	1840 p. 156.
<i>Dianaea lucullana</i>	CHIAJE (delle)	1841-44.	vol. 4, p. 93, 103, 104, vol. 5, p. 131, pl. 142, fig. 1-2, pl. 147, fig. 4, 8, 9, 15.
? <i>Dianaea gibbosa</i>	LESSON	1843	p. 328.
<i>Geryonia pellucida</i>	WILL	1844	p. 70, pl. 2, fig. 8.
<i>Dianaea lucullea</i>	VERANY	1846	p. 84.
<i>Geryonia pellucida</i>	FREY H. LEUCKART	1847	p. 38.
? »	»	LEUCKART	1847 (a) p. 138, 139.
»	»	LÜTKEN	1850 p. 30.

Irene viridula Eschscholtz.

Voir : Matériaux I, p. 483.

<i>Dianæa viridula</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 247.
<i>Eivene viridula</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 94.
<i>Oceania viridula</i>	BLAINVILLE	1830 p. 258.
<i>Dianæa viridula</i>	BLAINVILLE	1834 p. 289.
» »	DEJARDIN	1840 p. 156.
» »	LESSON	1843 p. 328.
? <i>Medusa crinita</i>	DALYELL	1847-48 vol. 2. p. 248, pl. 52. fig. 1-2.
<i>Geryonopsis delicatula</i>	FORBES	1848 p. 39, pl. 9, fig. 1.
<i>Thaumantias cymbaloidea</i>	FORBES	1848 pl. 9, fig. 1.
<i>Geryonopsis delicatula</i>	COCKS	1849 p. 91.

Laodice cruciata L. Agassiz.

Voir : Matériaux I, p. 483.

<i>Medusa crucigera</i>	BOSC	1802 vol. 2, p. 143.
» »	SERRES (de)	1822 p. 81.
<i>Medusa cruciata</i>	GLEIMANN	1824 p. 169.
<i>Callirhæ basteriana</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 164.
<i>Dianæa lineata</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 246.
<i>Aurelia crucigera</i>	RISSE	1826 p. 298.
<i>Oceania lineolata</i>	RISSE	1826 p. 299.
<i>Medusa cruciata</i>	HOGG	1827 p. 31.
<i>Medusa crucigera</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 66.
<i>Oceania lineolata</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 97.
<i>Oceania cacuminata</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 100.
<i>Callirhæ basteriana</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 101.
<i>Oceania lineolata</i>	BLAINVILLE	1830 p. 257.
<i>Aurelia rufescens</i>	BLAINVILLE	1830 p. 264.
<i>Callirhæ basteriana</i>	BLAINVILLE	1830 p. 265.
» »	CUVIER	1830 p. 278.
<i>Oceania cacuminata</i>	BLAINVILLE	1834 p. 282.
<i>Oceania lineolata</i>	BLAINVILLE	1834 p. 282.
<i>Aurelia rufescens</i>	BLAINVILLE	1834 p. 294.

<i>Callirhæ busteriana</i>	BLAINVILLE	1834	p. 294, pl. 35, fig. 2.
»	DUJARDIN	1840	p. 145.
<i>Dianæa lineolata</i>	DUJARDIN	1840	p. 155.
<i>Oceania lineolata</i>	DUJARDIN	1840	p. 163.
<i>Oceania cucuminata</i>	DUJARDIN	1840	p. 164.
<i>Aurelia crucigera</i>	DUJARDIN	1840	p. 176.
<i>Oceania cruciata</i>	WAGNER	1841	p. 44, pl. 33, fig. 26-31.
<i>Callirhæ busteriana</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	vol. 4, p. 94, 105, vol. 5, p. 132, pl. 139, fig. 3-5.
<i>Oceania cruciata</i>	KOELLIKER	1843	p. 81.
<i>Laodice crucigera</i>	LESSON	1843	p. 294.
<i>Oceania lineolata</i>	LESSON	1843	p. 318.
<i>Callirhæ busteriana</i>	LESSON	1843	p. 345.
<i>Callirhæ Basteri</i>	VERANY	1846	p. 84.
<i>Aurelia crucigera</i>	VERANY	1846	p. 85.
<i>Thaumantias pilosella</i>	FORBES	1848	p. 42, pl. 8, fig. 1.
»	COCKS	1849	p. 91.
»	AGASSIZ. L.	1850 (a)	p. 133.

Limnorea proboscidea Hæckel.

Voir : Matériaux I, p. 484.

<i>Dianæa triedra</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 246.
<i>Limnorea triedra</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 95.
»	BLAINVILLE	1830	p. 262.
»	BLAINVILLE	1834	p. 290, pl. 40, fig. 2, 2 a.
»	PÉRON et LESUEUR	1836-49	pl. 52, fig. 1.
<i>Dianæa triedra</i>	DUJARDIN	1840	p. 152.
<i>Limnorea triedra</i>	LESSON	1843	p. 338.

Lizzia blondina Forbes.

<i>Lizzia blondina</i>	FORBES	1848	p. 67, pl. 12, fig. 4.
»	COCKS	1850	p. 12.

Margelis principis Steenstrup.

<i>Margelis principis</i>	STEENSTRUP	1850	p. 35.
---------------------------	------------	------	--------

Margelis ramosa L. Agassiz.

<i>Hippocrene britannica</i>	FORBES	1841	p. 84, pl. 4, fig. 2 a.
<i>Bugainvillia britannica</i>	LESSON	1843	p. 291.
<i>Hippocrene britannica</i>	THOMPSON	1844	p. 281.
<i>Medusa oculia</i>	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 70, pl. 11, fig. 9-10.
<i>Medusa octocilia</i>	DALYELL	1847-48	vol. 4, p. 70, pl. 11, fig. 9-10.
<i>Medusa duodecilia</i>	DALYELL	1847-48	vol. 4, p. 70, pl. 11, fig. 11-12.
<i>Bugainvillia britannica</i>	GRAY	1848	p. 36.
<i>Bougainvillea britannica</i>	FORBES	1848	p. 62, pl. 12, fig. 4.
<i>Bougainvillia britannica</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	p. 273.

Margellium octopunctatum Hæckel.

<i>Lizzia octopunctata</i>	FORBES	1848	p. 64, pl. 12, fig. 3.
»	GRAY	1848	p. 36.

Melicertidium octocostatum Hæckel.

<i>Oceania octocostata</i>	SARS	1835	p. 24, pl. 4, fig. 9 a-d.
<i>Melicertum campanulatum</i>	EHRENBERG	1836 (a)	p. 538.
»	EHRENBERG	1837	p. 190, 255, pl. 8, fig. 5-7.
<i>Oceania octocostata</i>	DUJARDIN	1840	p. 164.
<i>Equorea octocostata</i>	LESSON	1843	p. 312.
<i>Melicertum campanulatum</i>	THOMPSON	1844	p. 281.
<i>Equorea octocostata</i>	FORBES	1846	p. 286.
<i>Thaumantias milleri</i>	LANDSBOROUGH	1847	p. 265.
<i>Stomobrachium octocostatum</i>	FORBES	1848	p. 30, pl. 4, fig. 1.
<i>Equorea octocostata</i>	GRAY	1848	p. 34.
<i>Stomobrachium octocostatum</i>	CLOCKS	1849	p. 91.

Mesonema abbreviata Eschscholtz.

<i>Mesonema abbreviata</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 113, pl. 11, fig. 3.
----------------------------	-------------	------	-------------------------

<i>Equeorea abbreviata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 278, pl. 38. fig. 4.
<i>Mesonema abbreviata</i>	DUJARDIN	1840	p. 135.
" "	LESSON	1843	p. 316.

Mesonema cœrulescens Brandt.

<i>Mesonema (Zygodactyla)</i>			
<i>cœrulescens</i>	BRANDT	1834	p. 21 (du tirage à part).
" "	BRANDT	1838	p. 360. pl. 5.
" "	DUJARDIN	1840	p. 135.
<i>Mesonema cœrulescens</i>	LESSON	1843	p. 317.

Mesonema dubium Brandt.

<i>Mesonema dubium</i>	BRANDT	1838	p. 361. pl. 26.
" "	DUJARDIN	1840	p. 136.
" "	LESSON	1843	p. 318.

Mesonema macrodactylum Brandt.

<i>Mesonema macrodactyla</i>	BRANDT	1834	p. 21 (du tirage à part).
<i>Mesonema macrodactylum</i>	BRANDT	1838	p. 359. pl. 4.
<i>Mesonema macrodactyla</i>	DUJARDIN	1840	p. 135.
" "	LESSON	1843	p. 317.

Mesonema pensile Hæckel.

Voir : Matériaux I. p. 484.

<i>Equeorea mesonema</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 370.
<i>Mesonema cælum-pensile</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 112.
<i>Equeorea mesonema</i>	BLAINVILLE	1830	p. 255.
" "	CUVIER	1830	p. 276.
<i>Equeorea cælum-pensile</i>	BLAINVILLE	1834	p. 278.
<i>Equeorea mesonema</i>	DUJARDIN	1840	p. 134.
<i>Mesonema cælum-pensile</i>	LESSON	1843	p. 316.
<i>Equeorea mesonema</i>	VERANY	1846	p. 85.

Modeeria formosa Forbes.

<i>Modeeria formosa</i>	FORBES	1848	p. 70, pl. 7, fig. 1.
" "	GRAY	1848	p. 36.
" "	GRAY	1848	p. 156.

Nemopsis Bachei L. Agassiz.

<i>Nemopsis Bachei</i>	AGASSIZ. L.	1850 (a)	p. 289, fig.
------------------------	-------------	----------	--------------

Nemopsis favonia Hæckel.

Voir : Matériaux I. p. 485.

<i>Orythia octonema</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 586.
<i>Favonia octonema</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 95.
" "	BLAINVILLE	1830	p. 262.
" "	BLAINVILLE	1834	p. 290, pl. 40, fig. 1.
<i>Orythia octonema</i>	DUJARDIN	1840	p. 146.
<i>Favonia octonema</i>	LESSON	1843	p. 338.

Obelia diaphana Allman.

<i>Thaumantias diaphana</i>	AGASSIZ. L.	1850 (a)	p. 300, fig.
-----------------------------	-------------	----------	--------------

Obelia leucostyla L. Agassiz.

<i>Thaumantias leucostyla</i>	WILL.	1844	p. 73, pl. 2, fig. 16.
-------------------------------	-------	------	------------------------

Obelia lucifera Hæckel.

<i>Medusa fimbriata</i>	DALYELL	1847-48	vol. 2, p. 251, pl. 52. fig. 6-7.
<i>Thaumantias lucifera</i>	FORBES	1848	p. 52, pl. 10, fig. 2.
<i>Thaumantias lucida</i>	FORBES	1848	p. 10, fig. 2.
<i>Thaumantias lucifera</i>	COCKS	1849	p. 91.

Obelia plana Hæckel.

<i>Thaumantias plana</i>	SARS	1835	p. 28, pl. 5, fig. 13 a-g.
--------------------------	------	------	----------------------------

? *Animalculum tintinnu-*

<i>bulum</i>	DALYELL	1836	p. 91, fig. 1.
--------------	---------	------	----------------

<i>Thaumantias plana</i>	DUJARDIN	1840	p. 162.
--------------------------	----------	------	---------

»	»	FORBES	1841	p. 85.
---	---	--------	------	--------

»	»	LESSON	1843	p. 336.
---	---	--------	------	---------

? <i>Tintinnubulum</i>	DALYELL	1847-48	vol. 1, p. 216, pl. 41. fig. 7-9.
------------------------	---------	---------	--------------------------------------

Obelia sphaerulina Péron et Lesueur.

Voir : Matériaux I, p. 485.

<i>Obelia sphaerulina</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 572.
---------------------------	---------------	------	---------

<i>Obelia sphaerulina</i>	BLAINVILLE	1830	p. 257.
---------------------------	------------	------	---------

»	»	BLAINVILLE	1834	p. 281, pl. 41, fig. 3, 3a.
---	---	------------	------	-----------------------------

<i>Obelia sphaerulina</i>	DUJARDIN	1840	p. 170.
---------------------------	----------	------	---------

»	»	LESSON	1843	p. 267.
---	---	--------	------	---------

Orchistoma pileus Hæckel.

<i>Mesovema pileus</i>	LESSON	1843	p. 347, pl. 4, fig. 1.
------------------------	--------	------	------------------------

Pandea conica Lesson.

<i>Dinnaea conica</i>	QUOY et GAIMARD	1827	p. 182, pl. 6 A, fig. 3-4.
-----------------------	-----------------	------	----------------------------

<i>Oceania conica</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 99.
-----------------------	-------------	------	--------

<i>Aglaura conica</i>	BLAINVILLE	1830	p. 259.
-----------------------	------------	------	---------

<i>Oceania conica</i>	BLAINVILLE	1834	p. 283.
-----------------------	------------	------	---------

»	»	DUJARDIN	1840	p. 163.
---	---	----------	------	---------

<i>Pandea conica</i>	LESSON	1843	p. 288.
----------------------	--------	------	---------

Pandea saltatoria Lesson.

Voir : Matériaux I, p. 485.

<i>Oceania bimorpha</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 99.
-------------------------	-------------	------	--------

»	»	BLAINVILLE	1834	p. 282.
---	---	------------	------	---------

<i>Oceania saltatoria</i>	SARS	1835	p. 25, pl. 4, fig. 10 a-c.
---------------------------	------	------	----------------------------

<i>Oceania bimorpha</i>	DUJARDIN	1840	p. 163.
-------------------------	----------	------	---------

<i>Oceania saltatoria</i>	DUJARDIN	1840	p. 165.
---------------------------	----------	------	---------

<i>Pandea saltatoria</i>	LESSON	1843	p. 290.
--------------------------	--------	------	---------

<i>Oceania bimorpha</i>	LESSON	1843	p. 320.
-------------------------	--------	------	---------

Phialidium variabile Hæckel.

Voir : Matériaux I. p. 485.

<i>Dianæa phosphorica</i>	LAMOUROUX	1824 (c) p. 246.
<i>Dianæa flavidula</i>	LAMOUROUX	1824 (c) p. 247.
<i>Oceania flavidula</i>	RISSO	1826 p. 299.
<i>Oceania flavidula</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 97.
<i>Oceania phosphorica</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 97.
»	BLAINVILLE	1830 p. 257.
<i>Oceania flavidula</i>	BLAINVILLE	1830 p. 258.
»	BLAINVILLE	1834 p. 282.
<i>Oceania phosphorica</i>	BLAINVILLE	1834 p. 282. pl. 33, fig. 3.
<i>Oceania flavidula</i>	RATHKE	1835 p. 324.
<i>Dianæa phosphorica</i>	DUJARDIN	1840 p. 154.
<i>Dianæa flavidula</i>	DUJARDIN	1840 p. 155.
<i>Oceania phosphorica</i>	DUJARDIN	1840 p. 163.
<i>Oceania flavidula</i>	DUJARDIN	1840 p. 163.
<i>Thaumantias sarnica</i>	FORBES	1841 p. 85, pl. 1, fig. 6 a, b, c.
<i>Oceania phosphorica</i>	CHIAJE (delle)	1841-44 vol. 4, p. 92, 104, vol. 5, p. 131, pl. 147, fig. 1, 2, 3, 5, 6 et 16.
? <i>Medusa papillata</i>	STEENSTRUP	1842 p. 25 (de la trad. allem.)
<i>Oceania phosphorica</i>	LESSON	1843 p. 318.
<i>Oceania flavidula</i>	LESSON	1843 p. 319.
<i>Thaumantias sarnica</i>	LESSON	1843 p. 336.
»	THOMPSON	1844 p. 282.
<i>Geryonia planata</i>	WILL	1844 p. 73, pl. 2, fig. 13, 14.
<i>Oceania phosphorica</i>	VERANY	1846 p. 85.
? <i>Medusa (?) papillata</i>	LEUCKART	1847 (a) p. 138.
<i>Thaumantias globosa</i>	FORBES	1848 p. 46, pl. 10, fig. 4.
? <i>Thaumantias gibbosa</i>	FORBES	1848 p. 47, pl. 11, fig. 3.
<i>Thaumantias convexa</i>	FORBES	1848 p. 47, pl. 11, fig. 6.
<i>Thaumantias sarnica</i>	FORBES	1848 p. 48, pl. 11, fig. 4.
<i>Oceania phosphorica</i>	GRAY	1848 p. 33.
<i>Thaumantias sarnica</i>	GRAY	1848 p. 35.
<i>Thaumantias convexa</i>	COCKS	1850 p. 12.
<i>Geryonia planata</i>	LÜTKEN	1850 p. 19.

Polycanna granlandica Hæckel.

Voir : Matériaux I, p. 485.

<i>Æquorea granlandica</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 373.
»	LESSON	1843 p. 313.

Polycanna italica Hæckel.

Voir : Matériaux I, p. 486.

<i>Æquorea Risso</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 372.
<i>Æquorea Rissoana</i>	RISSO	1826 p. 294, pl. 7, fig. 37-38.
<i>Æquorea Rissoana</i>	CHIAJE (delle)	1828-30 pl. 73, fig. 1-2.
<i>Æquorea Risso</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 111.
»	BLAINVILLE	1830 p. 255.
»	BLAINVILLE	1834 p. 278.
»	DUJARDIN	1840 p. 139.
<i>Æquorea Rissoana</i>	CHIAJE (delle)	1841-44, vol. 4, p. 92, 102, vol. 5, p. 130, pl. 66, fig. 3, pl. 139, fig. 1-2.
<i>Æquorea Risso</i>	LESSON	1843 p. 311.
<i>Æquorea rissoana</i>	VERANY	1846 p. 85.

Polycanna vitrina Hæckel.

Voir : Matériaux I, p. 486.

<i>Æquorea allantophora</i>	LAMOUREUX	1824 (c) p. 372.
»	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 111.
<i>Æquorea allantophora</i>	BLAINVILLE	1830 p. 255.
»	BLAINVILLE	1834 p. 278.
<i>Æquorea allantophora</i>	BRANDT	1837 p. 188.
»	DUJARDIN	1840 p. 138.
»	LESSON	1843 p. 311.
»	GRAY	1848 p. 34.

Polyorchis campanulatus Hæckel.

<i>Medusa campanulata</i>	CHAMISSE et EYSENHARDT	1821 p. 359, pl. 30, fig. 1 a, b, c.
<i>Melicertum campanulatum</i>	ESCHSCHOLTZ	1829 p. 105.

<i>Melicerta campanulata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 284, pl. 35, fig. 4.
<i>Melicertum campanulatum</i>	DUJARDIN	1840	p. 160.
<i>Campanella chamissonis</i>	LESSON	1843	p. 281.

Polyorchis penicillata A. Agassiz.

<i>Melicertum penicillatum</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 106, pl. 8, fig. 4.
<i>Aglaura penicillata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 283, pl. 33, fig. 4.
<i>Melicertum penicillatum</i>	DUJARDIN	1840	p. 160.
" "	LESSON	1843	p. 293.

Proboscoidactyla flavicirrata Brandt.

<i>Proboscoidactyla flavicir-</i> <i>rhata</i>	BRANDT	1834	p. 28 (du tirage à part).
<i>Proboscoidactyla flavicir-</i> <i>rata</i>	BRANDT	1838	p. 390, pl. 19.
<i>Proboscoidactyla flavicir-</i> <i>rhata</i>	DUJARDIN	1840	p. 151.
" "	LESSON	1843	p. 292.

Protiara tetranema Hæckel.

Voir : Matériaux I, p. 486.

<i>Oceania tetranema</i>	BLAINVILLE	1830	p. 258.
" "	LESSON	1843	p. 320.

Pteronema ambiguum Hæckel.

<i>Microstoma ambigua</i>	LESSON	1830	p. 130, pl. 14, fig. 5, 5 g, h.
<i>Microstoma ambiguum</i>	LESSON	1836	p. 262 (Excl. syn.).
" "	LESSON	1843	p. 295.

Rathkia Blumenbachi Brandt.

<i>Oceania Blumenbachi</i>	RATHKE	1835	
<i>Rathkia Blumenbachiana</i>	BRANDT	1837	p. 487.

<i>Rathkia (Oceania) Blumenbachii</i>	BRANDT	1838	p. 353.
<i>Oceania Blumenbachii</i>	DUJARDIN	1840	p. 464.
<i>Rathkia Blumenbachii</i>	LÜTKEN	1850	p. 18, 25.

Rathkia fasciculata (Péron et Lesueur).

Syn. : *Rathkea fasciculata*.

Voir : Matériaux I. p. 486.

<i>Dianara fasciculata</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 249.
<i>Meliceria fasciculata</i>	RISSO	1826	p. 297.
»	BLAINVILLE	1830	p. 260.
»	BLAINVILLE	1834	p. 284.
»	LESSON	1843	p. 324.

Rathkia octopunctata (Sars).

<i>Cyrtis octopunctata</i>	SARS	1835	p. 28, pl. 6, fig. 14 a-g.
»	DUJARDIN	1840	p. 466.
»	FORBES	1841	p. 83.
<i>Hippocrene octopunctata</i>	FORBES	1841	p. 84.
<i>Bugainvillia octopunctata</i>	LESSON	1843	p. 292.
<i>Cyrtis octopunctata</i>	SARS	1846	p. 10, 16, pl. 4, fig. 7-13.
»	LÜTKEN	1850	p. 34.

Rhegmatores globosa L. Agassiz.

<i>Egurea globosa</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 110, pl. 10, fig. 2.
»	BLAINVILLE	1834	p. 279.
»	LESSON	1843	p. 309.

Rhegmatores thalassina Hæckel.

Voir : Matériaux I. p. 486.

<i>Egurea cyanea</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 371.
<i>Egurea viridula</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 371.
<i>Egurea cyanea</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 111.

<i>Æquorea thalassina</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 111.
<i>Æquorea cyanea</i>	BLAINVILLE	1830	p. 255.
<i>Æquorea thalassina</i>	BLAINVILLE	1830	p. 255.
<i>Æquorea cyanea</i>	BLAINVILLE	1834	p. 277. pl. 32, fig. 2, 2a.
<i>Æquorea thalassina</i>	BLAINVILLE	1834	p. 278.
<i>Æquorea cyanea</i>	DUJARDIN	1840	p. 136.
» »	LESSON	1843	p. 310.
<i>Æquorea thalassina</i>	LESSON	1843	p. 310.

Saphenia bitentaculata Eschscholtz.

<i>Dianœa bitentaculata</i>	QUOY et GAIMARD	1827	p. 184, pl. 6 A, fig. 9.
<i>Saphenia bitentaculata</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 93.
<i>Geryonia bitentaculata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 261.
» »	BLAINVILLE	1834	p. 287. pl. 37, fig. 2.
<i>Saphenia bitentaculata</i>	LESSON	1843	p. 326.

Saphenia dinema Eschscholtz.

Voir : Matériaux I, p. 486.

<i>Dianœa dinema</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 246.
<i>Saphenia dinema</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 93.
<i>Geryonia dinema</i>	BLAINVILLE	1830	p. 261.
<i>Geryonie dinème</i>	CUVIER	1830	p. 280.
<i>Campanella dinema</i>	BLAINVILLE	1834	p. 286.
<i>Geryonia dinema</i>	PÉRON et LESUEUR	1836-49	pl. 54, fig. 1.
<i>Dianœa dinema</i>	DUJARDIN	1840	p. 153.
<i>Saphenia dinema</i>	LESSON	1843	p. 325.
» »	GRAY	1848	p. 33.
» »	LÜTKEN	1850	p. 29.

Sarsia clavata Kieferstein.

? <i>Sthenyo</i>	DUJARDIN	1845 (a)	p. 1273.
? <i>Sthenyo</i>	DUJARDIN	1845 (b)	p. 257, pl. 14, fig. B. pl. 15, fig. B.

Sarsia mirabilis L. Agassiz.

<i>Sarsia mirabilis</i>	AGASSIZ, L	1850 (a)	p. 228, pl. 4, 5.
-------------------------	------------	----------	-------------------

Sarsia prolifera Forbes.

<i>Sarsia prolifera</i>	FORBES	1848	p. 59, pl. 7, fig. 3.
»	COCKS	1849	p. 91.
»	HUXLEY	1850	p. 66.
»	LÜTKEN	1850	p. 34.
»	STEENSTRUP	1850	p. 35.

Sarsia tubulosa Lesson.

<i>Oceania tubulosa</i>	SARS	1835	p. 25, pl. 5, fig. 11 a-g.
»	DUJARDIN	1840	p. 165.
»	THOMPSON	1840	p. 249.
<i>Sarsia tubulosa</i>	LESSON	1843	p. 333.
»	THOMPSON	1844	p. 281.
<i>Oceania tubulosa</i>	SARS	1846	p. 3.
? <i>Medusa proboscidea</i>	DALYELL	1847-48,	vol. 2, p. 248, pl. 53, fig. 1-2 et pl. 52, fig. 3.
<i>Sarsia tubulosa</i>	FORBES	1848	p. 55, pl. 6, fig. 2.
»	COCKS	1850	p. 12.
»	LÜTKEN	1850	p. 34.

Staurobrachium stauroglyphum Hæckel.

Voir : Matériaux 1, p. 486.

<i>Equorea stauroglypha</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 371.
»	BLAINVILLE	1830	p. 255.
»	BLAINVILLE	1834	p. 278.
»	DUJARDIN	1840	p. 137.
»	LESSON	1843	p. 310.
»	GRAY	1848	p. 34.

Staurophora Mertensi Brandt.

<i>Staurophora Mertensi</i>	BRANDT	1834	p. 30 (du tirage à part).
»	BRANDT	1838	p. 400, pl. 24, 25.
»	DUJARDIN	1840	p. 133.
»	LESSON	1843	p. 297.

Staurostoma laciniata Hæckel.

Staurophora laciniata AGASSIZ, L. 1850 (a) p. 308, pl. 7.

Steenstrupia galanthus Hæckel.

Steenstrupia rubra FORBES 1848 p. 73, pl. 13, fig. 1.
Steenstrupia flavola FORBES 1848 p. 74, pl. 13, fig. 2.
Steenstrupia rubra COCKS 1850 p. 12.

Stomobrachium lenticulare Brandt.

Stomobrachiota lenticularis BRANDT 1834 p. 20 (du tirage à part).
Stomobrachium lenticulare BRANDT 1838 p. 358, pl. 3, fig. 6, 7.
 » » DULJARDIN 1840 p. 143.
Stomobrachiota lenticularis LESSON 1843 p. 315.

Tetranema aeronauticum Hæckel.

Thaumantias aeronautica FORBES 1848 p. 44, pl. 9, fig. 3.

Thamnitis nigrیتella Hæckel.

Bougainvillea nigrیتella FORBES 1848 p. 63, pl. 12, fig. 2.
Bougainvillia nigrیتella AGASSIZ, L. 1850 (a) p. 273.

Thaumantias hemisphærica Eschscholtz.

Voir : Matériaux I, p. 486.

Medusa hemisphærica BOSC 1802 vol. 2, p. 139.
 » » BENNET EN OLIVIER 1826 p. 99.
Geryonia hemisphærica FLEMING 1828 p. 500.
Thaumantias hemisphærica ESCHSCHOLTZ 1829 p. 103.
Oceania danica BLAINVILLE 1830 p. 258.
Oceania hemisphærica BLAINVILLE 1830 p. 258.
Geryonia hemisphærica BLAINVILLE 1830 p. 261.
Medusa hemisphærica CUVIER 1830 p. 277.
Dianœa hemisphærica JOHNSTON 1833 p. 321.

<i>Thaumantias hemispherica</i>	BLAINVILLE	1834	p. 285.
<i>Oceania (Thaumantias) hemispherica</i>	EHRENBERG	1836 (a)	p. 545.
<i>Thaumantias hemispherica</i>	DUJARDIN	1840	p. 161.
<i>Medusa (Geryonia) hemispherica</i>	THOMPSON	1840	p. 248.
<i>Thaumantias pileata</i>	FORBES	1841	p. 84, pl. 1, fig. 3 a et b.
<i>Thaumantias punctata</i>	FORBES	1841	p. 85, pl. 1, fig. 5 a et b.
<i>Thaumantias hemispherica</i>	FORBES	1841	p. 85.
<i>Medusa hemispherica</i>	CHIAJE (delle)	1841-44	pl. 181, fig. 7-11.
<i>Oceania danica</i>	LESSON	1843	p. 321.
<i>Thaumantias hemispherica</i>	LESSON	1843	p. 335.
<i>Thaumantias lucida</i>	LESSON	1843	p. 335.
<i>Thaumantias pileata</i>	LESSON	1843	p. 336.
<i>Thaumantias punctata</i>	LESSON	1843	p. 336.
<i>Thaumantias hemispherica</i>	THOMPSON	1844	p. 281.
<i>Thaumantias pileata</i>	THOMPSON	1844	p. 281.
<i>Thaumantias punctata</i>	THOMPSON	1844	p. 282.
<i>Thaumantias pileata</i>	FORBES	1848	p. 47, pl. 11, fig. 2.
<i>Thaumantias lineata</i>	FORBES	1848	p. 48, pl. 11, fig. 1.
<i>Thaumantias hemispherica</i>	FORBES	1848	p. 49, pl. 8, fig. 2.
? <i>Thaumantias inconspicua</i>	FORBES	1848	p. 52, pl. 8, fig. 3.
<i>Thaumantias punctata</i>	FORBES	1848	p. 53, pl. 10, fig. 1.
<i>Thaumantias hemispherica</i>	GRAY	1848	p. 34.
<i>Thaumantias pileata</i>	GRAY	1848	p. 35.
<i>Thaumantias punctata</i>	GRAY	1848	p. 35.
<i>Thaumantias hemisphaerica</i>	COCKS	1849	p. 91.
<i>Thaumantias pileata</i>	COCKS	1850	p. 12.

Tiara octona L. Agassiz.

Voir : Matériaux I, p. 487.

<i>Oceania (Geryonia) octona</i>	FORBES	1846	p. 286.
<i>Oceania octona</i>	FORBES	1848	p. 27, pl. 2, fig. 3.

<i>Oceania turrata</i>	FORBES	1848	p. 28, pl. 2, fig. 2.
<i>Oceania octona</i>	GRAY	1848	p. 33.
<i>Oceania turrata</i>	COCKS	1849	p. 90.

Tiara papua Hæckel.

<i>Æquorea mitra</i>	LESSON	1830	p. 127, pl. 14, fig. 4 g. n.
<i>Garybdea mitra</i>	BRANDT	1837	p. 187.
<i>Æquorea mitra</i>	DUJARDIN	1840	p. 140.
<i>Turris papua</i>	LESSON	1843	p. 283.

Tiara pileata L. Agassiz.

Voir : Matériaux I, p. 487.

<i>Medusa pileata</i>	BOSC	1802	vol. 2, p. 143.
<i>Dianæa pileata</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 247.
<i>Dianæa Lesueur</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 247.
<i>Oceania Lesueuria</i>	RISSO	1826	p. 298.
<i>Oceania pileata</i>	RISSO	1826	p. 299.
<i>Dianæa pileata</i>	CHIAJE (delle)	1828-30	pl. 73, fig. 3-5.
<i>Oceania pileata</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 98.
<i>Oceania Le Sueur</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 98.
<i>Oceania Lesueurii</i>	BLAINVILLE	1830	p. 258.
<i>Oceania pileus</i>	BLAINVILLE	1830	p. 258.
<i>Medusa pileata</i>	CUVIER	1830	p. 278.
<i>Oceania Lesueurii</i>	BLAINVILLE	1834	p. 282.
<i>Oceania pileata</i>	BLAINVILLE	1834	p. 282.
<i>Oceania ampullacea</i>	SARS	1835	p. 22, pl. 4, fig. 8 a-f.
<i>Oceania pileata</i>	EHRENBERG	1836 (a)	p. 538.
»	EHRENBERG	1837	p. 190 et 255, pl. 8, fig. 2-4.
<i>Dianæa Lesueur</i>	DUJARDIN	1840	p. 155.
<i>Dianæa pileata</i>	DUJARDIN	1840	p. 155.
<i>Oceania pileata</i>	DUJARDIN	1840	p. 163, 167.
<i>Oceania Lesueur</i>	DUJARDIN	1840	p. 163.
<i>Oceania ampullacea</i>	DUJARDIN	1840	p. 164.
<i>Tiara papalis</i>	LESSON	1843	p. 287.

<i>Tiara sarsii</i>	LESSON	1843	p. 287.
<i>Oceania Lesueur</i>	LESSON	1843	p. 319.
<i>Dianea pileata</i>	VERANY	1846	p. 84.
<i>Oceania episcopalis</i>	FORBES	1848	p. 27, pl. 2, fig. 1.
»	COCKS	1850	p. 12.

Tiara rotunda Hæckel.

<i>Dianea rotunda</i>	QUOY et GAIMARD	1827	p. 181, pl. 6 A, fig. 1-2.
<i>Oceania rotunda</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 100.
<i>Aglaura rotunda</i>	BLAINVILLE	1840	p. 259.
<i>Oceania rotunda</i>	BLAINVILLE	1834	p. 283.
<i>Oceania rotunda</i>	DUJARDIN	1840	p. 164.
<i>Pandea rotunda</i>	LESSON	1843	p. 289.

Tiaropsis diademata L. Agassiz.

<i>Tiaropsis diademata</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	p. 298, pl. 6.
----------------------------	-------------	----------	----------------

Tiaropsis multicirrata L. Agassiz.

<i>Thaumantias multicirrata</i>	SARS	1835	p. 26, pl. 5, fig. 12 a-c.
»	DUJARDIN	1840	p. 162.
»	FORBES	1841	p. 85.
»	LESSON	1843	p. 336.
»	SARS	1846	p. 12, 16.
<i>Thaumantias melanops</i>	FORBES	1848	p. 45.
<i>Thaumantias multicirrata</i>	LÜTKEN	1850	p. 34.

Tima Bairdi Forbes.

<i>Dianea Bairdi</i>	JOHNSTON	1833	p. 320, fig. 41.
»	THOMPSON	1844	p. 282.
<i>Tima Bairdi</i>	FORBES	1846	p. 286.
<i>Medusa (Tima) Eschscholtz)</i>	DALYELL	1847-48	vol. 2, p. 250, pl. 52, fig. 5.
<i>Tima Bairdi</i>	FORBES	1848	p. 37, pl. 5, fig. 1.
»	GRAY	1848	p. 36.

Tima flavilabris Eschscholtz.

<i>Tima flavilabris</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 103, pl. 8, fig. 3.
" "	BLAINVILLE	1834	p. 286, pl. 38, fig. 4.
" "	DUJARDIN	1840	p. 204.
" "	LESSON	1843	p. 334.

Turris digitalis Forbes.

<i>Turris digitale</i>	FORBES	1846	p. 286.
<i>Turris digitalis</i>	FORBES	1848	p. 21, pl. 3, fig. 1.

Turris neglecta Lesson.

Voir : Matériaux I, p. 488.

<i>Oceania sanguinolenta</i>	BLAINVILLE	1830	p. 258.
<i>Cyanea coccinea</i>	DAVIS	1841	p. 235, pl. 2, fig. 1-3.
<i>Turris neglecta</i>	LESSON	1843	p. 284.
<i>Oceania sanguinolenta</i>	LESSON	1843	p. 321.
<i>Cyanea coccinea</i>	THOMPSON	1844	p. 282.
<i>Turris neglecta</i>	FORBES	1846	p. 286.
" "	FORBES	1848	p. 23, pl. 3, fig. 2.
<i>Oceania globulosa</i>	FORBES	1848	p. 29, pl. 3, fig. 3.
<i>Turris coccinea</i>	GRAY	1848	p. 33.
<i>Turris neglecta</i>	COCKS	1849	p. 90.

Turritopsis pleurostoma Hæckel.

Voir : Matériaux I, p. 488.

<i>Dianaea pleurostoma</i>	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 249.
<i>Melicerta pleurostoma</i>	BLAINVILLE	1830	p. 260.
" "	BLAINVILLE	1834	p. 284.
<i>Melicerta pleurostoma</i>	LESSON	1843	p. 324.

Willsia stellata Forbes.

<i>Willsia stellata</i>	FORBES	1846	p. 286.
-------------------------	--------	------	---------

<i>Willsia stellata</i>	FORBES	1848	p. 49, pl. 1, fig. 1.
„ „	GRAY	1848	p. 32.
„ „	COCKS	1849	p. 90.

Zygocanna pleuronota Hæckel.

Voir : Matériaux I, p. 488.

<i>Equorea pleuronota</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 371.
„ „	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 119.
„ „	BLAINVILLE	1830	p. 255.
„ „	BLAINVILLE	1834	p. 278.
„ „	DUJARDIN	1840	p. 138.
<i>Polyrenia pleuronota</i>	LESSON	1843	p. 314.

Zygocanna purpurea Hæckel.

Voir : Matériaux I, p. 488.

<i>Equorea purpurea</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 371.
„ „	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 119.
„ „	BLAINVILLE	1830	p. 255.
„ „	BLAINVILLE	1834	p. 278.
„ „	PÉRON et LESUEUR	1836-49, pl. 43, fig. 3.	
„ „	DUJARDIN	1840	p. 137.
<i>Polyrenia purpurea</i>	LESSON	1843	p. 314.

Zygocannula undulosa Hæckel.

Voir : Matériaux I, p. 488.

<i>Equorea undulosa</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 372.
„ „	ESCHSCHOLTZ	1829	p. 111.
„ „	BLAINVILLE	1830	p. 255.
„ „	BLAINVILLE	1834	p. 278.
„ „	DUJARDIN	1840	p. 138.
<i>Polyrenia undulosa</i>	LESSON	1843	p. 314.

III

INDEX ¹

HYDROÏDES

Gen. <i>Acrochordium</i>	MEYEN	1834	Supp.
<i>A. album</i>	MEYEN	1834	= <i>Coryne</i> sp. ?
Gen. <i>Aglaophenia</i>	LAMOUREUX	1812	
<i>A. acinaria</i>	DUCHASSAING	1850	Ind.
<i>A. arquata</i>	KRAUSS	1837	= <i>Aglaophenia arquata</i> .
<i>A. atlantica</i>	DUCHASSAING	1837	Ind.
<i>A. catharina</i>	GRAY	1848	= <i>Plumularia catharina</i> .
<i>A. dichotoma</i>	KIRCHENPAUER	1872	
<i>A. echinulata</i>	GRAY	1848	= <i>Plumularia echinulata</i> .
<i>A. elongata</i>	MENEGHINI	1845	
<i>A. fascis</i>	GRAY	1848	Ind. an <i>Nemertesia</i> ?
<i>A. Gaimardi</i>	LAMOUREUX	1824 (b)	= <i>Plumularia gaimardi</i> .
<i>A. patagonica</i>	(ORBIGNY (d'))	1839-46	
<i>A. plumae</i>	NARDO	1847 (a)	= <i>Aglaophenia pluma</i> .
<i>A. simplex</i>	(ORBIGNY (d'))	1839-46	
<i>A. tetrasticha</i>	MENEGHINI	1845	= ? <i>Nemertesia ramosa</i> .
Gen. <i>Aglatophenia</i>	COSTA	1839	= <i>Aglaophenia</i> .
<i>A. myrhiophyllum</i>	COSTA	1839	= <i>Aglaophenia myrhiophyllum</i> .
<i>A. pinnaria</i>	COSTA	1839	= ? <i>Pennaria disticha</i> .
<i>A. secundaria</i>	COSTA	1839	= <i>Plumularia secundaria</i> .

¹ Le mot « Supp. » ne signifie pas que le genre ait été supprimé de la nomenclature zoologique, mais seulement de la nomenclature des Hydroïdes.

Gen. Aleyonidium	LAMOUREUX	1843	Supp.
A. echinatum	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Hydractinia echi-</i> <i>nata</i> .
Gen. Aleyonium	LINNÉ	1758	Supp.
A. echinatum	FLEMING	1828	= <i>Hydractinia echi-</i> <i>nata</i> .
Gen. Anguinaria Link sec.	BLAINVILLE	1830	Supp.
Gen. Anisocalyx	DONATI	1750	Supp.
A. (Aglaophenia) amathioides	COSTA	1838	Ind. an <i>Hydrallmania</i> ?
A. (Aglaophenia) an- gulosa	COSTA	1838	Ind.
A. (Aglaophenia) ar- cuata	COSTA	1838	= <i>Aglaophenia ar-</i> <i>cuata</i> .
A. (Aglaophenia) crucialis	COSTA	1838	= <i>Aglaophenia crucia-</i> <i>lis</i> .
A. (Aglaophenia) cu- pressina	COSTA	1838	= <i>Aglaophenia cupres-</i> <i>sina</i> .
A. (Aglaophenia) ele- gans	COSTA	1838	Ind.
A. (Aglaophenia) fal- cata	COSTA	1838	= <i>Hydrallmania fal-</i> <i>cata</i> .
A. (Aglaophenia) flexuosa	COSTA	1838	= <i>Aglaophenia fle-</i> <i>xuosa</i> .
A. (Aglaophenia) frutescens	COSTA	1838	= <i>Plumularia frutes-</i> <i>cens</i> .
A. (Aglaophenia) glutinosa	COSTA	1838	Ind.
A. (Aglaophenia) gracilis	COSTA	1838	Ind.
A. hyalinus	COSTA	1838	= ? <i>Plumularia Hel-</i> <i>leri</i> .
A. (Aglaophenia) hypnoïdes	COSTA	1838	Ind.

A. myriophyllum	COSTA	1838	= <i>Aglaophenia myriophyllum</i> .
A. (Aglaophenia) pelagica	COSTA	1838	= <i>Aglaophenia pelagica</i> .
A. (Aglaophenia) pennatula	COSTA	1838	= <i>Aglaophenia pennatula</i> .
A. pinnarium	COSTA	1838	= <i>Pennaria disticha</i> .
A. pinnatum	COSTA	1838	= p. p. <i>Plumularia pinnata</i> et p. p. <i>Plumularia setacea</i> .
A. pluma	COSTA	1838	= <i>Aglaophenia pluma</i> .
A. secundarius	COSTA	1838	= <i>Plumularia secundaria</i> .
A. (Aglaophenia) speciosa	COSTA	1838	= <i>Aglaophenia speciosa</i> .
Gen. Antennularia	LAMARCK	1816	= <i>Nemertesia</i> .
A. antennina	FLEMING	1828	= <i>Nemertesia antennina</i> .
A. antennina var. A. indivisa	JOHNSTON	1834	= <i>Nemertesia antennina</i> .
A. antennina var. A. ramosa	JOHNSTON	1834	= <i>Nemertesia ramosa</i> .
A. antennina var. 2	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Nemertesia ramosa</i> .
A. arborescens	HASSAL	1843	= <i>Nemertesia ramosa</i> .
A. cyathifera	DANA	1846-49	Ind. an <i>Plumularia</i> ?
A. Janini	BLAINVILLE	1830	= <i>Nemertesia Janini</i> .
Gen. Arum	VIGURS	1849	Supp.
A. Cocksii	VIGURS	1849	= <i>Myriothele phrygia</i> .
Gen. Anulopora Goldf. sec.	BLAINVILLE	1830	Supp.
Gen. Biseriaria	BLAINVILLE	1830	Supp.
B. articulata	BLAINVILLE	1830	= <i>Thuiaria articulata</i> .
B. thuja	BLAINVILLE	1830	= <i>Thuiaria thuja</i> .
Gen. Bougainvillia	LESSON	1836	
B. ramosa	ALLMAN	1864	
Gen. Campanularia	LAMARCK	1816	
C. ?	LESTER	1834	= <i>Plumularia obliqua</i> .

<i>C. brasiliensis</i>	MEYEN	1834	
<i>C. caulini</i>	CHAJE (delle)	1844-44	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>C. Cavolinii</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>C. clausa</i>	LOVÉN	1835	= <i>Lorenella clausa</i> .
<i>C. dichotoma</i>	sec. LISTER	1834	= <i>Gonothyrea Loreni</i> .
<i>C. dumosa</i>	FLEMING	1828	= <i>Lafoea dumosa</i> .
<i>C. Flemingii</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Obelia gelatinosa</i> .
<i>C. gelatinosa</i>	sec. BENEDEN (van)	1844 (a)	= <i>Obelia longissima</i> .
<i>C. geniculata</i>	sec. LOVÉN	1835	= <i>Gonothyrea Loreni</i> .
<i>C. integra</i>	MAGILLIVRAY	1842	
<i>C. intertexta</i>	COUCH	1844	= <i>Coppinia arcta</i> .
<i>C. lacerata</i>	JOHNSTON	1847	= <i>Opercularella lacerata</i> .
<i>C. levigata</i>	QUOY et GAIMARD	1827	Ind.
<i>C. laevis</i>	COUCH	1844	= ? <i>Campanularia integra</i> .
<i>C. macrocythara</i>	BLAINVILLE	1830	Gen. <i>Clytia</i> .
<i>C. macrocythra</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Campanularia macrocythara</i> .
<i>C. maior</i>	MEYEN	1834	
<i>C. muricata</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Halecium muricatum</i> .
<i>C. ovifera</i>	BLAINVILLE	1830	Non Hyd.
<i>C. prolifera</i>	MEYEN	1834	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>C. racemosa</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Eudendrium racemosum</i> .
<i>C. rugosa</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Sertularella rugosa</i> .
<i>C. serpens</i>	HASSAL	1848 (a)	= <i>Filellum serpens</i> .
<i>C. undulata</i>	EDWARDS, M.	1836	
<i>C. verticillata</i>	COUCH	1841	= <i>Campanularia verticillata</i> .
<i>C. volubilis</i>	sec. JOHNSTON	1832 (a)	= <i>Clytia Johnstoni</i> .
Gen. <i>Campanulina</i>	BENEDEN (van)	1847	
<i>C. tenuis</i>	BENEDEN (van)	1847	
Gen. <i>Candelabrum</i>	BLAINVILLE	1830	Supp.
Gen. <i>Capsularia</i>	CUVIER	1798	Supp.
<i>C. dumosa</i>	GRAY	1848	= <i>Lafoea dumosa</i> .
<i>C. integra</i>	GRAY	1848	= <i>Campanularia integra</i> .

<i>C. lacerata</i>	GRAY	1848	= <i>Opercularella lacerata</i> .
<i>C. levis</i>	GRAY	1848	= ? <i>Campanularia integra</i> .
<i>C. serpens</i>	GRAY	1848	= <i>Filellum serpens</i> .
<i>C. syringa</i>	GRAY	1848	= <i>Calycella syringa</i> .
<i>C. verticillata</i>	GRAY	1848	= <i>Campanularia verticillata</i> .
<i>C. volubilis</i>	GRAY	1848	= <i>Clytia Johnstoni</i> p.p.
Gen. <i>Cellaria</i>	sec. LAMARCK	1816	Supp.
<i>C. pectinata</i>	LAMARCK	1816	= <i>Idia pristis</i> .
Gen. <i>Cladonema</i>	DE JARDIN	1843	
<i>C. radiatum</i>	DE JARDIN	1843	
Gen. <i>Clara</i>	Gmelin	1788-93	
<i>C. capitata</i>	THOMPSON	1844	= <i>Hydractinia echinata</i> .
<i>C. fritillaria</i>	LÜTKEN	1850	= <i>Diplura fritillaria</i> .
<i>C. minuticornis</i>	THOMPSON	1844	Ind.
Gen. <i>Clytia</i>	LAMOUROUX	1812	
<i>C. macrocythara</i>	LAMOUROUX	1824 (b)	Gen. <i>Campanularia</i> .
<i>C. ovifera</i> Lmx sec.	BLAINVILLE	1830	Non Hydr.
<i>C. Ryckholtii</i>	WESTENDORP	1843	Ind.
<i>C. undulata</i>	LAMOUROUX	1824 (b)	Gen. <i>Campanularia</i> .
<i>C. volubilis</i>	(ELLIS et So- LANDER)	1786	= <i>Clytia Johnstoni</i> .
Gen. <i>Cochella</i>	GRAY	1848	= <i>Coppinia</i> .
<i>C. intertexta</i>	GRAY	1848	= <i>Coppinia arcta</i> .
Gen. <i>Coppinia</i>	HASSAL	1848 (a)	
<i>C. arcta</i>	(DALYELL)	1847-48	
<i>C. mirabilis</i>	HASSAL	1848 (a)	= <i>Coppinia arcta</i> .
Gen. <i>Cordylophora</i>	ALLMAN	1844 (a)	
<i>C. lacustris</i>	ALLMAN	1844 (b)	
Gen. <i>Corina</i>	SARS	1829	pour <i>Coryne</i>
<i>C. squamata</i>	SARS	1829	= <i>Clara squamata</i> .
Gen. <i>Cornularia</i>	LAMOUROUX	1824	Supp.
<i>C. rugosa</i>	GRAY	1838	= <i>Lafæa dumosa</i> .
Gen. <i>Corymorpha</i>	SARS	1835	
<i>C. ?</i>	REID	1847	Ind.
[<i>C. nana</i>]	ALDER	1857]	

<i>C. nutans</i>	SARS	1835	
Gen. <i>Coryna</i>	BOSC	1802	= <i>Coryne</i> .
<i>C. aculeata</i>	EHRENBERG	1834	= <i>Podocoryne aculeata</i> .
<i>C. capillifera</i>	PICKERING	18 6-49	Ind.
<i>C. fritillaria</i>	RATHKE	1844	= <i>Diplura fritillaria</i> .
<i>C. glandulosa</i>	FLEMING	1822	= <i>Coryne pusilla</i> .
<i>C. multicornis</i>	EHRENBERG	1834	= <i>Clava squamata</i> .
<i>C. multicornis</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	= <i>Clava multicornis</i> .
<i>C. parasites</i>	QUATREFAGES	1836-49	= <i>Hydractinia echinata</i> .
<i>C. pistillaris</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	= <i>Clava squamata</i> .
<i>C. prolifica</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	= <i>Coryne pusilla</i> .
<i>C. ramosa</i>	BLAINVILLE	1830	Ind.
<i>C. setifera</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	Ind.
Gen. <i>Coryne</i>	GAERTNER	1774	
<i>C. sp. ?</i>	LISTER	1834	= <i>Coryne muscoides</i> .
<i>C. aculeata</i>	LOYÉN	1835	= <i>Podocoryne aculeata</i> .
<i>C. Chamissonis</i>	JOHNSTON	1847	Ind.
<i>C. echinata</i>	STEENSTRUP	1842	= ? <i>Podocoryne aculeata</i> .
<i>C. fritillaria</i>	STEENSTRUP	1842	= <i>Diplura fritillaria</i> .
<i>C. Hassalli</i>	FORBES	1843	= <i>Hydractinia echinata</i> .
<i>C. Listerii</i>	JOHNSTON	1847	= <i>Coryne pusilla</i> .
<i>C. Loveni</i>	LÜTKEN	1850	= ? <i>Coryne pusilla</i> .
<i>C. pusilla</i> var. a	GRAY	1848	= <i>Coryne</i> van Benedeni p. p.
<i>C. pusilla</i> var. b	GRAY	1848	= <i>Coryne pusilla</i> p. p.
<i>C. pusilla</i> var. c	GRAY	1848	= <i>Coryne muscoides</i> .
<i>C. pusilla</i> var. d	GRAY	1848	Ind.
<i>C. pusilla</i> var.	JOHNSTON	1847	= <i>Coryne</i> van Benedeni.
<i>C. pusilla</i> var. muscoides	JOHNSTON	1847	= <i>Coryne muscoides</i> .
<i>C. ramosa</i>	CHAMISSE et EYSENHARDT	1821	Ind.
<i>C. ramosa</i>	COCKS	1849	= ? <i>Coryne pusilla</i> .
<i>C. ramosa</i>	JOHNSTON	1847	= <i>Coryne muscoides</i> pp.
<i>C. Sarsii</i>	JOHNSTON	1847	= <i>Syncoryne Sarsii</i> .

<i>C. squamata</i> var.	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Hydractinia echinata</i> .
[<i>C. rau Benedeni</i>	HICKES	1868]	
<i>C. vulgaris</i>	WAGNER	1844	= ? <i>Podocoryne aculeata</i> .
Gen. <i>Cymodoce</i>	GRAY	1848	Supp. voir : <i>Cymodocea</i> .
Gen. <i>Cymodocea</i>	LAMOUREUX	1816	Supp.
<i>C. caespitosa</i>	COSTA	1838	Ind.
<i>C. ramosa</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	= ? <i>Nemertesia ramosa</i> .
Gen. <i>Danaea</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	Supp.
<i>D. Edwardsiana</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	= <i>Halecium Edwardsianum</i> .
[Gen. <i>Diphasia</i>	L. AGASSIZ	1862]	voir : <i>Sertularia</i> et <i>Dynamena</i> .
[Gen. <i>Diplura</i>	ALLMAN	1864]	
<i>D. fritillaria</i>	ALLMAN	1864	
Gen. <i>Dynamena</i>	LAMOUREUX	1812	
<i>D. abietina</i>	FLEMING	1828	= <i>Sertularia abietina</i> .
<i>D. argentea</i>	FLEMING	1828	= <i>Thuiaria argentea</i> .
<i>D. bicuspidata</i>	NARDO	1847 (a)	Ind.
<i>D. brevicella</i>	LAMOUREUX	1824 (b)	Ind.
<i>D. crisioides</i>	LAMOUREUX	1824 (b)	= <i>Thuiaria crisioides</i> .
<i>D. cupressina</i>	FLEMING	1828	= <i>Thuiaria cupressina</i> .
<i>D. Evansii</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Dynamena Evansii</i> .
<i>D. filicula</i>	FLEMING	1828	= <i>Sertularia filicula</i> .
<i>D. fuscescens</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Sertularia (Diphasia) pinnata</i> .
<i>D. misenensis</i>	COSTA	1839	Ind. = <i>Sertularia misenensis</i> .
<i>D. nigra</i>	FLEMING	1828	= <i>Sertularia fusca</i> .
<i>D. ostrearum</i>	DUCHASSAING	1850	Ind.
<i>D. pinnata</i>	FLEMING	1828	= <i>Sertularia fallax</i> .
<i>D. polyzonias</i>	COSTA	1839	= <i>Sertularella polyzonias</i> .
<i>D. pulchella</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	
<i>D. racemosa</i>	COSTA	1839	= <i>Endendrium racemosum</i> .
<i>D. reptans</i>	COSTA	1838	= ? <i>Sertularia gracilis</i> .
<i>D. rigida</i>	BLAINVILLE	1830	Ind.

D. setta.	BLAINVILLE	1830	= <i>Sertularia setta</i> .
D. tamarisca	FLEMING	1828	= <i>Sertularia tamarisca</i> .
Gen. Dynamene	GRAY	1843	= <i>Dynamena</i> .
D. alietinoides	GRAY	1843	= <i>Sertularia elongata</i> .
D. bispinosa	GRAY	1843	= <i>Sertularia bispinosa</i> .
Gen. Dymorphosa	PHILIPPI	1842	= ? <i>Podocoryne</i> .
D. conchicola	PHILIPPI	1842	= ? <i>Podocoryne carnea</i> .
Gen. Echinocorium	HASSAL	1844 (b)	= <i>Hydractinia</i> .
E. clavigerum	HASSAL	1844 (b)	= <i>Hydractinia echinata</i> .
Gen. Electra Lamx. sec.	SCHWEIGGER	1819	Supp.
Gen. Ellisia	FORBES et GOOD- SIR	1840	= <i>Corymorpha</i> .
E. flommaris	FORBES et GOOD- SIR	1840	= <i>Corymorpha natans</i> .
Gen. Ellisia	WESTENDORP	1843	= p. p. <i>Sertularella</i> .
E. rugosa	WESTENDORP	1843	= <i>Sertularella rugosa</i> .
Gen. Epistomia	GRAY	1848	Supp.
Gen. <i>Eudendrium</i>	EHRENBERG	1834	
E. bryoides	EHRENBERG	1834	= <i>Tubularia larynx</i> .
E. muscoides	NARDO	1847 (a)	Ind.
E. ramosum sec.	BENEDEN (van)	1844 (b)	= <i>Bougainvillia ramosa</i> .
E. splendidum	EHRENBERG	1834	= ? <i>Tubularia larynx</i> .
E. trichoides	NARDO	1847 (a)	Ind.
[Gen. <i>Filellum</i>	HINCKS	1868]	
<i>F. serpens</i>	(HASSAL)	1848 (a)	
Gen. Fistulana	FABRICIUS	1780	Supp.
F. ramosa Mull. sec.	FABRICIUS	1780	Non Hydr.
F. ramosa	FABRICIUS	1824	= <i>Eudendrium ramosum</i> .
Gen. Halecina	THOMPSON	1848	= <i>Halecium</i> .
H. Ellisii	THOMPSON	1848	= <i>Halecium halecinum</i> .
Gen. <i>Halecium</i>	OKEN	1815	
<i>H. Beani</i>	JOHNSTON	1847	
<i>H. Edwardsianum</i>	(ORBIGNY (d'))	1839-46	
<i>H. Lamourouxianum</i>	(ORBIGNY (d'))	1839-46	
<i>H. patagonicum</i>	(ORBIGNY (d'))	1839-46	

<i>H. rameum</i>	GRAY	1818	= <i>Eudendrium rameum</i> .
<i>H. tachelcham</i>	(ORBIGNY (d'))	1839-46	
Gen. <i>Hernia</i>	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Coryne</i> .
<i>H. glandulosa</i>	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Coryne pusilla</i> .
<i>H. glandulosa</i> sec. HASSAL		1844	= ? <i>Coryne muscoides</i> .
Gen. <i>Hydra</i>	LINNÉ	1746	
<i>H. aculeata</i> WAGNER			
sec. SARS		1846	pour : <i>Hydra ovipara</i> s. <i>aculeata</i> .
<i>H. brunnea</i>	TEMPLETON	1836	= <i>Hydra vulgaris</i> .
<i>H. coccinea</i> MULL. sec. BENEDEN		1844 (a) p. 60	pour : <i>Hydra squamata</i> .
<i>H. coronata</i>	FLEMING	1828	Ind.
<i>H. corynaria</i>	TEMPLETON	1836	Ind.
<i>H. fusca</i> var. <i>galian-</i> <i>cona</i>	CORDA	1836	= <i>Hydra oligactis</i> .
<i>H. fusca</i> var. ?	HANCOCK	1850	= <i>Hydra vulgaris</i> .
<i>H. grisea vulgaris</i>	BLAINVILLE	1842	= <i>Hydra vulgaris</i> .
<i>H. littoralis</i>	JOHNSTON	1838 (a)	Ind.
<i>H. oviparas. aculeata</i> WAGNER		1833	= <i>Podocoryne aculeata</i> .
<i>H. (Coryna) squamata</i> DALYELL		1847-48	= ? <i>Hydractinia echinata</i> .
<i>H. tuba</i>	DALYELL	1834	Non Hydr.
<i>H. verrucosa</i>	TEMPLETON	1836	= <i>Hydra oligactis</i> .
<i>H. verticillata</i>	CHIAJE (delle)	1828-30	Non Hydr.
<i>H. vulgaris</i> var. <i>b.</i> <i>grisea</i>	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Hydra attenuata</i> .
Gen. <i>Hydractinia</i>	BENEDEN (van)	1841	
<i>H. ?</i>	ALDER	1847	= <i>Corymorpha nana</i> .
<i>H. ?</i>	BENEDEN (van)	1841	= <i>Hydractinia echinata</i> .
<i>H. ? (Alder)</i>	GRAY	1848	= <i>Corymorpha nana</i> .
<i>H. echinata</i>	BENEDEN (van)	1845	
<i>H. grisea</i>	FREY et LEU- KART	1847	= <i>Hydractinia echinata</i> .
<i>H. lactea</i>	BENEDEN (van)	1844	= <i>Hydractinia echinata</i> .

H. minuticornis	GRAY	1848	Ind.
H. neapolitana	CHIAJE (delle)	1844-44	= ? <i>Hydractinia echinata</i> .
H. rosea	BENEDEN (van)	1844	= <i>Hydractinia echinata</i> .
[Gen. <i>Hydrallmania</i>	HINCKS	1868]	
[<i>H. falcata</i>	HINCKS	1868]	
Gen. <i>Lafœa</i>	LAMOUREUX	1821	
<i>L. cornuta</i>	LAMOUREUX	1821	= ? <i>Lafœa dumosa</i> .
<i>L. dumosa</i>	(FLEMING)	1820	
Gen. <i>Laomedea</i>	LAMOUREUX	1812	
<i>L. articulata</i>	LAMOUREUX	1824 (b)	= <i>Lytoscyphus articulatus</i> .
<i>L. dichotoma</i> var. β	JOHNSTON	1847	= <i>Obelia longissima</i> .
<i>L. dichotoma</i> Lamx.			
sec. MENEGHINI		1845	= <i>Plumularia</i> sp. ?
<i>L. dumosa</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Lafœa dumosa</i> .
<i>L. elegans</i>	RISSE	1826	Ind.
<i>L. Flemingii</i>	GRAY	1848	= <i>Obelia gelatinosa</i> .
<i>L. gelatinosa</i> var. α .	JOHNSTON	1847	= <i>Campanularia flexuosa</i> .
<i>L. gelatinosa</i> var. β	JOHNSTON	1847	= <i>Obelia gelatinosa</i> .
<i>L. gracilis</i>	PICKERING	1846-49	Douteuse.
<i>L. obliqua</i>	THOMPSON	1844	= <i>Plumularia obliqua</i> .
<i>L. olivacea</i>	BLAINVILLE	1830	Gen. <i>Campanularia</i> .
<i>L. simplex</i>	DANA	1846-49	Ind.
<i>L. variabilis</i>	RISSE	1826	Ind.
<i>L. verticillata</i>	BLAINVILLE	1830	Gen. <i>Campanularia</i> .
<i>L. viridis</i>	RISSE	1826	Ind.
Gen. <i>Laomedea</i>	HASSAL	1841 (b)	= <i>Laomedea</i> .
<i>L. gelatinosa</i>	HASSAL	1841 (b)	Gen. <i>Obelia</i> .
Gen. <i>Liriozoa</i> Lmk. sec.	ORBIGNY (d')	1834	Supp.
<i>L. sex-dentata</i>	ORBIGNY (d')	1834	Ind.
Gen. <i>Listera</i>	MENEGHINI	1845	= p. p. <i>Plumularia</i> .
<i>L. (Aglaophenia) secundaria</i>	MENEGHINI	1845	= <i>Plumularia secundaria</i> .
[Gen. <i>Lovenella</i>	HINCKS	1868]	
[<i>L. clausa</i>	HINCKS	1868]	

Gen. Lowenia	MENEGHINI	1845	Supp.
<i>L. pinnata</i>	MENEGHINI	1845	= <i>Plumularia pinnata</i> .
<i>L. setacea</i>	MENEGHINI	1845	= <i>Plumularia setacea</i> .
<i>L. tetrasticha</i>	MENEGHINI	1845	= ? <i>Nemertesia ramosa</i> .
Gen. Lucernaria	FABRICIUS	1780	Non Hydr.
<i>L. phrygia</i>	FABRICIUS	1780	= <i>Myriothela phrygia</i> .
Gen. <i>Lytoscyphus</i>	PICTET	1893	
<i>L. articulatus</i>	(LAMOUROUX)	1824 (b)	
<i>L. fruticosus</i>	(ESPER)	1788-1830	
Gen. Monopysis	NARDO	1847 (a)	Supp.
<i>M. geniculata</i>	NARDO	1847 (a)	= ? <i>Campanularia flexuosa</i> .
S ^s -Gen. Monopyxis	EHRENBERG	1834	Supp.
Gen. Monopyxis Ehren-			
berg	sec. MENEGHINI	1845	Supp.
<i>M. dichotoma</i> Ehren-			
berg	sec. MENEGHINI	1845	= <i>Plumularia obliqua</i> .
Gen. Nigellastrum	OKEN	1815	Supp.
<i>N. fusca</i>	GRAY	1848	= <i>Sertularia fusca</i> .
<i>N. fuscum</i>	GRAY	1848	= <i>Sertularia fusca</i> .
<i>N. nigra</i>	GRAY	1848	= <i>Sertularia pinnata</i> .
<i>N. nigrum</i>	GRAY	1848	= <i>Sertularia pinnata</i> .
<i>N. pinnata</i>	GRAY	1848	= <i>Sertularia pinnata</i> .
<i>N. pinnatum</i>	GRAY	1848	= <i>Sertularia pinnata</i> .
Gen. <i>Obelia</i>	PÉRON et LE-		
	SUEUR	1810	Voir <i>Campanularia</i> et <i>Laomedea</i> .
<i>O. flabellata</i>	HINCKS	1866	
<i>O. deflexa</i>	GRAY	1848	Non Hydr.
<i>O. lobulata</i>	GRAY	1848	Non Hydr.
<i>O. radians</i>	LAMOUROUX	1824 (b)	Non Hydr.
<i>O. radiata</i>	CHIAJE (delle)	1828-30	Non Hydr.
<i>O. ramosa</i>	LAMOUROUX	1824 (b)	Non Hydr.
<i>O. serpens</i>	GRAY	1848	Non Hydr.
<i>O. tubulifera</i>	LAMOUROUX	1821	Non Hydr.
<i>O. tubulipora</i>	DENOTARIS	1846	Non Hydr.
Gen. <i>Opercularella</i>	HINCKS	1868	
<i>O. lacerata</i>	HINCKS	1868	

Gen. <i>Pasythea</i>	LAMOUROUX	1812	
<i>P. gracilis</i> .	DANA	1846-49	
Gen. <i>Pennaria</i>	GOLDFUSS	1820	
<i>P. Caulini</i>	CHIAJE (delle)	1844-44	= <i>Pennaria disticha</i> .
S ^s -Gen. <i>Peripyxis</i>	EURENBERG	1834	Supp.
Gen. <i>Peritricha</i>	BORY de St-		
	VINCENT	1824	Supp.
<i>P. polyporum</i>	BORY de St-		
	VINCENT	1824	= Oeufs d' <i>Hydra</i> .
Gen. <i>Plumularia</i>	LAMARCK	1816	
<i>P. amathoidea</i>	BLAINVILLE	1830	Ind. an <i>Hydrallmania</i> ?
<i>P. amathioidea</i>	EDWARDS, M.	1836	Ind. an <i>Hydrallmania</i> ?
<i>P. angulosa</i>	DANA	1846-49	Ind.
<i>P. arcuata</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Aglaophenia arcuata</i> .
<i>P. Banksii</i>	GRAY	1843 (a)	Ind. an <i>Aglaophenia</i> ?
<i>P. bullata</i>	PLEMING	1826	Ind.
<i>P. catharina</i>	JOHNSTON	1833	
<i>P. catherina</i>	COUCH	1841	= <i>Plumularia catharina</i> .
<i>P. cristata</i> var.	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Aglaophenia dichotoma</i> .
<i>P. crucialis</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Aglaophenia crucialis</i> .
<i>P. cupressina</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Aglaophenia cupressina</i> .
<i>P. flexuosa</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Aglaophenia flexuosa</i> .
<i>P. Gaimardi</i>	(LAMOUROUX)	1824 (b)	
<i>P. gelatinosa</i>	EDWARDS, M.	1836	Ind.
<i>P. glutinosa</i>	BLAINVILLE	1830	Ind.
<i>P. gracilis</i>	BLAINVILLE	1830	Ind.
<i>P. Helleri</i>	HINCKS	1872	
<i>P. hypnoidea</i>	BLAINVILLE	1830	= ? <i>Aglaophenia fusca</i> .
<i>P. hypnoides</i>	EDWARDS, M.	1836	= ? <i>Aglaophenia fusca</i> .
<i>P. macleodii</i>	WESTENDORP	1843	= ? <i>Plumularia pinata</i> .
<i>P. myriophila</i>	TEMPLETON	1836	= <i>Aglaophenia myriophyllum</i> .
<i>P. myriophylla</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Aglaophenia myriophyllum</i> .

<i>P. obliqua</i>	HINCKS	1862	
<i>P. obscura</i>	BLAINVILLE	1830	Ind.
<i>P. patagonica</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	= <i>Aglaophenia patagonica</i> .
<i>P. pelagica</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Aglaophenia pelagica</i> .
<i>P. pennaria</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Pennaria disticha</i> .
<i>P. pluma</i>	ESPER	1788-1830	= <i>Aglaophenia pluma</i> .
<i>P. simplex</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	= <i>Aglaophenia simplex</i> .
<i>P. speciosa</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Aglaophenia speciosa</i> .
<i>P. spicata</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Aglaophenia spicata</i> .
<i>P. sulcata</i>	EDWARDS, M.	1836	Ind.
<i>P. verticillata</i>	THOMPSON	1848	= <i>Nemertesia antennina</i> .
Gen. <i>Podocoryna</i>	SARS	1846	= <i>Podocoryne</i> .
<i>P. albida</i>	SARS	1846	= <i>Podocoryne carnea</i> .
<i>P. carnea</i>	SARS	1846	= <i>Podocoryne carnea</i> .
Gen. <i>Podocoryne</i>	SARS	1846	
<i>P. aculeata</i>	(WAGNER)	1833	
<i>P. albida</i>	SARS	1846	= <i>Podocoryne carnea</i> .
<i>P. carnea</i>	SARS	1846	
<i>P. Sarsii</i> Stp. sec.	LÜTKEN	1850	= ? <i>Podocoryne carnea</i> .
S ^s -Gen. <i>Podopyxis</i>	EHRENBERG	1834	Supp.
Gen. <i>Polypus</i>	B. de St-VINCENT	1824	= <i>Hydra</i> .
<i>P. briareus</i>	B. de St-VINCENT	1824	= <i>Hydra vulgaris</i> .
<i>P. isochirus</i>	B. de St-VINCENT	1824	= <i>Hydra attenuata</i> .
<i>P. megalochirus</i>	B. de St-VINCENT	1824	= <i>Hydra oligactis</i> .
<i>P. viridis</i>	B. de St-VINCENT	1824	= <i>Hydra viridis</i> .
Gen. <i>Serialaria</i> sec.	SCHWEIGGER	1819	Supp.
<i>S. falcata</i>	WESTENDORP	1843	= <i>Hydrallmania falcata</i> .
[Gen. <i>Selaginopsis</i> (mod.)	ALLMAN	1876	Voir <i>Sertularia</i> .

Gen. <i>Sertularella</i>	GRAY	1848	
* <i>S. Gaudichaudi</i>	(LAMOUROUX)	1824 (b)	
<i>S. Gayi</i>	(LAMOUROUX)	1824	
<i>S. Johnstoni</i>	(GRAY)	1843 (a)	
<i>S. milneana</i>	(ORBIGNY (d'))	1839-46	
<i>S. picta</i>	(MEYEN)	1834	
<i>S. polyzonias</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>S. polyzonias</i> var. α	GRAY	1848	= <i>Sertularella polyzonias</i> .
<i>S. polyzonias</i> var. β	GRAY	1848	= <i>Sertularella Gayi</i>
<i>S. rugosa</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>S. tenella</i>	(ALDER)	1858]	
<i>S. tricuspidata</i>	(ALDER)	1858	
<i>S. unilateralis</i>	(LAMOUROUX)	1824 (a)	
Gen. <i>Sertularia</i>	LINNÉ	1758	
<i>S. abietinula</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Sertularia abietina</i> .
<i>S. (Nemertesia) anten-</i> <i>nina</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Nemertesia anten-</i> <i>nina</i> .
<i>S. arcta</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Coppinia arcta</i> .
<i>S. argentea</i>	LINNÉ	1758	= <i>Thuiaria argentea</i>
<i>S. articulata</i>	PALLAS	1766	= <i>Thuiaria articulata</i> .
<i>S. articulata</i> sec. EDWARDS, M.		1836	= <i>Lytoscyphus articu-</i> <i>latus</i> .
<i>S. (Thoa) Beani</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Halecium Beani</i> .
<i>S. bifida</i>	Risso	1826	Ind.
<i>S. bispinosa</i>	(GRAY)	1843	
<i>S. brevicella</i>	EDWARDS, M.	1836	Ind.
<i>S. Cavolini</i>	KÖLLIKER	1843	= <i>Obelia</i> sp. ?
<i>S. ciliata</i>	LAMARCK	1816	= <i>Dynamena barbata</i> .
<i>S. conferviformis</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Sertularia confer-</i> <i>væformis</i> .
<i>S. cresioide</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Thuiaria crisioides</i> .
<i>S. cupressina</i>	LINNÉ	1758	= <i>Thuiaria cupressina</i> .
<i>S. cupressoides</i>	LEPECHIN	1783	= <i>Thuraria cupres-</i> <i>siodes</i> .
<i>S. dichotoma</i> sec. LISTER		1834	= <i>Gonothyraea Loceni</i> .
<i>S. dichotoma</i> sec. DALYELL		1836	= ? <i>Obelia flabellata</i> .

<i>S.</i> (Campanularia) di-			
chotoma	sec. DALYELL	1847-48	= ? <i>Obelia flabellata</i> .
<i>S. divergens</i>	sec. BLAINVILLE	1830	= <i>Sertularia divaricata</i> .
<i>S. dumosa</i>	FLEMING	1820	= <i>Lafea dumosa</i> .
<i>S.</i> (Campanularia) du-			
mosa	DALYELL	1847-48	= <i>Lafea dumosa</i> .
<i>S. Ellisii</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Sertularella polyzonias</i> .
<i>S. ericoides</i> var.	PALLAS	1766	= ? <i>Sertularella Gayi</i> .
<i>S. falcata</i>	LINNÉ	1758	= <i>Hydrallmania falcata</i> .
<i>S.</i> (Plumularia) fal-			
cata	sec. DALYELL	1847-48	= <i>Hydrallmania falcata</i> .
<i>S. fallax</i>	JOHNSTON	1847	
<i>S.</i> (Plumularia) fascis	DALYELL	1847-48	Ind. an <i>Nemertesia</i> sp.?
<i>S. fastigiata</i>	sec. FABRICIUS	1780	= <i>Thuriaria fabricii</i> .
<i>S. frutescens</i>	CUVIER	1830	= <i>Plumularia frutescens</i> .
<i>S. fruticosa</i>	ESPER	1794-1806	= <i>Lygoscypus fruticosus</i> .
<i>S. fusca</i>	JOHNSTON	1847	
<i>S. fuscescens</i>	BENNET OR OL-		
	VIER	1826	= <i>Sertularia</i> (<i>Diphasia</i>) <i>pinnata</i> .
<i>S. Gaudichaudii</i>	DESLONGCHAMPS	1824 (b)	= <i>Sertularella Gaudichaudi</i> .
<i>S. Gayi</i>	LAMOUREUX	1821	= <i>Sertularella Gayi</i> .
<i>S. geniculata</i> Mullsec.	LOVÉN	1835	= <i>Gonothyraea Loveni</i> .
<i>S. glacialis</i>	COSTA	1838	Ind.
<i>S. haelecina</i>	CUVIER	1830	= <i>Halerium halerinum</i> .
<i>S. hibernica</i>	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Sertularella polyzonias</i> .
<i>S. indivisa</i>	MEYEN	1834	Ind.
<i>S. ivoria</i>	WESTENDORP	1843	non Hydr.
<i>S. Johnstoni</i>	GRAY	1843 (a)	= <i>Sertularella Johnstoni</i> .

<i>S. laxa</i>	LAMARCK	1816	= <i>Lygoscypbus fruticosus</i> .
<i>S. lichenastrum</i>	PALLAS	1766	= <i>Thuiaria lichenastrum</i> .
<i>S. limbata</i>	EDWARDS M.	1836-49	Ind.
<i>S. margareta</i>	HASSAL	1841 (b)	= <i>Sertularia (Dynamena) pinaster</i> .
<i>S. margaretta</i>	JOHN	1848	= <i>Sertularia (Dynamena) pinaster</i> .
<i>S. margarita</i>	JOHN	1848	= <i>Sertularia (Dynamena) pinaster</i> .
<i>S. milneana</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	= <i>Sertularella milneana</i> .
<i>S. mimosa</i>	DANA	1846-49	Ind.
<i>S. Monopyxis geniculata</i>	EHRENBERG	1834	= ? <i>Campanularia flectuosa</i> .
<i>S. nigra</i> sec.	JAMESON	1811	= <i>Sertularia fusca</i> .
<i>S. nodosa</i>	COSTA	1838	Ind.
<i>S. ovifera</i> sec.	BLAINVILLE	1830	non Hydr.
<i>S. palecina</i>	HOGG	1827	= <i>Halerium halerinum</i> .
<i>S. (Syncoryne) parasitica</i>	FREY U. LEUCKART	1847	= <i>Corydendrium parasiticum</i> .
<i>S. patagonica</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	= ? <i>Sertularella rugosa</i> .
<i>S. pelagica</i>	EDWARDS, M.	1836	Ind. an <i>Pennaria</i> ?
<i>S. Peripyxis cuscuta</i>	EHRENBERG	1834	non Hydr.
<i>S. picta</i>	MEYEN	1834	= <i>Sertularella picta</i> .
<i>S. pinastum</i>	CUVIER	1830	= <i>Sertularia (Dynamena) pinaster</i> .
<i>S. pinnaster</i>	THOMAS	1847	= <i>Diphasia attenuata</i> .
<i>S. pinnata</i> sec.	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Sertularia fallax</i> .
<i>S. pinnata</i> sec.	TEMPLETON	1836	= <i>Sertularella polyzonias</i> .
<i>S. pinnata</i> sec.	CHIAJE (delle)	1828-30	= ? <i>Plumularia Helleri</i> .
<i>S. (Plumularia) pinnata</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Plumularia pinnata</i> .

<i>S. Podopyxis dives</i>	EURENBERG	1834	Ind.
<i>S. polyzonias</i>	LINNÉ	1758	= <i>Sertularella polyzonias</i> .
<i>S. polyzonias</i> var. β	JOHNSTON	1847	= <i>Sertularella Gagi</i> .
<i>S. pristis</i>	SCHWEIGGER	1819	= <i>Idia pristis</i> .
<i>S. prolifera</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>S. pumila</i> var.	JOHNSTON	1847	= <i>Sertularia gracilis</i> .
<i>S. pumila</i> var. β	THOMAS	1847	= <i>Sertularia gracilis</i> .
<i>S. (Endendrium) racemosum</i>	BENEDEX (van)	1844 (b)	= <i>Endendrium racemosum</i> .
<i>S. ramosa</i>	RISSO	1826	= <i>Endendrium racemosum</i> .
<i>S. (Antennularia) ramosa</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Nemertesia ramosa</i> .
<i>S. (Nemertesia) ramosa</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Nemertesia ramosa</i> .
<i>S. reptans</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Campanularia reptans</i> .
<i>S. rugosa</i>	LINNÉ	1758	= <i>Sertularella rugosa</i> .
<i>S. rugosa</i> var.	JOHNSTON	1847	= <i>Sertularella tenella</i> .
<i>S. setacea</i> sec.	LISTER	1834	= <i>Plumularia echinulata</i> .
<i>S. seticornis</i>	HOGG	1827	= <i>Nemertesia ramosa</i> .
<i>S. spiralis</i>	RISSO	1826	Ind.
<i>S. (Campanularia) syringa</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Calycella (Campanularia) syringa</i> .
<i>S. tamarindus</i>	CUVIER	1830	= <i>Sertularia tamarisca</i> .
<i>S. tamerisca</i>	COSTA	1839	= <i>Sertularia tamarisca</i> .
<i>S. Templetoni</i>	FLEMING	1828	= <i>Plumularia setacea</i> .
[<i>S. tenella</i>]	ALDER	1856	= <i>Sertularella tenella</i> .
<i>S. thuja</i>	LINNÉ	1758	= <i>Thuiaria thuja</i> .
<i>S. thuya</i>	RISSO	1826	= <i>Thuiaria thuja</i> .
<i>S. tricuspidata</i>	ALDER	1856	= <i>Sertularella tricuspidata</i> .
<i>S. trifida</i>	COSTA	1838	Ind.

<i>S. tubiformis</i>	EDWARDS, M.	1836	Gen. <i>Dynamena</i> .
<i>S. Tudori</i>	RYLAND	1848	= <i>Dynamena</i> (<i>Sertularia</i>) <i>pinaster</i> .
<i>S. tuya</i>	DESLONGCHAMPS	1824	= <i>Thuiaria thuja</i> .
<i>S. uber</i>	DALYELL	1834	= <i>Thuiaria argentea</i> .
<i>S. ulex</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Lafæa dumosa</i> .
<i>S. unilateralis</i>	LAMOUREUX	1824 (b)	= <i>Sertularella unilateralis</i> .
<i>S.</i> (<i>Campanularia</i>)			
<i>verticillata</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Campanularia verticillata</i> .
<i>S. volubilis</i> ♂	PALLAS	1766	= <i>Lafæa dumosa</i> .
Gen. <i>Silicularia</i>	MEYEN	1834	
<i>S. gracilis</i>	MEYEN	1834	Ind.
<i>S. rosea</i>	MEYEN	1834	
Gen. <i>Siphorus</i>	RAFINESQUE-		
	SCHMALTZ	1810	Supp.
Gen. <i>Siphytus</i>	RAFINESQUE-		
	SCHMALTZ	1810	Supp.
<i>S. obconicus</i>	RAFINESQUE-		
	SCHMALTZ	1810	= ? <i>Lafæa dumosa</i> .
Ss-Gen. <i>Sporadopyxis</i>	EURENBERG	1834	Supp.
Gen. <i>Stauridium</i>	DUJARDIN	1843	
<i>S. sp?</i>	DUJARDIN	1843	= <i>Cladonema radiatum</i> .
Gen. <i>Stipula</i>	SARS	1829	Supp.
<i>S. ramosa</i>	SARS	1829	= <i>Coryne pusilla</i> .
Gen. <i>Syncorina</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Syncoryne</i> .
<i>S. ramosa</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Coryne pusilla</i> .
Gen. <i>Syncoryna</i>	EHRENBERG	1834	= <i>Syncoryne</i> .
<i>S. Chamissonis</i>	EHRENBERG	1834	= <i>Coryne ramosa</i> .
<i>S. decipiens</i>	DUJARDIN	1845 (a)	= <i>Syncoryne decipiens</i> .
<i>S. glandulosa</i>	KROHN	1843	= ? <i>Coryne pusilla</i> .
<i>S. glandulosa</i>	DUJARDIN	1845 (a)	= <i>Syncoryne glandulosa</i> .
<i>S. Listerii</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	= <i>Syncoryne Listeri</i> .
<i>S. Lovenii</i>	SARS	1846	= <i>Syncoryne Loveni</i> .
<i>S. multicornis</i>	EHRENBERG	1836 (b)	= <i>Clava multicornis</i> .
<i>S. parasitica</i>	EHRENBERG	1834	= <i>Corydendrium parasiticum</i> .

<i>S. pusilla</i>	EHRENBERG	1834	= <i>Coryne pusilla</i>
<i>S. pusilla</i>	BENEDEN (VAN)	1844 (b)	= <i>Coryne van Beneden</i> .
<i>S. ramosa</i>	EHRENBERG	1834	= <i>Coryne pusilla</i> .
<i>S. ramosa</i>	LOVÉN	1835	= <i>Syncoryne Loreni</i> .
<i>S. reptans</i>	DUJARDIN	1845 (b)	Ind.
<i>S. Sarsii</i>	LOVÉN	1835	= <i>Syncoryne Sarsi</i> .
Gen. <i>Syncoryne</i>	EHRENBERG	1834	(Modif. orthogr.).
<i>S. sp. ?</i>	DESOR	1849	= <i>Syncoryne mirabilis</i> .
<i>S. decipiens</i>	DUJARDIN	1845 (a)	
<i>S. glandulosa</i>	DUJARDIN	1845 (a)	Douteuse.
<i>S. Listeri</i>	BENEDEN (VAN)	1844 (b)	Douteuse.
<i>S. Loreni</i>	SARS	1846	
<i>S. mirabilis</i>	AGASSIZ	1862	
<i>S. multicornis</i>	LEUCKART	1847 (a)	= <i>Clara multicornis</i> .
<i>S. ramosa</i>	STEENSTRUP	1842	= <i>Syncoryne Loreni</i> .
<i>S. Sarsi</i>	LOVÉN	1835	
Gen. <i>Synhydra</i>	QUATREFAGES	1843	Supp.
<i>S. parasites</i>	QUATREFAGES	1843	= <i>Hydractinia echinata</i> .
Gen. <i>Thoa</i>	LAGOURoux	1816	Supp.
<i>T. Beanii</i>	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Halecium Beanii</i> .
<i>T. Edwardsiana</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	= <i>Halecium Edwardsianum</i> .
<i>T. halicina</i>	HASSAL	1841 (a)	= <i>Halecium halecinum</i> .
<i>T. Lamourouxiana</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	= <i>Halecium Lamourouxianum</i> .
<i>T. muricata</i>	JOHNSTON	1838 (b)	= <i>Halecium muricatum</i> .
<i>T. patagonica</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	= <i>Halecium patagonicum</i> .
<i>T. spinosa</i>	WESTENDORP	1843	Non hydr.
<i>T. tehuelcha</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	= <i>Halecium tehuelchum</i> .
Gen. <i>Thoa</i>	TEMPLETON	1836	= <i>Thoa (Halecium)</i> .
<i>T. halicina</i>	TEMPLETON	1836	= <i>Halecium halecinum</i> .
Gen. <i>Thuiaria</i>	FLEMING	1828	

<i>T. argentea</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>T. articulata</i>	(PALLAS)	1766	
<i>T. crisioïdes</i>	(LAMOUREUX)	1824 (b)	
<i>T. cupressina</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>T. cupressoides</i>	(LEPECHIN)	1783	
<i>T. fabricii</i>	NUTTING	1901	
<i>T. lichenastrum</i>	(PALLAS)	1766	
<i>T. thuja</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>T. zelandica</i>	GRAY	1843 (a)	
Gen. <i>Tubularia</i>	LINNÉ	1758	
<i>T. arbuscula</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	Ind. an <i>Eudendrium</i> .
<i>T. calyculata</i>	RISSE	1826	Ind.
<i>T. clytioides</i>	LAMOUREUX	1824 (b)	Ind. <i>Campanularia</i> sp.?
<i>T. cycloides</i>	EDWARDS, M.	1836	Ind. <i>Campanularia</i> sp.?
<i>T. Dumortieri</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	
<i>T. Ehrenbergii</i>	DUCHASSAING	1850	Ind.
<i>T. fasciculata</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	Ind.
<i>T. glandulosa</i>	DUCHASSAING	1850	Ind.
<i>T. gracilis</i>	HARVEY	1836	= <i>Tubularia indivisa</i> .
<i>T. Griselinii</i>	NARDO	1847	= ? <i>Tubularia indivisa</i> .
<i>T. hyalina</i>	RISSE	1826	Ind.
<i>T. lacea</i>	sec. BLAINVILLE	1830	Ind.
<i>T. Lamoureauxii</i>	DUCHASSAING	1850	Ind.
<i>T. laryngea</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	= <i>Tubularia larynx</i> .
<i>T. ornata</i>	COUTHOUY	1846	= ? <i>Tubularia indivisa</i> .
<i>T. pinnata</i>	DUCHASSAING	1850	Ind.
<i>T. polyceps</i>	DALYELL	1835	Ind.
<i>T. (Sertularia) ramea</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Eudendrium rameum</i> .
<i>T. ramosa</i> var. <i>ramea</i>	JOHNSTON	1834	= ? <i>Eudendrium rameum</i> .
<i>T. (Sertularia) ramosa</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Bougainvillia ramosa</i> .
<i>T. reptans</i>	ORBIGNY (d')	1834	Non Hydr.
<i>T. rugosa</i>	ORBIGNY (d')	1839-46	Ind.
<i>T. solitaria</i>	RAPP	1829 (b)	Non Hydr.

T. stellifera	COUTHOUY	1839	Ind.
T. tubifera	JOHNSTON	1825	= <i>Lafæa dumosa</i> .
T. tubifex	sec. BLAINVILLE	1830	= <i>Lafæa dumosa</i> .
Gen. Tuliparia	BLAINVILLE	1830	Supp.
T. quadridentata	BLAINVILLE	1830	= <i>Pasytheu quadri-</i> <i>dentata</i> .
T. tulipifera	BLAINVILLE	1830	Non Hydr.
Gen. Zelleria	DUCHASSAING	1850	Supp.
Z. simplex	DUCHASSAING	1850	Ind.

INDEX DES MÉDUSES

ANTHOMÉDUSES ET LEPTOMÉDUSES

Gen. <i>Æquorea</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	
A. abbreviata	BLAINVILLE	1834	= <i>Mesonema abbreviata</i>
A. atlantophora	BLAINVILLE	1830	= <i>Polycanna vitrina</i> .
A. ciliata	ESCHSCHOLTZ	1829	
A. cilita	BLAINVILLE	1834	= <i>Æquorea ciliata</i> .
A. globosa	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Rhegmatodes globosa</i> .
A. mitra	LESSON	1830	= <i>Tiara papua</i> .
A. octocostata	LESSON	1843	= <i>Meliceridium octo-</i> <i>costatum</i> .
A. rissoana	CHIAJE (delle)	1828-30	= <i>Polycanna italica</i> .
A. violacea	EDWARDS. M.	1836-49	
Gen. Aglaura	PÉRON et LESUEUR	1810	
A. conica	BLAINVILLE	1830	= <i>Pandea conica</i> .
A. penicillata	BLAINVILLE	1834	= <i>Polyorchis penicil-</i> <i>lata</i> .
A. rotunda	BLAINVILLE	1830	= <i>Tiara rotunda</i> .
Animalculum tin-			
tinnabulum	DALYELL	1836	= ? <i>Obelia plana</i> .
Gen. Berenice	ESCHSCHOLTZ	1829	
B. cuvieria	BLAINVILLE	1834	= <i>Berenice rosea</i> .
Gen. Berenix	PÉRON et LESUEUR	1810	= <i>Berenice</i> .
B. euchroma	PÉRON et LESUEUR	1836-49	= <i>Cladocanna thalas-</i> <i>sina</i> .

Gen. Bougainvillea	FORBES	1848	= Bougainvillia.
B. britannica	FORBES	1848	= <i>Margelis ramosa</i> .
B. nigrیتella	FORBES	1848	= <i>Thammitis nigrیتella</i> .
Gen. Bougainvillia	LESSON	1836	
B. britannica	AGASSIZ, L.	1850 (a)	= <i>Margelis ramosa</i> .
B. macloviana	LESSON	1836	= <i>Hippocrene macloviana</i> .
B. nigrیتella	AGASSIZ, L.	1850 (a)	= <i>Thammitis nigrیتella</i> .
Gen. Bugainvillia	LESSON	1843	= Bougainvillia.
B. britannica	LESSON	1843	= <i>Margelis ramosa</i> .
B. macloviana	LESSON	1843	= <i>Hippocrene macloviana</i> .
B. octopunctata	LESSON	1843	= <i>Rathkia octopunctata</i> .
Gen. Callichora	DUJARDIN	1845 (b)	Ind.
Gen. Callirhoe	PÉRON et LESUEUR	1810	
C. Basteri	VERANY	1846	= <i>Laodice cruciata</i> .
Gen. Campanella	LESSON	1843	
C. Chamissonis	LESSON	1843	= <i>Polyorchis campanulatus</i> .
C. dinema	BLAINVILLE	1834	= <i>Saphenia dinema</i> .
C. fabricii	LESSON	1843	= <i>Catablema campanula</i> .
Gen. Carybdea	PÉRON et LESUEUR	1810	
C. mitra	BRANDT	1837	= <i>Tiara papua</i> .
Gen. Cladonema	DUJARDIN	1843	
C. radiatum	DUJARDIN	1843	
Gen. Codonium	HECKEL	1879	
C. gemmiferum	HECKEL	1879	
C. pulchellum	HECKEL	1879	
Gen. Conis	BRANDT	1834	
C. mitrata	BRANDT	1834	
Gen. Cyanea	PÉRON et LESUEUR	1809	
Gen. Cyanæa	LESSON	1830	= Cyanea.
C. Bougainvillii	LESSON	1830	= <i>Hippocrene macloviana</i> .
C. coccinea	DAVIS	1844	= <i>Turris neglecta</i> .
Gen. Cytacis	BLAINVILLE	1834	= <i>Cylæis</i> .
C. tetrastylla	BLAINVILLE	1834	= <i>Cylæis tetrastylla</i> .

Gen.	<i>Cyrtæis</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
	<i>C. octopunctata</i>	SARS	1835	= <i>Rathkia octopunctata</i> .
	<i>C. tetrastyla</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
	<i>C. tetrastylis</i>	LOVÉN	1835	= <i>Cyrtæis tetrastyla</i> .
Gen.	<i>Dianæa</i>	LAMARCK	1816	
	<i>D. Bairdii</i>	JOHNSTON	1833	= <i>Tiara Bairdii</i> .
	<i>D. bitentaculata</i>	QUOY et GAIMARD	1827	= <i>Saphecia bitentaculata</i> .
	<i>D. conica</i>	QUOY et GAIMARD	1827	= <i>Paulea conica</i> .
	<i>D. cymbalarioides</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	= <i>Epenthesis cymbaloides</i> .
	<i>D. fasciculata</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	= <i>Rathkia fasciculata</i> .
	<i>D. hemisphærica</i>	JOHNSTON	1833	= <i>Thaumantias hemisphærica</i> .
	<i>D. lucullana</i>	CHUJAE (delle)	1828-30	= <i>Irene pellucida</i> .
	<i>D. pleurostoma</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	= <i>Turritopsis pleurostoma</i> .
	<i>D. rotunda</i>	QUOY et GAIMARD	1827	= <i>Tiara rotunda</i> .
Gen.	<i>Dianæa</i>	LESSON	1843	= <i>Dianæa</i> .
	<i>D. lucullea</i>	VERANY	1846	= <i>Irene pellucida</i> .
	<i>D. pileata</i>	VERANY	1846	= <i>Tiara pileata</i> .
Gen.	<i>Diporeia</i>	HECKEL	1879	
	<i>D. hatterata</i>	HECKEL	1879	
Gen.	<i>Eirene</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	voir : <i>Irene</i> .
Gen.	<i>Eleutheria</i>	QUATREFAGES	1842	
	<i>E. dichotoma</i>	QUATREFAGES	1842	
Gen.	<i>Epenthesis</i>	MAC CRADY	1857	
	<i>E. maculata</i>	HECKEL	1879	
Gen.	<i>Equorea</i>	RISSE	1826	= <i>Equorea</i>
	<i>E. forskaliana</i>	RISSE	1826	= <i>Equorea forskalea</i> .
	<i>E. rissoana</i>	RISSE	1826	= <i>Polycanna italica</i> .
Gen.	<i>Eucopæ</i>	GEGENBAUR	1856	
	<i>E. octona</i>	HECKEL	1879	
Gen.	<i>Eucopium</i>	HECKEL	1879	
	<i>E. quadratum</i>	HECKEL	1879	
Gen.	<i>Eaphysa</i>	FORBES	1848	
	<i>E. aurata</i>	FORBES	1848	
Gen.	<i>Geryonia</i>	PÉRON et LESCEUR	1810	

	<i>G. bitentaculata</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Saphenia bitentaculata</i> .
	<i>G. hemispherica</i>	FLEMING	1828	= <i>Thaumantias hemispherica</i> .
	<i>G. pellucida</i>	WILL.	1844	= <i>Irene pellucida</i> .
	<i>G. planata</i>	WILL.	1844	= <i>Phialidium caribole</i> .
Gen.	<i>Geryonopsis</i>	FORBES	1848	
	<i>G. delicatula</i>	FORBES	1848	= <i>Irene viridula</i> .
Gen.	<i>Hippocrene</i>	MERTENS	1834	
	<i>H. britannica</i>	FORBES	1841	= <i>Margelis ramosa</i> .
	<i>H. Bugainvillii</i>	BRANDT	1834	= <i>Hippocrene mertensi</i> .
	<i>H. macloviana</i>	HECKEL	1879	
	<i>H. Mertensi</i>	HECKEL	1879	
	<i>H. octopunctata</i>	FORBES	1844	= <i>Rathkia octopunctata</i> .
	<i>H. superciliaris</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	
Gen.	<i>Laodice</i>	LESSON	1843	
	<i>L. crucigera</i>	LESSON	1843	= <i>Laodice cruciata</i> .
Gen.	<i>Lizzia</i>	FORBES	1846	
	<i>L. blondina</i>	FORBES	1848	
	<i>L. octopunctata</i>	FORBES	1848	= <i>Margellium octopunctatum</i> .
Gen.	<i>Margelis</i>	STEENSTRUP	1850	
	<i>M. principis</i>	STEENSTRUP	1850	
	<i>M. ramosa</i>	AGASSIZ, L.	1862	
Gen.	<i>Margellium</i>	HECKEL	1879	
	<i>M. octopunctatum</i>	HECKEL	1879	
Gen.	<i>Medusa</i>	LINNÉ	1735	
	<i>M. campanulata</i>	CHAMISSE et EYSENHARDT	1821	= <i>Polyorchis campanulatus</i> .
	<i>M. crinita</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Irene viridula</i> .
	<i>M. cymballoïdes</i>	CUVIER	1830	= <i>Epenthesis cymballoidea</i> .
	<i>M. duodecilia</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Margelis ramosa</i> .
	<i>M. fimbriata</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Obelia lucifera</i> .
	<i>M. (Geryonia) hemispherica</i>	THOMPSON	1840	= <i>Thaumantias hemispherica</i> .

	<i>M. hemispherica</i>	BOSC	1802	= <i>Thaumantias hemispharica</i> .
	<i>M. miliaris</i>	CHAJE (delle)	1841-44	= <i>Obelia</i> sp. ?
	<i>M. oclia</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Margelis ramosa</i> .
	<i>M. octocilia</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Margelis ramosa</i> .
	<i>M. proboscidea</i>	DALYELL	1847-48	= ? <i>Sarsia tubulosa</i> .
	<i>M. (tima Esch.)</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Tima Bairdi</i> .
Gen.	<i>Melicerta</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	
	<i>M. campanulata</i>	BLAINVILLE	1834	= <i>Polyorchis campanulatus</i> .
	<i>M. pleurotoma</i>	LESSON	1843	= <i>Turritopsis pleurotoma</i> .
Gen.	<i>Melicertidium</i>	HECKEL	1879	
	<i>M. octocostatum</i>	HECKEL	1879	
Gen.	<i>Melicertum</i>	EHRENBERG	1836 (a)	
	<i>M. campanula</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Catableua campanula</i> .
	<i>M. campanulatum</i>	EHRENBERG	1836 (a)	= <i>Melicertidium octocostatum</i> .
	<i>M. campanulatum</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Polyorchis campanulatus</i> .
	<i>M. penicillatum</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Polyorchis penicillatus</i> .
Gen.	<i>Mesonema</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
	<i>M. abbreviata</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
	<i>M. cœlum-pensile</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Mesonema pensile</i> .
	<i>M. cœrulescens</i>	BRANDT	1834	
	<i>M. dubium</i>	BRANDT	1838	
	<i>M. macrodactyla</i>	BRANDT	1834	
	<i>M. macrodactylum</i>	BRANDT	1838	
	<i>M. pileus</i>	LESSON	1843	= <i>Orchistoma pileus</i> .
Gen.	<i>Microstoma</i>	LESSON	1830	
	<i>M. ambigua</i>	LESSON	1830	= <i>Pteronema ambiguous</i> .
	<i>M. ambiguus</i>	LESSON	1843	= <i>Pteronema ambiguous</i> .
Gen.	<i>Modeeria</i>	FORBES	1846	
	<i>M. formosa</i>	FORBES	1848	
Gen.	<i>Nemopsis</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	
	<i>N. Buchei</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	

Gen. <i>Obelia</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	
<i>O. diaphana</i>	ALLMAN	1864	
<i>O. leucostyla</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>O. lucifera</i>	HECKEL	1879	
<i>O. plana</i>	HECKEL	1879	
Gen. <i>Oceania</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	
<i>O. ampullacea</i>	SARS	1835	= <i>Tiara pileata</i> .
<i>O. bimorpha</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Pandea saltatoria</i> .
<i>O. Blumenbachii</i>	RATHKE	1835	= <i>Rathkia Blumenbachii</i> .
<i>O. Blumenbachii</i>	DUJARDIN	1840	= <i>Rathkia Blumenbachii</i> .
<i>O. cacuminata</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Laodice cruciata</i> .
<i>O. conica</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Pandea conica</i> .
<i>O. cruciata</i>	WAGNER	1841	= <i>Laodice cruciata</i> .
<i>O. diadema</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Amphinema titania</i> .
<i>O. dimena</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Amphinema titania</i> .
<i>O. episcopalis</i>	FORBES	1848	= <i>Tiara pileata</i> .
<i>O. gibba</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Irene pellucida</i> .
<i>O. globulosa</i>	FORBES	1848	= <i>Turris neglecta</i> .
<i>O. (Thaumantias)</i>			
<i>hemispherica</i>	EHRENBERG	1836 (a)	= <i>Thaumantias hemispherica</i> .
<i>O. Lesueuri</i>	BLAINVILLE	1834	= <i>Tiara pileata</i> .
<i>O. Lesueuria</i>	Risso	1826	= <i>Tiara pileata</i> .
<i>O. octocostata</i>	SARS	1835	= <i>Meliceridium octocostatum</i> .
<i>O. octona</i>	FORBES	1848	= <i>Tiara octona</i> .
<i>O. pileus</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Tiara pileata</i> .
<i>O. rotunda</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Tiara rotunda</i> .
<i>O. saltatoria</i>	SARS	1835	= <i>Pandea saltatoria</i> .
<i>O. tubulosa</i>	SARS	1835	= <i>Sarsia tubulosa</i> .
<i>O. turrita</i>	FORBES	1848	= <i>Tiara octona</i> .
Gen. <i>Æquorea</i>	VERANY	1846	= <i>Æquorea</i> .
<i>O. forskalii</i>	VERANY	1846	= <i>Æquorea forskalea</i> .
<i>O. mesonema</i>	VERANY	1846	= <i>Mesonema pensile</i> .
<i>O. rissoana</i>	VERANY	1846	= <i>Polycanna italica</i> .
Gen. <i>Orchistoma</i>	HECKEL	1879	
<i>O. pileus</i>	HECKEL	1879	

Gen.	<i>Pandea</i>	LESSON	1837	
	<i>P. conica</i>	LESSON	1843	
	<i>P. rotunda</i>	LESSON	1843	= <i>Tiara rotunda</i> .
Gen.	<i>Polyorchis</i>	AGASSIZ, A.	1862	
	<i>P. campanulatus</i>	HÆCKEL	1879	
	<i>P. penicillata</i>	AGASSIZ, A.	1862	
Gen.	<i>Polyxenia</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
	<i>P. plenronota</i>	LESSON	1843	= <i>Zygocanna pleuro-</i> <i>nota</i> .
	<i>P. purpurea</i>	LESSON	1843	= <i>Zygocanna purpu-</i> <i>rea</i> .
	<i>P. undulosa</i>	LESSON	1843	= <i>Zygocanna undu-</i> <i>losa</i> .
Gen.	<i>Probascidactyla</i>	BRANDT	1834	
	<i>P. flavicirrata</i>	BRANDT	1834	
Gen.	<i>Pteronema</i>	HÆCKEL	1879	
	<i>P. ambiguum</i>	HÆCKEL	1879	
Gen.	<i>Rathkia</i>	BRANDT	1837	
	<i>R. Blumentachi</i>	BRANDT	1838	
	<i>R. Blumenbachiana</i>	BRANDT	1837	= <i>Rathkia Blumen-</i> <i>bachi</i> .
	<i>R. octopunctata</i>	(SARS)	1835	
Gen.	<i>Rhegmatores</i>	AGASSIZ, L.	1862	
	<i>R. globosa</i>	AGASSIZ, L.	1862	
Gen.	<i>Saphenia</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
	<i>S. bitentaculata</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
	<i>S. dinema</i> sec.	FORBES	1846	= <i>Amphinema titania</i> .
Gen.	<i>Sarsia</i>	LESSON	1843	
	<i>S. clavata</i>	KEFERSTEIN	1862	
	<i>S. gemmifera</i>	FORBES	1848	= <i>Codonium gemmife-</i> <i>rum</i> .
	<i>S. mirabilis</i>	AGASSIZ, L.	1850	
	<i>S. prolifera</i>	FORBES	1848	
	<i>S. pulchella</i>	FORBES	1848	= <i>Codonium pulchel-</i> <i>lum</i> .
	<i>S. tubulosa</i>	LESSON	1843	
Gen.	<i>Slabberia</i>	FORBES	1846	
	<i>S. halterata</i>	FORBES	1846	= <i>Dipurena halterata</i> .
Gen.	<i>Staurophora</i>	BRANDT	1834	

	<i>S. laciniata</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	<i>Staurostoma laciniata</i> .
	<i>S. Mertensi</i>	BRANDT	1834	
Gen.	<i>Staurostoma</i>	HECKEL	1879	
	<i>S. laciniata</i>	HECKEL	1879	
Gen.	<i>Steenstrupia</i>	FORBES	1846	
	<i>S. flaveola</i>	FORBES	1848	= <i>Steenstrupia galanthus</i> .
	<i>S. galanthus</i>	HECKEL	1879	
	<i>S. rubra</i>	FORBES	1848	= <i>Steenstrupia galanthus</i> .
Gen.	<i>Sthenyo</i>	DUJARDIN	1845	= ? <i>Sarsia</i> .
Gen.	<i>Stomobrachiota</i>	BRANDT	1834	
	<i>S. lenticularis</i>	BRANDT	1834	= <i>Stomobrachium lenticulare</i> .
Gen.	<i>Stomobrachium</i>	BRANDT	1838	
	<i>S. lenticulare</i>	BRANDT	1838	
	<i>S. octocostatum</i>	FORBES	1848	= <i>Melicertidium octocostatum</i> .
Gen.	<i>Tetranema</i>	HECKEL	1879	
	<i>T. aeronauticum</i>	HECKEL	1879	
Gen.	<i>Thammitis</i>	HECKEL	1879	
	<i>T. nigrifella</i>	HECKEL	1879	
Gen.	<i>Thaumantias</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
	<i>T. aeronautica</i>	FORBES	1848	= <i>Tetranema aeronauticum</i> .
	<i>T. convexa</i>	FORBES	1848	= <i>Phialidium variabile</i> .
	<i>T. cymballoidea</i>	DUJARDIN	1840	= <i>Epenthesis cymballoidea</i> .
	<i>T. cymbaloidea</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Epenthesis cymballoidea</i> .
	<i>T. cymbaloidea</i> sec. FORBES		1848	= <i>Irene viridula</i> .
	<i>T. cymbaloidia</i>	BLAINVILLE	1834	= <i>Epenthesis cymbaloidia</i> .
	<i>T. diaphana</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	= <i>Obelia diaphana</i> .
	<i>T. gibbosa</i>	FORBES	1848	= ? <i>Phialidium variabile</i> .
	<i>T. globosa</i>	FORBES	1848	= <i>Phialidium variabile</i> .

	<i>T. haemispherica</i>	BLAINVILLE	1834	= <i>Thaumantias hemispherica</i> .
	<i>T. inconspicua</i>	FORBES	1848	= ? <i>Thaumantias hemispherica</i> .
	<i>T. leucostyla</i>	WILL	1844	= <i>Obelia leucostyla</i> .
	<i>T. lineata</i>	FORBES	1848	= <i>Thaumantias hemispherica</i> .
	<i>T. lucida</i>	LESSON	1843	= <i>Thaumantias hemispherica</i> .
	<i>T. lucida</i> sec.	FORBES	1848	= <i>Obelia lucifera</i> .
	<i>T. lucifera</i>	FORBES	1848	= <i>Obelia lucifera</i> .
	<i>T. maculata</i>	FORBES	1848	= <i>Epenthesis maculata</i> .
	<i>T. melanops</i>	FORBES	1848	= <i>Tiaropsis multicirrata</i> .
	<i>T. milleri</i>	LANDSBOROUGH	1847	= <i>Melicertidium octocostatum</i> .
	<i>T. multicirrata</i>	SARS	1835	= <i>Tiaropsis multicirrata</i> .
	<i>T. octona</i>	FORBES	1848	= <i>Eucopia octona</i> .
	<i>T. pileata</i>	FORBES	1841	= <i>Thaumantias hemispherica</i> .
	<i>T. pilosella</i>	FORBES	1848	= <i>Laodice cruciata</i> .
	<i>T. plana</i>	SARS	1835	= <i>Obelia plana</i> .
	<i>T. punctata</i>	FORBES	1841	= <i>Thaumantias hemispherica</i> .
	<i>T. quadrata</i>	FORBES	1848	= <i>Eucopium quadratum</i> .
	<i>T. sarnica</i>	FORBES	1841	= <i>Phialidium variabile</i> .
	<i>T. Thompsonii</i>	FORBES	1841	= <i>Epenthesis cymbaloidea</i> .
Gen.	<i>Tiara</i>	LESSON	1837	
	<i>T. papalis</i>	LESSON	1843	= <i>Tiara pileata</i> .
	<i>T. papua</i>	HECKEL	1879	
	<i>T. rotunda</i>	HECKEL	1879	
	<i>T. Sarsii</i>	LESSON	1843	= <i>Tiara pileata</i> .
Gen.	<i>Tiaropsis</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	
	<i>T. diademata</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	
	<i>T. multicirrata</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	

Gen. <i>Tima</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
<i>T. Bairdi</i>	FORBES	1846	
<i>T. flavilabris</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
<i>Tintinnabulum</i>	DALYELL	1847-48	= ? <i>Obelia plana</i> .
Gen. <i>Turris</i>	LESSON	1837	
<i>T. coccinea</i>	GRAY	1848	= <i>Turris neglecta</i> .
<i>T. digitale</i>	FORBES	1846	= <i>Turris digitalis</i> .
<i>T. digitalis</i>	FORBES	1848	
<i>T. papua</i>	LESSON	1843	= <i>Tiara papua</i> .
Gen. <i>Willsia</i>	FORBES	1846	
<i>W. stellata</i>	FORBES	1846	

